

606.84261

PAULLI FRISII

MEDIOLANENSIS

CLER. REG. CONGR. D. PAULLI

IN PISANO GYMNASIO PUBLICI PROFESSORIS,

BONONIENSIS, BEROLINENSIS, ET PETROPOLITANÆ
SCIENTIARUM ACADEMIÆ SOCIJ &c.

DISSERTATIONUM

VARIARUM

Tomus Primus,

IN QUO HABENTUR

1. Problematum Præcessionis Æquinoctiorum, Nutationis Terrestris Axis, aliarumque vicissitudinum diurni motus Geometrica solutio, cujus specimen a Regia Berolinensi Scientiarum Academia anno 1756. præmium obtinuit.
2. De Atmosphæra Cælestium Corporum Dissertatio Physico-Mathematica, quæ anno 1758. a Regia Parisiensi Scientiarum Academia præmium consecuta est.
3. De Natura, & Motu Ætheris, ac Phænomenis inde pendentibus Conjecturæ Physicæ, quarum specimen anno 1755. Imperialis Petropolitane Scientiarum Academiæ jussu, & suffragio editum est.



LUCÆ MDCCLIX.

APUD VINCENTIUM JUNCTINIUM.

Cum Approbatione.

m

J O S E P H O

REGIO PRINCIPI HAEREDITARIO
ARCHIDUCI AUSTRIAE

&c. &c. &c.



PAULLUS FRISIUS

FELICITATEM.



Um boni omnes in ea
spe, & expectatione
Tui sint, ut Te, REGIE PRIN-
CEPS,

* 2

CEPS , Regnorum Majestatisque ,
& virtutis etiam , ac gloriæ PA-
RENTUM TUORUM AUGUSTORUM
hæredem sibi polliceantur ; diu-
tius mihi , & Academiae nostræ
cunctandum non erat plane , ut
aliquam gratulantis , & prægesti-
entis animi significationem com-
muni nomine præberemus . E-
gregia indoles Tua , & ad gran-
dia quæque erectus , ac compa-
ratus animus , & præclaræ ani-
mi dotes , quas a Majoribus im-
mortalibus acceptas , hæreditario
quasi jure , ad vivum expressisti
PATERNIS , MATERNISQUE AUGUSTIS-
SIMIS EXEMPLIS , liberalissimaque ,
ac Te ipso digna institutione ad

api-

apicem deduxisti , spem nobis
omnibus certissimam injiciunt fo-
re ut , quod in votis antiquo-
rum erat, regnantem rursus Phi-
losophum videamus . Non e-
nim iis dumtaxat studiis Tibi
dedisse operam satis fuit , qui-
bus ad justitiam, & æquitatem,
ac rei militaris scientiam , ad
fortitudinem , magnanimitatem ,
sapientiam , & splendas alias
virtutes, planeque regias imbui,
& informari necesse est qui ad
regnum parantur adolescentes ;
sed ad eas quoque partes , ac
disciplinas te contulisti , quæ
bonum virum propius attingunt,
quæ privatam vitam nobilitant ,

& quæ ingenium aut cognitionibus ornant ad eruditionem, aut præceptis instruunt ad humanitatem. Itaque & indita ingenii perspicacia, & præceptorum doctissimorum disciplina a deo profecisti, ut experimentalem Physicam, ut universam Philosophiam, ut naturalem Historiam animo complexus fueris: in qua quidem Historia naturali vestigiis AUGUSTISSIMI PARENTIS TUI propius insistere properasti, qui in deliciis semper eam habuit, & qui in ea fovenda, locupletanda, promovendaque regiam liberalitatem quam maxime nitere voluit. Hæc, &

simi-

similia de Te nuncia cum ad nos usque quotidie traducerentur, incredibilem omnibus lætitiā afferebant. Academia autem nostra, quæ jam diu PARENTIS TUI Patrocinio, & Auspiciis perfruebatur, & nuper viderat ad Historiæ naturalis, ad Physicæ, & Astronomiæ incrementum ejus jussu præsidia, atque ornamenta non sine magnis sumptibus sibi comparari, in Te suæ fortis perpetuitatem jam prævidebat, & Te eodem favore semper sperabat optimas disciplinas, & optimarum disciplinarum custodes profecuturum; illas quidem, quia cum intelli-

gas

gas quam late pateant, idcirco quanto in pretio habendæ sint non ignoras; hos vero, quia alios etiam, in quo Tu excellis, eminere magnitudo Animi Tui ut moleste feras non finit. Sibi etiam in mentem inducebat Academia notum jam Tibi, PRINCEPS REGIE, & exploratum esse hic prima Astronomiæ, Mechanicæ, & Physicæ fundamenta fuisse jacta: hic Galilæum, & tot alia Philosophiæ, & Mathematicos lumina enituisse: hic optimas quasque artes nullo non tempore fuisse cultas, & maxime perpolititas. Ego vero in hac tanta, & communi singulorum
spe,

spe, & lætitia cum singillatim
certior essem factus de Huma-
nitate, & Clementia ea Tua,
qua minima etiam in Te officia
non repudias, animum sumpsi,
& me Tibi ex Academia pri-
mum suture, & Principi litte-
ratissimo litterarium munus per-
solvere; atque hunc maximum,
honestissimumque studiorum me-
orum fructum habere volui, ut
nomen meum ad Aulam usque;
& aures Tuas deferretur. Ita-
que in tribus hisce dissertationsi-
bus elucubrandis, in supputan-
dis vicissitudinibus diurni Tellu-
ris motus, determinandisque li-
mitibus Atmosphaeræ cælestium

corporum , & investiganda Electricitatis , ac naturalium aliorum Phænomenorum caussa , nihil veritus sum Tecum loqui , & Te de arduis , involutisque quæstionibus , quibus nuper Berolinensis , Parisiensis , & Petropolitana Scientiarum Academiæ Philosophorum , & Geometrarum ingenia exercuerunt , arbitrum deligere , judicem adhibere . Quam si personam sustinueris quæ non benignitas Tua erit ? Ego , PRINCEPS REGIE , adeo mihi placebo de approbatione , & favore Tuo , ut non pluris facturus sim præmia illa , & honoris notas , quæ ab iisdem

dem

dem Academiis in me , & dissertationes easdem meas collata sunt . Studia autem mea jam erecta , & confirmata praesidio Tuo tantum gloriae , & incrementi accipient , ut in pervestigandis recessibus naturae , & humanarum cognitionum finibus extendendis numquam deinceps me defatigatum iri confidam . Interim vero dum jucunda hac cogitatione delector vehementer , favorem ipsum , & praesidium Tuum demissa fronte , animoque implorare mihi non desino .

[illegible]

PAULLI FRISII
PROBLEMATUM

PRÆCESSIONIS ÆQUINOCTIORUM
NUTATIONIS TERRESTRIS AXIS,
ALIARUMQUE VICISSITUDINUM DIURNI MOTUS
GEOMETRICA SOLUTIO,

C U J U S S P E C I M E N

A REGIA BEROLINENSI SCIENTIARUM ACADEMIA
ANNO MDCCLVI.

PRÆMIUM OBTINUIT.

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the origin of the universe. It is shown that the problem is not only a philosophical one, but also a scientific one. The author discusses the various theories of the origin of the universe, and shows that the most plausible one is the theory of the origin of the universe from a state of equilibrium.

PAULLI FRISII
PROBLEMATUM

PRÆCESSIONIS ÆQUINOCTIORUM
NUTATIONIS TERRESTRIS AXIS,
ALIARUMQUE VICISSITUDINUM DIURNI MOTUS
GEOMETRICA SOLUTIO,

C U J U S S P E C I M E N

A REGIA BEROLINENSI SCIENTIARUM ACADEMIA
ANNO MDCCLVI.

PRÆMIUM OBTINUIT.

OTTAWA

The following is a list of the names of the persons who have been elected to the office of Mayor of the City of Ottawa for the year 1874. The names are arranged in alphabetical order of their surnames. The names of the persons who have been elected to the office of Mayor of the City of Ottawa for the year 1874 are as follows: [The text is extremely faded and illegible, but appears to be a list of names.]

P R Æ F A T I O.

Consideranti mihi, atque animo attentius revolventi utrum diurni Telluris motus vicissitudines essent aliqua, quo nobis modo innotescere, & qua ipsæ ex causa proficisci possent, quod oblato præmio problema anno 1754 primum, tum rursus anno 1756 a Regia Berolinensi Scientiarum, atque humaniorum litterarum Academia resolvendum proponebatur; physicis potius rationibus, quam observationibus Astronomicis dirimenda omnis questio visa est. Cum enim nihil aliud sit metiri, quam invenire propositæ rei rationem ad quantitatem aliam ejusdem generis, quæ assumitur pro unitate; quæcumque in medium producerentur mensuræ veteres diurni motus, quæ a mensuris ætatis nostræ discrepant, incertum semper, ac plane dubium relinquerent, utrum ipsa diurni motus celeritas, an vero terminus, ad quem, veluti ad unitatem, referebantur, mutatus sit. Porro in tota Physicarum causarum, ac legum serie prorsus nulla deprehenditur, quæ absolutam rapiditatem circa axem a particulis terrestribus conceptam ullo umquam modo, ac tempore possit afficere: non circumfusi ætheris resistentia, quæ non nisi infinite parva esse potest, & si esset aliqua, sese in vorticem conformare æther, & simul cum Terra circa Solem deberet rapi: non varia motus annui quantitas, & velocitas, quæ cum singulis particulis terrestribus sit communis, nec parallelismum axis mutare potest, nec particularum motum circa axem conceptum accelerare, aut retardare: non Solis, aut Lunæ attractio, quæ licet parallelismum axis afficiat, quantitatem diurni motus afficere non potest. Id ego cum diligentius pro argumenti elegantia, & dignitate investigassem,

sem, paulatim ad successivas parallellismi ipsius axis vicissitudines, motum nodorum terrestris Aequatoris, & Eclipticæ, præcessionemque Aequinoctiorum examinandam progressus sum. In ea autem dissertatione, quam præmii obtinendi gratia antea dederam ad Regiam Borussicam Academiam, tertium Newtoni lemma emendare inprimis volui, quo cum quantitatem motus Terræ totius spheroidicæ, & terræ exterius circa inscriptam spheram redundantis inquireret maximus Geometra, exteriorem terram concepit circa æquatorem inscriptæ spheræ ad modum annuli dispositam. Deinde cum quantitatem motus terræ interioris, exteriorisque accuratius definiissem, eam præcessionis annuæ portionem, quæ ex viribus Solis oritur, juxta Newtoni methodum, uno minuto secundo circiter cum dimidio augendam esse judicavi, eademque methodo alia problemata, quæ Newtonus minime attigerat, tentare cepi, nutationis terrestris axis, variationisque obliquitatis Eclipticæ, quæ Sole aut Luna ab Aequatore ad Tropicos declinante haberi aebet. Cum vero dissertationem ipsam præmii honore donatam esse accepissem, & in Pisana Academia, in quam tunc temporis adscitus fueram, plus otii litterarii studiis hisce excolendis nactus essem, theoriæ vicissitudinum, quæ ex diversitate attractionum a Sole, & Luna in solidas Terræ partes exercitarum oriri possunt, Geometricè exponendam, absolvendamque aggressus sum. Primo autem opus ingeniosissimum, elegantissimumque Alembertii de præcessione Aequinoctiorum, & nutatione terrestris axis singillatim examinavi, cumque subductis calculis omnibus nihil in eo desiderari ad problematis solutionem videretur, annua tamen præcessio duplo major Alembertiana, quam Newtoniana methodo prodiret; animadverti discrimen omne potissimum inde ortum ducere, quod Newtonus eandem quantitatem motus, Alembertius vero eandem quantitatem momentorum, quæ ex massa, velocitate, & distantia singularum particularum ab axe motus æstimantur, a terra exterius posita transire ad terram totam, conservarique intellexerit. Noster etiam Perellius, quæ est in litteris omnibus, atque in rebus potissi-

tissimum Geometricis, & Astronomicis, quas publice in Academia proficitur, perspicacia, atque ingenio, jam diu adnotavit hoc vitio maxime Newtonianam solutionem problematis laborare, atque ea de re Cl. Jacquerium monuit cum de edendis Newtonianæ Philosophiæ Commentariis ageretur. Quare cum eandem semper momentorum quantitatem in corporibus rotantibus, atque oscillantibus tueri accurate demonstrassem, & de generali, ac Geometrica solutione problematis cogitarem, deprehendi motuum compositionem, non in liberis motibus dumtaxat, sed etiam in motibus oscillatoriis habere locum, & rotationes plures ejusdem corporis, circa diversos axes conceptas, certa lege inter se uniri, atque ex omnibus unam emergere. Hoc me theorema totius theoriæ, quam modo exhibeo, fecit compotem. Primo autem agam de rotationis motibus componendis, comparandisque inter se momentis spheroidis circa axem, aut circa diametrum Aequatoris aliquam revolutæ. Deinde inventis viribus a Sole, & Luna in solidas Terra particulas exercitis, differam de diurni motus, & motus, qui ex attractionibus iisdem oritur, compositione. Tertio loco determinandam aggrediar ipsam præcessionem Aequinoctiorum, & variationes omnes præcessionis, quæ ex Sole oritur, & ex Luna etiam oriri posset, si in plano Eclipticæ revolveretur. Denique inquiram vicissitudines præcessionis, & obliquitatis Eclipticæ, quæ pendet ex inclinatione Lunaris orbitæ ad Eclipticam, & ex nodorum Lunarium motu. Hæc quæ facile, & breviter, quantum totius problematis natura, & indoles patitur, singula exponam, illis plane omnibus congruent, quæ Alembertius ex suo Dynamica principio analytice eruerat: de quo amicū honestissimū antea per litteras monere volui. Cumque æquationes aliquot occurrent ab aliis æquationibus dissentientes, quas anno 1749 in Monumentis Berolinensis Scientiarum Academiæ, & in Transactionibus Philosophicis anno 1754 clarissimi Eulerus, & Sylvabellius tradiderant, indicabo, quæ totius dissentionis causa, & origo sit, & ne quid ad theoriam absolvendam, illustrandamque deficiat, ostendam etiam commune quod-

quoddam utriusque authoris supputandarum centripetarum virium principium, quod a veritate ahsonum cum Grandio nostro, & Geometris aliis præclarissimis esse arbitror, ab Eulero quidem correctum justam præcessionis annuæ quantitatem exhibuisse, & a Sylvabellio minime emendatum duplo minores præbuisse æquationes omnes præcessionis, nutationis axis, variationisque obliquitatis Eclipticæ. Antequam vero ulterius provebar, ipsa rei æquitas, & Philosophicus candor postulat, ut me plurimum debere fatear argumento elucubratæ, & Transactionibus Philosophicis insertas postmodum, cum Pisis esset, pro humanitate sua mecum communicavit, & Radicato Comiti, singularis ingenii viro, & in rebus Mathematicis impense docto, quem per litteras singillatim de meis hisce studiis consului.



DE



D E
VICISSITUDINIBUS
DIURNI
TELLURIS MOTUS.



DEFINITIO.

Quantitas momentorum alicujus corporis circa axem aliquem oscillantis est summa factorum omnium ~~ex massa singularum particularum~~; vi acceleratrice, & distantia ab axe motus.

OBSERVATIO PRIMA.

Media præcessio annua Æquinoctiorum, sive regressus intersectionum Æquatoris cum plano Eclipticæ statui potest cum Cl. Caillio 50. 3". Vide Astronomiæ fundamenta *pag.* 6.

OBSERVATIO SECUNDA.

Nodi etiam Lunaræ orbitæ cum plano Eclipticæ moventur contra ordinem signorum, & spatio annorum 18, ac 7 mensium revolutionem integram absolunt.

OB-

OBSERVATIO TERTIA.

Nutatio terrestris axis eadem, qua Lunarium nodorum motus, periodo complectitur. Cl. Bradlejus cum nutationem maximam $18''$ primum statuisset, aliis postmodum observationibus diligentius repetitis $19''$ esse voluit.

OBSERVATIO QUARTA.

Media inclinatio Eclipticæ, & Æquatoris censerī potest $23^{\circ} 28' 19''$, ut eam reperit die prima Januarii anno 1750 diligentissimus Caillius. Decrescere videtur o. $44''$ annis singulis.

OBSERVATIO QUINTA.

Inclinatio media Lunarī orbitæ ad Eclipticam est circiter $5^{\circ} 8 \frac{1}{2}'$. Colligitur id ex Parisiensibus Ephemeridibus, comparando in singulis Lunationibus maximas latitudines Lunæ inter se invicem, & mediam latitudinem accipiendo.

POSTULATUM.

Figuram Telluris nostræ quam proxime sphæroidem esse circa Polos compressam, elatamque circa Æquatorem, & differentiam axis Terræ, & diametri Æquatoris ita esse exiguam ut possint negligi quadraticæ, & plusquam quadraticæ differentiæ ipsius potestates.

LEMMA PRIMUM.

Attractione Solis, & Lunæ diurnus Telluris motus neque accelerari, neque retardari poterit.

Quicumque enim sit locus Luminarium, si per centrum alterutrius, & axem Terræ planum aliquod traducatur, scabi-

DIURNI MOTUS.

9

cabitur Terra in duas hemisphæroides, orientalem, occidentalemque, inter se æquales, & similes, similiterque respectu Solis, aut Lunæ positas. Hoc dato intelligitur facile duas partes æque, ac similiter in adversas plagas debere impelli, ut quantum pars Orientalis urgetur Occidentem versus, tantumdem Occidentalis Orientem versus urgeatur. Itaque ex mutuis Solis, aut Lunæ viribus diurnus Telluris motus non poterit accelerari, aut retardari.

LEMMA SECUNDUM.

Iisdem tamen viribus efficietur ut axis Terræ locum suum mutet, & ad varia cœli puncta dirigatur.

Nam si per Solis, aut Lunæ centrum, ac centrum Terræ ducatur planum, quod circulum declinationis secet ad perpendicularum, dividetur terra in duas alias hemisphæroides, Australem, & Borealem, inter se quidem similes, sed quæ Luminaribus ab Æquatore hinc inde digredientibus dissimiliter erunt posita, & dissimilibus viribus afficiuntur. Hac virium dissimilitudine, & varia positione partium efficietur ut quæ circa Æquatorem Terræ redundat materia exterior modo ad Austrum, & modo ad Boream nutet, ac diurnæ revolutionis axem modo huc, modo illuc dirigat.

LEMMA TERTIUM.

Ita vero binis motibus terra afficietur, diurno quidem invariabili, & altero nutationis axis, qui Luminaribus ab Æquatore ad Tropicos declinantibus augebitur.

Cum enim mutua attrahentes vires, dato quolibet Solis, aut Lunæ loco diurnum Telluris motum minime afficiant, positionis dissimilitudo in Australi, & Boreali hemisphæroide eo major erit quo magis ab Æquatore declinabunt duo Luminaria. Proinde posita majore declinatione major erit differentia virium a Sole, & Luna in redundantem, & exteriorem terram exercitarum, & major motus, & inclinatio terrestri axis. Ut vero hi bini Telluris motus rite componantur

B

in-

inter se invicem, repetenda altius res omnis, & quadrifariam dividenda tractatio, & primo de rotatione corporum generatim agendum est.

P A R S P R I M A.

De motu & momento corporum rotantium, & motuum, ac momentorum compositione.

PROPOSITIO PRIMA.

Quantitas motus sphaerae circa diametrum quamlibet revolutae est in ratione simplici vis acceleratricis puncti cujuslibet Aequatoris, & in ratione triplicata radii: Quantitas autem momenti est in ratione eadem vis acceleratricis, & in ratione radii quadruplicata.

DEMONSTRATIO.

Pars prior. Rotetur sphaera circa diametrum AB , fig. 1., & radius sphaerae TA sit $=a$, vis acceleratrix puncti H $=v$, vis acceleratrix alterius puncti cujuscunque $M = \frac{XM \cdot v}{a}$, quantitas motus in circulari arcu $Mm = \frac{XM \cdot Mm \cdot v}{a} = \frac{TM \cdot Xx \cdot v}{a}$. Si radius ad peripheriam se habeat ut $1 : p$, erit motus zonae circularis, quae revolutione arcus Mm circa axem gignitur $= \frac{p}{a} TM \cdot XM \cdot Xx$, & motus totius superficie sphaericae radio TM descriptae $= \frac{p^2 \cdot TM^3}{4a}$, & motus integrae sphaerae $= \frac{1}{16} p^2 \circ a^3$, proportionalis scilicet vi acceleratrici, & cubo radii. $\mathcal{Q}. E. 1. m.$

Pars

Pars altera. Momentum puncti N erit $= \frac{XN^3 \cdot a}{4}$, momentum peripheriæ radio XN descriptæ $= \frac{p \cdot XN^3 \cdot a}{a}$, momentum totius circuli $= \frac{p \cdot XN^4 \cdot a}{4a}$, momentum segmenti sphaerici, quod revolutione spatii $XNnx$ gignitur $= \frac{p \cdot a}{4a} (TN^4 \cdot Xx - 2TN^3 \cdot TX^3 \cdot Xx + TX^4 \cdot Xx)$, & summa momentorum omnium, sive momentum segmenti sphaerici altitudinis $TX = \frac{p \cdot a}{4a} (TN^4 \cdot TX - \frac{2}{3}TN^3 \cdot TX^3 + \frac{1}{5}TX^5)$, momentum hemisphaerii $= \frac{2}{15} p a^4$, momentum sphaeræ integræ $= \frac{4}{15} p a^4$, proportionale scilicet simplici vi acceleratrici, & quadrato-quadrato radii. $Q. E.$ alterum.

COROLLARIUM.

Si vis acceleratrix proportionalis sit radio sphaeræ, erit quantitas motus $\frac{1}{16} p^2 a^4$, & quantitas momenti $\frac{4}{15} p a^4$. Est $\frac{2}{3} p a^3$ massa totius sphaeræ, Itaque si hæc massa vocetur M , erit per momentum omne $\frac{2}{5} M a^2$.

PROPOSITIO SECUNDA.

Si annulus solidus Æquatorem sphaeræ circumambiat, & circa diametrum Æquatoris aliquam simul cum sphaera revolvatur; erit quantitas motus sphaeræ ad quantitatem motus totius annuli in ratione materiæ in sphaera ad materiam in annulo, & ratione trium quadratorum ex arcu quadranti circuli cujuscumque ad duo quadrata ex diametro.

DEMONSTRATIO.

Nam si sit N quantitas materiæ per totum annulum AHB uniformiter distributæ, erit $\frac{N.N\pi}{p^2}$ quantitas materiæ in elemento quovis $N\pi$, & elementum quantitatis motus erit $= \frac{N.XN.N\pi.\pi}{p^2} = \frac{N.X\pi.\pi}{p^2}$, motus quadrantis $= \frac{N.\pi}{p}$, & motus totius annuli $= \frac{4.N.\pi}{p}$. Est vero per primam partem antecedentis propositionis quantitas motus totius sphæræ $= \frac{1}{16}p^2 a^3 \omega$. Igitur motus annuli est ad motum inscriptæ sphæræ ut $N:\frac{1}{16}p^2 a^3 = 8N:\frac{2}{3}p a^3 \cdot \frac{3}{16}p^2$, in ratione scilicet, quæ componitur ex ratione quantitatis N materiæ in annulo ad quantitatem $\frac{2}{3}p a^3$ materiæ in sphæra, & ratione duorum quadratorum ex diametro 2 ad tria quadrata $\frac{3}{16}p^2$ ex quadrante $\frac{1}{4}p$. *Q. E. D.*

COROLLARIUM PRIMUM.

Quia diameter est ad peripheriam ut 10000:31415, numeris hisce in ~~specierum locum~~ subrogatis, erit quantitas motus in globo incluso ad quantitatem motus in solo annulo in ratione quantitatis materiæ in globo, & annulo, ac numerorum 1000000, & 925275.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Si semiaxis major sphaeroidis circa Polos compressæ sit $= A$, semiaxis minor $= a$, differentia semiaxium $= \phi a$, differentia sphaeræ, & ac sphaeroidis ad inscriptam sphaeram se habebit ut $A^2 - a^2 : a^2$. Quare si materies exterior ad annulum solidum reduceretur, sphaeræ Aequatori circumpositum, & circa eandem diametrum revolutum, esset annuli motus ad motum sphaeræ ut 1000000 ($A^2 - a^2$): 925275 a^2 .

PRO-

PROPOSITIO TERTIA.

Momentum sphaeræ est ad momentum annuli *Æquatorem* sphaeræ circumambientis, & circa diametrum *Æquatoris* aliquam revoluti ut quadruplum materiæ in sphaera ad quintuplum materiæ in annulo: Ad momentum vero annuli revoluti circa axem *Æquatoris* se habet ut duplum materiæ in sphaera ad quintuplum materiæ in annulo.

DEMONSTRATIO.

Pars prior. Manentibus cæteris ut supra erit momentum circularis arcus $Nn = \frac{N \cdot XN^2 \cdot Nn \cdot o}{pa^2} = \frac{N \cdot XN \cdot Xn \cdot o}{pa}$, momentum quadrantis $= \frac{N \cdot o}{pa} \cdot \frac{1}{8} pa^2 = \frac{1}{8} N a w$, & momentum totius annuli $= \frac{1}{2} N a w$. Quare per partem alteram propositionis primæ erit momentum sphaeræ ad momentum annuli ut $\frac{4}{15} pa^4 w : \frac{1}{2} N a w = \frac{2}{3} pa^3 \cdot 4 : 5 N$, sive ut quadruplum materiæ in sphaera ad quintuplum materiæ in annulo. *Q. E. I. m.*

Pars altera. Si annulus non circa diametrum *Æquatoris*, sed circa axem, qui diametris omnibus perpendicularis in centro est, revolvatur, erit ipsius momentum $= N a w$, adeoque momentum sphaeræ ad momentum annuli se habebit ut duplum materiæ in sphaera ad quintuplum materiæ in annulo. *Q. E. alterum.*

COROLLARIUM.

Quia soliditas sphaeræ inscriptæ ad differentiam sphaeræ, & sphaeroidis se habet ut $1 : 2 \phi$, adeoque est $\frac{4}{3} \phi \phi a^3$ materiæ quantitas, qua sphaerois sphaeram inscriptam superat, si hæc

si hæc omnis materia, ut supra, ad solidum *Æquatoris* an-
nulum reducatur, erit momentum *sphæræ* ad momentum
annuli circa *Æquatoris* diametrum revoluti ut $\frac{8}{3} p a^3 :$
 $\frac{20}{3} p \phi a^3 = 2 a : 5 \phi a$, ad momentum vero annuli revoluti
circa axem ut $a : 5 \phi a$. Momenta annuli in casu utroque
erunt ut 1 : 2.

PROPOSITIO QUARTA.

Si *sphærois* circa *Polos* compressa ad *sphæram* proxime
accedat, & circa diametrum *Æquatoris* aliquam revolvatur;
erit quantitas motus totius *sphæroidis* ad quantitatem mo-
tus inscriptæ *sphæræ* in ratione subquintuplicata semiaxis
majoris *sphæroidis* ad minorem.

DEMONSTRATIO.

Ductis planis quibuscumque diametro *Æquatoris*, qui est a-
xis motus, perpendicularibus, dividetur *sphærois* in totidem
ellipses similes, & *sphæra* circumscripta in totidem circulo-
los, quorum radii æquales erunt semiaxibus majoribus ellip-
sium, & ad minores semiaxes se habebunt ut $A : a$. Tum,
ob affinitatem *sphæræ*, & *sphæroidis*, quantitas motus in
singulis ellipsis æqualis erit quantitati motus in circulis e-
jusdem areæ, seu quorum radii ad radios circulorum, qui
in circumscripta *sphæra* secari possunt, se habeant ut $\sqrt{Aa} :$
 A : Nam si ex ellipsi, & circulo ejusdem areæ dematur quod
commune est, spatiorum superstitium latitudo exigua erit, &
ejus latitudinis puncta omnia censei poterunt distantiam a
centro motus, velocitatemque habere æqualem. Rursus quan-
titates motus in circulis sunt in ratione simplici celeritatis,
qua peripheria circa centrum revolvitur, & ratione radio-
rum duplicata, aut in ratione radiorum triplicata si celeri-
tas proportionalis sit radiis, & motus angularis sit idem.
Itaque quantitas motus in singulis ellipsis erit ad quanti-
ta-

tatem motus in circulis ut supra sectis, five quantitas motus totius sphæroidis erit ad quantitatem motus in sphæra circumscripta ut $a^2 : A^2$. Sunt vero quantitates motus in circumscripta, & inscripta sphæra ut $A^4 : a^4$ per *Cor. Prop. 1.* Itaque quantitas motus sphæroidis erit ad quantitatem motus inscriptæ sphære ut $A^{\frac{5}{2}} : a^{\frac{5}{2}}$. *Q. E. D.*

COROLLARIUM PRIMUM.

Et erit quantitas motus totius sphæroidis ad quantitatem motus sphæroidis, & sphære inscriptæ $= A^{\frac{5}{2}} : A^{\frac{5}{2}} - a^{\frac{5}{2}}$
 $= \frac{A^{\frac{5}{2}}}{a + \phi a^{\frac{1}{2}}} : \frac{A^{\frac{5}{2}}}{a + \phi a^{\frac{1}{2}}} - \frac{a^{\frac{5}{2}}}{a + \phi a^{\frac{1}{2}}} = \frac{A^{\frac{5}{2}}}{a + \phi a^{\frac{1}{2}}} : \frac{A^{\frac{5}{2}} - a^{\frac{5}{2}}}{a + \phi a^{\frac{1}{2}}} = \frac{A^{\frac{5}{2}}}{(a + \phi a^{\frac{1}{2}})^{\frac{5}{2}}} : \frac{A^{\frac{5}{2}} - a^{\frac{5}{2}}}{(a + \phi a^{\frac{1}{2}})^{\frac{5}{2}}} = \frac{A^{\frac{5}{2}}}{A^{\frac{5}{2}} - a^{\frac{5}{2}}}$
 $\frac{5}{2} \phi a = 2A : 5 \phi a$. Quod est theorema a Cl. Walmeslejo
 diversa methodo exhibitum.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Ex sola terminorum $2A : 5 \phi a$, & $925275a^2 : 1000000(A^2 - a^2) = 925275a^2 : 2000000 \phi a^2$ collatione patet non eandem esse rationem motus materiæ interioris, exteriorisque, five exterior materia consistat in locis suis, five ad solidum Æquatoris annulum reducatur. Differentia tamen omnis exigua erit, neque adeo a vera differet ea ratio motuum, quam, Newtonus *Lem. 3. lib. 3. Princip.* determinaverat.

PROPOSITIO QUINTA.

Momentum totius sphæroidis est ad momentum inscriptæ sphære in ratione quadruplicata semiaxium, si sphærois
 re-

revolvatur circa axem: si vero revolvatur circa aliquam diametrum *Æquatoris*, atque accedat proxime ad sphaeram, erit in ratione semiaxium triplicata.

DEMONSTRATIO.

Pars prior. Ductis planis quibuscumque axi sphaeroidis perpendicularibus, in primo casu, erunt momenta circulorum, qui in sphaeroide, & sphaera inscripta secari possunt in ratione radiorum quadruplicata, sive in constanti ratione $A^4 : a^4$. Quare momentum totius sphaeroidis erit ad momentum inscriptae sphaerae in ratione quadruplicata semiaxis majoris ad minorem. *Q. E. I.^m*

Pars altera. Quod si vero ducantur quocumque plana diametro *Æquatoris perpendicularia*, & sphaerois insuper ad sphaeram proxime accedat, erunt momenta sectionum omnium sphaeroidis, & sphaerae circumscriptae in constanti ratione $a^3 : A^3$. Sunt vero momenta sphaerae circumscriptae, & sphaerae inscriptae ut $A^3 : a^3$. Itaque erit momentum sphaeroidis ad momentum inscriptae sphaerae ut $A^3 : a^3$, sive in ratione triplicata semiaxium. *Q. E. D.*

COROLLARIUM PRIMUM.

Differentia momentorum sphaerae, & sphaeroidis circa axem suum revolutae erit ad momentum totius sphaeroidis ut $A - a^4 : A^4 = 4\phi a : A$. Quod si sphaerois revolvatur circa aliquam *Æquatoris* diametrum, erit differentia momentorum ad momentum sphaeroidis ut $3\phi a : A$. Duæ vero differentiae inter se erunt ut $4 : 3$.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Si vis acceleratrix in *Æquatore* sphaerae inscriptae sit $\frac{g}{A}$, adeoque momentum sphaerae $= \frac{4p a^3}{15 A}$; erit momentum sphaeroidis revolutae circa axem figurae $= \frac{4p A^3 a^4}{15}$, & momen-

mentum sphæroidis circa diametrum Æquatoris aliquam revolutæ = $\frac{4}{15} p A^2 a^2 \omega$.

COROLLARIUM TERTIUM.

Differentia momentorum sphæræ, & sphæroidis ^{revolutæ} circa axem erit = $\frac{4}{15} p a \omega (A^2 - a^2) = \frac{16}{15} p \phi a^2 \omega$. Erit autem momentorum sphæræ, & sphæroidis circa diametrum Æquatoris revolutæ differentia = $\frac{12}{15} p \phi a^2 \omega$.

PROPOSITIO SEXTA.

Si corpori cuicumque imprimatur vis aliqua, qua circa datum axem rotari incipiat; quantitas momentorum in particulis singulis oscillantibus æquabitur semper momento vis impressæ.

DEMONSTRATIO.

Sit centrum rotationis *O*, *fig. 2.*, & momentum vis impressæ æquetur momento *M. AO. v* corporis *M* in locum *A* cum velocitate *v* impingentis. Tum per puncta omnia *A, B, C, D* &c. rectæ *AO* ductis rectis quibuscumque rotationis axi parallelis, particula singula in stratis cylindricis dispositæ, quæ rectarum singularum revolutione circa axem ipsum describi possent, considerentur veluti si essent in locis *A, B, C, D* &c. ad æquales ab axe distantias constitutæ, & summa particularum omnium sit *A, B, C, D* &c. Manifestum est, quod Johannes Bernoullius demonstravit in Propositionibus Mechanico-Dynamicis art. vii., eandem vim acceleratricem angularem particulis singulis impressam iri, quæ a corpore *M* unico corpori $\frac{AO^2 \cdot A + BO^2 \cdot B + CO^2 \cdot C + DO^2 \cdot D}{AC^2}$ &c.

in loco *A* constituto imprimeretur. Jam vero si corpus hu-
jus-

jusmodi a corpore M impelleretur in loco A , esset commu-

$$\text{nis velocitas post ictum} = \frac{M.v}{AO^2.A + BO^2.B + CO^2.C + DO^2.D \&c.}$$

$$= \frac{AO^2.M.v}{AO^2.A + BO^2.B + CO^2.C + DO^2.D \&c.} \text{ quæ etiam esset ve-}$$

locitas particularum omnium A . Hoc autem dato velocitas absoluta particularum omnium B evaderet =

$$\frac{AO.BO.M.v}{AB^2.A + BO^2.B + CO^2.C + DO^2.D \&c.}, \text{ \& velocitas particu-}$$

$$\text{larum } C, \& D = \frac{AO.CO.M.v + AO.DO.M.v}{AO^2.A + BO^2.B + CO^2.C + DO^2.D \&c.},$$

\& summa velocitatum omnium =

$$\frac{AO^2.M.v + AO.BO.M.v + AO.CO.M.v + AO.DO.M.v}{AO^2.A + BO^2.B + CO^2.C + DO^2.D \&c.}$$

\& summa omnium momentorum =

$$= \frac{AO^3.M.A.v + AO.BO^2.M.B.v + AO.CO^2.M.C.v + AO.DO^2.M.D.v}{AO^2.A + BO^2.B + CO^2.C + DO^2.D \&c.}$$

$$= M.AO.v, \text{ ut erat antea. } Q. E. D.$$

COROLLARIUM PRIMUM.

Alia igitur in corporibus libere sibi occurrentibus, alia in corporibus circa axem rotantibus, aut oscillantibus lex erit, ut cum illa ante, \& post ictum eandem quantitatem motus tueantur, eandem hæc tueantur semper quantitatem momentorum: Neque enim esse potest

$$\frac{AO^2.M.A.v + AO.BO^2.M.B.v + AO.CO^2.M.C.v + AO.DO^2.M.D.v}{AO^2.A + BO^2.B + CO^2.C + DO^2.D \&c.}$$

$$= M.v, \text{ nisi sit } AO = BO = CO \&c.$$

COROLLARIUM SECUNDUM.

Si binæ, aut plures vires, quæ datos angulos suis directionibus efficiant, imprimantur simul in puncto A , \& quærat^{vis}

vis, quæ ex iis viribus omnibus componitur, momentum vis compositæ æquabitur semper momento singularum particularum circa centrum rotationis O abreptarum: Et quia vis, quæ ex viribus omnibus componitur minime æquatur summæ virium componentium; summa momentorum omnium, quæ ex viribus singulatim impressis orirentur, in communicatione motus eadem non tuebitur.

PROPOSITIO SEPTIMA.

Si corpus aliquod revolvatur circa axem, & sit OFQ , fig. 3., qualibet sectio, plano per axem transeunte facta, & perpendicularis axi in puncto O , ac circa OF compleatur rectangulum $FQOR$; dico quod rotationis velocitas in puncto F æqualebitur duabus velocitatibus punctorum Q , & R .

DEMONSTRATIO.

Esto ds angulus, quem punctum quodcumque aliud ab axe motus quantitate A dislitum elemento temporis dt absoluit, adeoque sit $A ds$ arcus eodem tempore descriptus, & $\frac{A ds}{dt}$ velocitas. Erit $\frac{OF \cdot ds}{dt}$ velocitas puncti F secundum rectam FV rectæ OF perpendicularem. Hæc vero in duas alias secundum FR , RV resolvi poterit: Et erit velocitas secundum FR concepta $= \frac{FR \cdot OF \cdot ds}{FV \cdot dt} = \frac{OR \cdot OF \cdot ds}{OF \cdot dt} = \frac{OR \cdot ds}{dt}$, æqualis scilicet velocitati puncti R . Erit etiam velocitas secundum rectam rectæ RV parallelam $= \frac{RV \cdot OF \cdot ds}{FV \cdot dt} = \frac{FR \cdot ds}{dt} = \frac{OQ \cdot ds}{dt}$, æqualis pariter velocitati, qua punctum Q circa axem volvitur. $Q. E. D.$

COROLLARIUM.

Si eidem corpori duo rotationis motus circa duos axes Hb , Zz , fig. 4., impressi sint, & sit $\frac{Adt}{dt}$ velocitas puncti alicujus in communi sectione duorum Æquatorum positi, & a centro distanti quantitate A , circa priorem axem Hb concepta, ω vero sit vis acceleratrix, & ωdt velocitas ejusdem puncti circa axem alterum Zz : tum etiam ex puncto F ad libitum assumpto in planum duorum axium $HZbz$ demittatur perpendicularum FR , & ex R in Hb , Zz duo alia perpendiculara RO , RB ; velocitates duæ puncti F circa axes Hb , Zz quatuor aliis æquivalent, quarum binæ directionem habeant plano $HZbz$ perpendicularem, & sint æquales velocitatibus binis puncti R circa axes ipsos, duæ autem aliæ directiones habeant RO , BR , & sint $\frac{FR \cdot dt}{dt}$, & $\frac{FR \cdot \omega dt}{A}$.

PROPOSITIO OCTAVA.

Isdem positis dico quod duæ rotationis velocitates se destruent in recta aliqua Mm , quæ sit in plano duorum axium, & ad axes ipsos ita inclinetur, ut sinus anguli MTH ad sinum anguli MTZ se habeat sicuti velocitas ωdt ad velocitatem $\frac{Adt}{dt}$.

DEMONSTRATIO.

Pars prior ex eo facile colligitur, quod cum velocitates conceptæ circa axes Hb , Zz sint proportionales distantia ab ipsis axibus, destruere se invicem non possunt, nisi opponantur: opponuntur autem in plano $HZbz$, quod per utrumque axem traducitur.

Pars

Pars altera. In eodem plano accipiatur punctum quodcumque M , & sint $\frac{MN \cdot ds}{dt}$, & $\frac{ML \cdot \omega dt}{A}$ velocitates puncti circa duos axes Hb , Zz . Quo in loco velocitates duæ sibi invicem oppositæ se destruent erit $\frac{MN \cdot ds}{dt} = \frac{ML \cdot \omega dt}{A}$. Et quia ratio $MN : ML$ in tota recta Mm constans est, in ea recta velocitates duæ se destruent, quæ jaceat in plano duorum axium, & ab axibus declinet angulis MTH , MTZ , quorum sinus MN , ML sint proportionales velocitatibus ωdt , & $\frac{A ds}{dt}$. Quod erat alterum.

COROLLARIUM PRIMUM.

Si angulus HTZ , quo bini priores axes se interfecant, sit rectus, etiam angulus LMN rectus erit, & $\frac{MN}{ML} = \frac{\omega dt}{\frac{A ds}{dt}}$ evadet tangens anguli MTH : scilicet tangens deviationis axis Mm ab axe Hb erit quarta proportionalis ad $\frac{A ds}{dt}$, ωdt , & sinum totum.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Si bini motus rotationis sphaeroidi oblatae simul imprimantur circa axem figuræ, & diametrum Æquatoris aliquam, & sit $\frac{A ds}{dt}$ velocitas maxima circa axem, & ωdt velocitas circa diametrum, & momentum particularum omnium circa diametrum vi acceleratrice ω abreptarum vocetur S ; erit, per *Coroll. 2. Propos. 5.*, $\frac{4}{15} p A^2 \omega = S$, & inde eruetur $= \frac{15 S}{4 p A^2 \omega}$, & $\frac{MN}{ML} = \frac{15 S ds}{4 p A^2 \omega^2 dt}$.

Co-

COROLLARIUM TERTIUM.

Est vero soliditas sphæroidis $= \frac{2}{3} p A^2 a$. Quare si hæc soliditas vocetur M , emerget $\frac{MN}{ML} = \frac{5 S d r^2}{2 a M . A a d s}$, & si sphærois ad sphæram proxime accedat, & sit proxime $A = a$ evadet tangens anguli $MTH = \frac{5 S d r^2}{2 M a^2 d s}$.

PROPOSITIO NONA.

Duco insuper velocitates in punctis omnibus plani $HZbz$ compositas esse proportionales distantis a recta Mm .

DEMONSTRATIO.

Ducantur enim RA , RO perpendiculares rectis TM , TH , & RO producatæ usque ad TG perpendicularem rectæ Zz . Sit PQ parallela TG , RV parallela Zz , & jungatur QO . Erunt $\frac{RO \cdot ds}{ds}$, & $\frac{RB \cdot u ds}{A}$ velocitates puncti R circa axes Hb , Zz , & differentia velocitatum

$$\frac{A \cdot RO \cdot ds - RB \cdot u ds}{A ds}. \text{ Est autem } ds = \frac{ML \cdot u ds}{A \cdot MN} = \frac{PQ \cdot u ds}{A \cdot PO}.$$

$$\text{Itaque erit eadem differentia} = \frac{RO \cdot PQ \cdot u ds - RB \cdot u ds}{\frac{P \cdot O}{A ds}}$$

$$= \frac{\frac{RP + PO}{PO} \cdot RB + PV \cdot u ds - RB \cdot u ds}{A ds} =$$

$$\frac{RP \cdot PQ + PO \cdot PV \cdot u ds}{A \cdot PO}. \text{ Est rursus } RP = \frac{TP \cdot RA}{TO} =$$

$$\frac{TM \cdot RA}{TN}, \text{ \& } \frac{PQ}{PO} = \frac{ML}{MN}. \text{ Denique, ob angulum } RPV \propto$$

qua-

qualem angulo TKO , erit $PV = \frac{RP \cdot OK}{TK} = \frac{OK \cdot TM \cdot RA}{TK \cdot TN}$.
 Evadet igitur duarum velocitatum differentia =
 $\frac{TM \cdot ML}{A \cdot TN \cdot MN} + \frac{OK \cdot TM}{A \cdot TK \cdot TN} \cdot RA \cdot \omega dt$, scilicet ob constantes
 TM, ML, TN, MN , & datam rationem $\frac{OK}{TK}$ proportio-
 nalis erit distantiae RA a recta Mm . \mathcal{Q} . $E. D$.

COROLLARIUM.

Si angulus HTZ sit rectus erit $ML = TN$, & $OK =$
 o , & fiet eadem differentia = $\frac{TM \cdot RA \cdot \omega dt}{A \cdot MN} =$
 $\frac{RA}{A} \cdot \nu \left(\omega^2 dt^2 + \frac{A^2 d^2 s}{ds^2} \right)$: quia scilicet est $TM =$
 $\nu (MN^2 + ML^2) = \frac{MN}{\omega dt} \left(\omega^2 dt^2 + \frac{A^2 d^2 s}{ds^2} \right)$.

PROPOSITIO DECIMA.

Si corpori cuicumque bini motus impressi sint, quorum u-
 no circa axem Hb , altero circa Zz revolvi incipiat; dico
 quod compositis motibus circa axem Mm corpus revolvetur.

DEMONSTRATIO.

Per Corollarium *Propos. 7.*, velocitates duæ puncti F
 circa axes Hb, Zz in quatuor alias resolvi poterunt, qua-
 rum priores duæ æquales erunt duabus velocitatibus puncti
 R circa eodem axes, adeoque per antecedentem Propositi-
 onem component velocitatem $\frac{TM \cdot ML}{A \cdot TN \cdot MN} + \frac{OK \cdot TM \cdot RA \cdot \omega dt}{A \cdot TK \cdot TN}$.

Duæ vero aliæ velocitates $\frac{FR \cdot ds}{ds}$, $\frac{FR \cdot \omega dt}{A}$ directiones ha-
 bebunt RO, BR , & inter se erunt ut $\frac{A ds}{ds} : \omega dt = ML : MN$
 $= P \mathcal{Q}$

$= P Q : P O$. Porro si ducatur AC parallela rectæ BR , erit angulus ACR æqualis angulo OPQ . Tum quia anguli PQT , TOP recti sunt, circulus qui transit per puncta P , Q , T , transibit etiam per punctum O , æqualesque erunt anguli PQO , PTO eidem chordæ PO insidentes, & similia erunt triacula OPQ , ACR , & erit $PQ : PO = RC : CA$. Duæ igitur velocitates, quæ directiones habent RO , BR component velocitatem proportionalem rectæ FR in directione RA . Hæc autem cum velocitate $\frac{TM \cdot ML + OK \cdot TM}{A \cdot TN \cdot MN} \cdot RA$ componet velocitatem, quæ directione sua perpendicularis erit rectæ FA , & quantitate ipsi FA proportionalis. Velocitas igitur, quæ in puncto F ex velocitatibus omnibus componitur proportionalis erit distantie a recta Mm , & puncta omnia uno angulari motu circa axem Mm revolvuntur. $Q. E. D.$

COROLLARIUM.

Patet igitur sine ulla partium dissociatione non in sphaeroides solum, & sphaera, sed in alio etiam quocumque corpore binos motus rotationis in motum unum componi, eadem prorsus ratione, qua duæ vires duobus lateribus parallelogrammi alicujus expressæ tertiam vim component, quæ diagonali exprimitur. Et quo modo ex pluribus viribus unica semper consurgit; ita si tres, quatuor, aut plures etiam rotationis motus imprimantur circa idem centrum, unicus rotationis motus circa axem positione datum exorietur.

SCHOLIUM.

Si aut idem semper maneret axis figuræ, & rotationis, aut bini rotationis motus non nisi post finitum quodcumque tempus inter se invicem componerentur, componi utique sine aliqua dissociatione partium, & totius corporis solutione nequaquam possent. Verum quia bini motus rotationis singulis temporis instantibus componi debent: primo novus axis

axis

xis compositi motus oritur: secundo instantaneus axis rotationis ex datis duarum rotationum velocitatibus determinabitur: tertio elisis illis portionibus velocitatum, quæ sibi invicem opponuntur, velocitas in particulis singulis residua proportionalis erit distantiae ab axe motus, & directione sua erit rectæ ad axem ductæ perpendicularis: quibus positis intelligitur facile sine partium disgregatione binos motus componi posse. Ita igitur satis superque posterioribus hisce Theorematis stabilivimus quod theoriæ præcessionis Æquinoctiorum, nutationis terrestris axis, & variationis obliquitatis Ellipticæ fundamentum, ac basis erit. Prioribus etiam theorematis definivimus veram rationem motuum, & momentorum sphaeræ, & sphaeroidis circa axem, aut circa aliquam Æquatoris diametrum revolutæ. Sexta autem propositione demonstravimus in corporibus oscillantibus, ac rotantibus non eandem quidem quantitatem motus, sed eandem quantitatem momentorum conservari. Quod licet a Newtono negatum sit, qui in *Prop. 39. Lib. 3. Princip. Mathem.* eandem semper quantitatem motus tueri statuit; manifestum est tamen conservationem motus non nisi in corporibus liberis habere locum. En casum simplicissimum. Corpus *A* virga inflexili *AC* alligatum, *fig. 5.*, circa immobile punctum *C* oscilletur, & corpus aliud *B* in motum agat. Sit *v* velocitas, qua primum oscillari incipit corpus *A*, & *u* velocitas, quam in corpus *B* agendo amittit, adeoque velocitas residua *v - u*. Erit vis tota, qua in corpus *B* aget =

$$\frac{A \cdot AC \cdot u}{BC}, \text{ \& velocitas a corpore } B \text{ acquisita} = \frac{A \cdot AC \cdot u}{B \cdot BC}.$$

Quia vero corpora *A*, & *B* eadem virga inflexili *AC* alligata, post communicationem motus, eadem etiam velocitate angulari moveri debent, erit $v - u : \frac{A \cdot AC \cdot u}{B \cdot BC} = AC :$

$$BC. \text{ Inde vero eruetur } u = \frac{B \cdot BC \cdot v}{A \cdot AC + B \cdot BC}, \text{ \& } v - u =$$

$$\frac{A \cdot AC \cdot v}{A \cdot AC + B \cdot BC}, \text{ adeoque summa momentorum post ictum}$$

D

crit

$$\begin{aligned}
 \text{erit} &= \frac{A \cdot AC^2 \cdot v}{A \cdot AC^2 + B \cdot BC^2} + \frac{A \cdot B \cdot AC \cdot BC \cdot u}{B \cdot BC^2} = \\
 &\frac{A \cdot AC^2 \cdot v + A \cdot B \cdot AC \cdot BC \cdot u}{A \cdot AC^2 + B \cdot BC^2} = A \cdot AC \cdot v. \text{ Quantitas} \\
 \text{autem motus erit post ictum} &= A \cdot \sqrt{-u} + \frac{B \cdot A \cdot AC \cdot u}{B \cdot BC^2} \\
 &= \frac{A \cdot AC^2 \cdot v + B \cdot A \cdot AC \cdot BC \cdot u}{A \cdot AC^2 + B \cdot BC^2}.
 \end{aligned}$$

P A R S A L T E R A .

De momento virium a Sole, ☉ Luna in exteriorem terram exercitarum.

PROPOSITIO UNDECIMA.

SI sit $APBp$ fig. 6., circulus declinationis Solis, ATB Aequator, Pp axis Terræ, & Qq planum, cui recta ST a centro Solis ad centrum Terræ ducta normaliter insistit; momentum particulæ A , quæ est in intersectione Aequatoris, & circuli declinationis, ad Terram circa centrum volvendam, erit in ratione directa simplici sinus, & cosinus declinationis Solis, & reciproca triplicata distantiae ST .

DEMONSTRATIO.

Si vis, qua in Solem trahitur centrum T , sit $= \frac{S}{ST^2}$, erit vis particulæ A in directione $SA = \frac{S}{SA^2}$, & vis, quæ secundum directionem ST impendetur $= \frac{S \cdot ST}{SA^3}$. Ex A in ST ducatur perpendicularum AF . Quia ob maximam Solis distantiam recta SA proxime æqualis cenferi potest rectæ $ST - FT$, & possunt negligi altiores ipsius FT potestates;

tes; erit differentia virium in directione ST trahentium =
 $S \cdot ST \left(\frac{1}{SA^3} - \frac{1}{ST^3} \right) = S \cdot ST \left(\frac{1}{ST^3} - \frac{1}{3ST^2 \cdot FT} - \frac{1}{ST^3} \right)$
 $= \frac{3S \cdot FT}{ST^3}$. Jam vero si angulus STA , quo Sol declinat ab
 Æquatore, vocetur V , & radius Æquatoris sit $= A$; erit
 $FT = A \cdot \cos. V$, $AF = A \cdot \sin. V$, vis qua particula A
 secundum directionem ST distrahitur a centro $T =$
 $\frac{3S \cdot A \cdot \cos. V}{ST^3}$, & ea vis hujus portio, quæ perpendicularis
 est Æquatori $= \frac{3S \cdot A \cdot \cos. V}{ST^3} \cdot \frac{AF}{AT} = \frac{3S \cdot A \cdot \sin. V \cdot \cos. V}{ST^3}$,
 ac denique momentum ejusdem vis ad terram totam circa
 centrum volvendam erit $= \frac{3S \cdot A^2 \cdot \sin. V \cdot \cos. V}{ST^3} \cdot \mathcal{Q} \cdot E \cdot \mathcal{D}$.

COROLLARIUM.

Si minor femiaxis terræ vocetur a , & sit $A - a = \phi a$,
 erit materiæ quantitas in tota terra circa inscriptam sphaeram
 redundans $= \frac{4}{3} \rho \phi a^3$, & momentum particularum totidem
 in loco A constitutarum erit $= \frac{3S \cdot \sin. V \cdot \cos. V}{ST^3} \cdot \frac{4}{3} \rho \phi a^3$,
 aut si terra quamproxime ad figuram sphaericam accedat, e-
 rit $= \frac{3S \cdot \sin. V \cdot \cos. V}{ST^3} \cdot \frac{4}{3} \rho \phi a^3$.

PROPOSITIO DUODECIMA.

Si sit $ANBn$, *fig. 7.*, terræ Æquator, Nn intersectio
 Æquatoris cum plano Eclipticæ NCn , SAT planum cir-
 culi declinationis Solis, & radio TA , ac centro T descri-
 batur circularis arcus AC Æquatori in puncto A perpen-
 dicularis; erit momentum idem directe ut quadratum sinus
 CH longitudinis Solis CN , & reciproce ut factum ex sinu
 AG ascensionis rectæ AN in cubum distantiae ST .

D 2

D E-

DEMONSTRATIO.

In triangulo sphærico rectangulo ANC erit tangens anguli ANC inclinationis \AA equatoris, & E clipticæ ad tangentem arcus AC declinationis Solis, ut sinus totus ad sinum arcus AN , scilicet erit $\frac{\pi}{\sqrt{(1-\pi^2)}} : \frac{\sin. V}{\cos. V} = A : AG$, & prodibit $\cos. V = \frac{A \cdot \sin. V \cdot \sqrt{(1-\pi^2)}}{\pi \cdot AG}$, si sinus inclinationis ejusdem ad sinum totum se habeat ut $\pi : 1$. Est vero in eodem triangulo sinus anguli ANC ad sinum totum, ut sinus arcus AC ad sinum arcus CN , sive est $\sin. V = \frac{\pi \cdot CH}{A}$. Momentum igitur $\frac{3S \cdot A^2 \cdot \sin. V \cdot \cos. V}{ST^3}$ erit $= \frac{3S \cdot A^3 \cdot \sin. V^3 \cdot \sqrt{(1-\pi^2)}}{\pi \cdot AG \cdot ST^3}$
 $= \frac{3S \cdot A \pi \sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^3}{AG \cdot ST^3}$. Q. E. D.

COROLLARIUM PRIMUM.

Pari ratione si exterior Terra constitueretur in loco A , evaderet momentum omne $\frac{3S \cdot \pi \sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^3}{AG \cdot ST^3} \cdot \frac{4}{3} p \phi a^3 A$.
 Et si Terra ad figuram sphæricam proxime accedat, aut sit NAE \AA equator sphærae, quæ sphæroidicæ terræ inscribi potest, & particulae omnes, quæ in Terra exterius circumambiant sphæram ipsam, in loco A constitutæ intelligantur, erit virium omnium momentum $= \frac{3S \cdot \pi \sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^3}{AG \cdot ST^3} \cdot \frac{4}{3} p \phi a^4$.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Si sinus declinationis Lunæ ab \AA equatore vocetur v , & sit planum Lunaris orbitæ $DOMOM$, & Luna maneat in loco L , & sit attractio centri T in Lunam $= \frac{L}{LT^2}$, erit Luna-

narium virium momentum $= \frac{3L \cdot \sin. \varphi \cdot \cos. \varphi}{L T^3} \cdot \frac{4}{3} p \phi a^3 A^2$,
 aut, si Ag , & Db , sint perpendiculara ex A , & D ducta in
 nodorum lineam Oo , erit momentum idem $=$
 $\frac{3L \cdot \sin. AOD \cdot \cos. AOD \cdot Db^2}{Ag \cdot LT^3} \cdot \frac{4}{3} p \phi a^3 A^2$.

PROPOSITIO DECIMATERTIA.

Iisdem positis momentum particularum omnium per totum
 Æquatoris circuitum dispositarum, ad Æquatorem torquen-
 dum, dimidium erit momenti particularum totidem consti-
 tuarum in loco A : Et motus iste circa axem in communi
 sectione Æquatoris, & plani QTq , cui recta ST perpendi-
 cularis est, jacentem peragetur.

DEMONSTRATIO.

Pars prior. Sumatur in Æquatore punctum quodcumque
 R , fig. 6., ex eoque in planum QTq ducatur perpendicu-
 lum RO . Erunt vires, quibus puncta A , & R a plano QTq
 diitrahentur, ut AG , & RO , & vires perpendicularares pla-
 no Æquatoris ut $\frac{AG \cdot TG}{AT}$, & $\frac{RO \cdot TO}{RT}$, momenta vero ut $AG \cdot$
 TG , & $RO \cdot TO$, sive, ob datum angulum ATG , ut
 AT^2 , & RT^2 . Momentum igitur particularum omnium per
 totum Æquatoris circuitum dispositarum erit ad momentum
 particularum totidem consistentium in loco A ut summa
 omnium RT^2 ad summam omnium AT^2 , sive ut unum ad
 duo. *Q. E. 1.^m*

Pars altera. Quia vero vires particularum A , & B in æ-
 qualibus distantis a plano QTq hinc inde æquales sunt, &
 contrariæ; dum abducentur particulæ a plano ipso, conver-
 tent Æquatorem, ac totam terram circa axem, qui tam in
 plano QTq , quam in plano Æquatoris jaceat *Q. E.* alterum.

COROLLARIUM.

Si tota exterior terra non quidem statueretur in loco A , sed per totum \AA quatoris circuitum uniformiter distribueretur ad modum annuli; esset momentum particularum omnium

$$= \frac{3S \cdot \sin V \cdot \cos V}{ST_3} \cdot \frac{2}{3} p \phi a^3 A^1 =$$

$$\frac{3S \cdot \pi V(1 - \pi^2) \cdot CH^2}{AG \cdot ST_3} \cdot \frac{2}{3} p \phi a^3 A, \text{ \& momentum virium}$$

$$\text{Lunarium esset } \frac{3L \cdot \sin v \cdot \cos v}{LT_3} \cdot \frac{2}{3} p \phi a^3 A^1 =$$

$$\frac{3L \cdot \sin AOD \cdot \cos AOD \cdot Dh^2}{Ag \cdot LT_3} \cdot \frac{2}{13} p \phi a^3 A.$$

PROPOSITIO DECIMAQUARTA.

Si sit ab , *fig. 8.*, \AA quator inscriptæ sphaeræ, & iX *d* circulus eidem \AA quatori parallelus; erit momentum particularum omnium per totum parallelum circulum uniformiter distributarum ad momentum particularum totidem consistentium in loco a , ut $1 - \frac{3TX^2}{aT^2} : 2$.

DEMONSTRATIO.

Sint L , & l particulae duæ quævis inter se æquales, & in planum QTq demittantur perpendicularia LM , lm . Erunt LM , MT , lm , mT vires ipsarum particularum ad totum parallelum circulum torquendum circa centrum T . Jam vero si ejusdem circuli, & plani QTq intersectio sit O , ob similitudinem angulorum agT , TXO , LMO , lmo , crit MO

$$= \frac{TG \cdot LX}{aT}, TO = \frac{aT \cdot TX}{ag}, LM = \frac{ag \cdot LX}{aT} + \frac{Tg \cdot TX}{aT}, MO$$

$$= \frac{Tg \cdot LX}{aT} + \frac{Tg^2 \cdot TX}{aT \cdot ag}, lm = \frac{ag \cdot LX}{aT} - \frac{Tg^2 \cdot TX}{aT}, Om =$$

Tg .

$$\begin{aligned}
& \frac{T_g \cdot LX}{aT} - \frac{T_g^2 \cdot TX}{aT \cdot ag}, \text{ \& utriusque particulæ momentum =} \\
& \left(\frac{ag \cdot LX}{aT} - \frac{T_g \cdot TX}{aT} \right) \left(\frac{aT \cdot TX}{ag} + \frac{T_g \cdot LX}{aT} - \frac{T_g^2 \cdot TX}{aT \cdot ag} \right) - \\
& \left(\frac{ag \cdot LX}{aT} + \frac{T_g \cdot TX}{aT} \right) \left(\frac{aT \cdot TX}{ag} - \frac{T_g \cdot LX}{aT} - \frac{T_g^2 \cdot TX}{aT \cdot ag} \right) \\
& = \frac{2ag \cdot T_g \cdot LX^2}{aT^2} - \frac{2T_g \cdot TX^2}{aT^2} + \frac{2T_g^2 \cdot TX^2}{aT^2 \cdot ag} = \frac{2ag \cdot T_g \cdot LX^2}{aT^2} \\
& - \frac{2ag \cdot T_g \cdot TX^2}{aT^2} : \text{scilicet momentum idem ad momentum} \\
& 2ag \cdot T_g \text{ duarum particularum in loco } a \text{ consistentium se} \\
& \text{habebit ut } LX^2 - TX^2 : aT^2. \text{ Jam vero summa omnium} \\
& LX^2 \text{ per totam circuli peripheriam dimidia est summæ toti-} \\
& \text{dem } iX^2, \text{ \& sunt omnes } iX^2, TX^2 \text{ ad summam toti-} \\
& \text{dem } aT^2, \text{ ut } iX^2, TX^2 \text{ ad } aT^2. \text{ Momentum igitur to-} \\
& \text{tius circuli se habebit ad momentum particularum omnium} \\
& \text{translatarum in locum } a \text{ ut } \frac{1}{2} iX^2 - TX^2 : aT^2 = iX^2 - \\
& 2TX^2 : 2aT^2 = aT^2 - 3TX^2 : 2aT^2 = 1 - \frac{3TX^2}{aT^2} : 2. \\
& \text{Q. E. D.}
\end{aligned}$$

COROLLARIUM PRIMUM.

Quia vero, per *Propos.* 3., momentum particularum in a existentium duplum est momenti particularum totidem per totum *Æquatoris* sphaeræ inscriptæ circuitum uniformiter dispositarum; erit momentum paralleli circuli iXd ad momentum, quod præferrent ipsius particulæ si per totum *Æquatoris* sphaeræ inscriptæ circuitum uniformiter distribuerentur ut $1 - \frac{3TX^2}{aT^2} : 1$.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Si inter A , & a accipiatur punctum quodcumque v , & semiaxibus Tv , Tp describatur Ellipsis $Pvop$, ob $Tv : Xo = Ta$

$= Ta : Xi$, erunt momenta particularum omnium per circulos radiis Tv , & Xo descriptos uniformiter distributarum proportionalia momentis circulorum Ta, Xi , & momentum totius zonæ circularis latitudinis Ii erit ad momentum particularum totidem uniformiter distributarum per zonam aliam circulem latitudinis Aa ut $1 - \frac{3TX^2}{aT^2} : 1$.

COROLLARIUM TERTIUM.

Quia vero ob affinitatem terræ sphaeroidicæ, & sphaeræ momentum zonæ circularis latitudinis Aa proxime æquale censi poterit momento particularum totidem per totum circuitum $\text{Æquatoris } ATB$ uniformiter distributarum; erit momentum zonæ circularis latitudinis Ii ad momentum particularum totidem uniformiter distributarum in Æquatore ut $1 - \frac{3TX^2}{aT^2} : 1$.

PROPOSITIO DECIMAQUINTA.

Momentum totius materiæ, qua sphaeroidica Terra sphaeram $Papb$ superat, est ad momentum particularum totidem per totum Æquatoris circuitum uniformiter distributarum ut $2:5$.

DEMONSTRATIO.

Siquidem ex natura Ellipseos est $PT.Tp:PX.Xp = Ta^2:Xi^2 = TA^2:XI^2 = TA^2 - Ta^2:XI^2 - Xi^2$, scilicet zona circularis latitudinis Ii proportionalis est quadrato femiordinatæ Xi , adeoque momentum totius zonæ, per *Coroll. 3. Prop. 4.*, erit ad momentum particularum totidem per totum Æquatoris circuitum uniformiter distributarum ut $Xi^2 - \frac{3Xi^2 \cdot TX^2}{aT^2} : Xi^2 = aT^2 - TX^2 - 3TX^2 + \frac{3TX^4}{aT^2} : aT^2$

$-TX$

$-TX^2$, & momentum indeterminati segmenti sphæroidici $AaiI$ erit ad momentum particularum totidem existentium in Æquatore ut $aT \cdot TX - \frac{4}{3} TX^2 + \frac{3TX^3}{5 \cdot aT^2} : aT^2 \cdot TX - \frac{1}{3} TX^3$, ac denique momentum materiæ totius exterioris erit ad momentum, quod præferret materies eadem, si per totum Æquatoris circuitum uniformiter distribuere-
 tur ut $\frac{4}{15} \cdot aT^3 : \frac{2}{3} \cdot aT^3 = 2 : 5$. \mathcal{Q} . E . D .

COROLLARIUM PRIMUM.

Si Terra omnis exterior consistat in locis suis, erit momentum virium Solarium ad totam terram torquendam circa communem sectionem Æquatoris, & plani illius, quod per centrum traducitur, & perpendiculare est rectæ jungenti

$$\text{centra Terræ, \& Solis} = \frac{3S\pi\sqrt{(1-\tau^2)} \cdot CH^2}{AG \cdot ST^3} \cdot \frac{4}{15} p\phi a^3 A$$

$= \frac{3S \cdot \sin V \cdot \cos V}{ST^3} \cdot \frac{4}{15} p\phi a^3 A^2$. Erit etiam Lunarum virium momentum ad torquendam terram circa sectionem Æquatoris, & plani alterius per centrum ducti, cui perpendicularis sit recta conjungens centra Terræ, & Lunæ =

$$\frac{3L \cdot \sin AOD \cdot \cos AOD \cdot Db^2}{Ag \cdot LT^3} \cdot \frac{4}{15} p\phi a^3 A =$$

$$\frac{3L \cdot \sin v \cdot \cos v}{LT^3} \cdot \frac{4}{15} p\phi a^3 A^2.$$

COROLLARIUM SECUNDUM.

Quia est $A = a + \phi a$, ac possunt negligi quadraticæ potestates ipsius ϕa , erit momentum omne Solarium virium =

$$\frac{3S\pi\sqrt{(1-\tau^2)} \cdot CH^2}{AG \cdot ST^3} \cdot \frac{4}{15} p\phi a^3 = \frac{3S \cdot \sin V \cdot \cos V}{ST^3} \cdot \frac{4}{15} p\phi a^3 :$$

quæ est ipsa formula a Cl. Alembertio tradita *probl. 1. num. 10. de præcessionem Æquinoctiorum*, & a Cl. Eulero
E. in

in Commentariis Berolinensibus anni 1749. num. 21. prob. 2.
Coroll. 3.

COROLLARIUM TERTIUM.

Quia vero sphaera omnes æqualiter suis omnibus partibus trahi debent, si sphaera terræ circumscriberetur, esset tota attractio materiæ, qua sphaera eadem circumscripta terram superaret, æqualis attractioni materiæ, qua terra superat inscriptam sphaeram, videlicet $= \frac{3S \cdot \sin.V \cdot \cos.V}{ST^3} \cdot \frac{4}{15} p \phi a^3 A'$.

In *Transact. Philos. anni 1754. sect. 1. probl. 1. de præcess. Æquinoc.* cum redundantem materiam in superficie circumscriptæ sphaeræ distributam conciperet Sylvabellius, differentiam attractionum terræ, & circumscriptæ sphaeræ invenit $= \frac{3S \cdot \sin.V \cdot \cos.V}{ST^3} \cdot \frac{4}{15} p \phi A'$, quæ ob parvitatem quantitatis $A - a$ parum a formula nostra differt.

PROPOSITIO DECIMASEXTA.

Si Terra nucleum sphæroidicum diversæ densitatis in centro habeat determinare momentum virium a Sole, & Luna exercitarum.

RESOLUTIO.

Esto nucleus sphæroidicus $abeq$, fig. 9., & sit major semiaxis nuclei $Ta = B$, semiaxis minor $= b$, differentia majoris, & minoris $= \mu b$, & densitas Terræ exterioris ad densitatem nuclei se habeat ut $1 : 1 + c$. Eodem modo Terra Solis, ac Lunæ viribus agitabitur, ac si tota homogenea esset, & in centro adderetur nucleus sphæroidicus solius densitatis c . Summa autem momentorum istius nuclei ad totam Terram volvendam circa interfectionem Æquatoris, & plani per centrum transcurrentis, cui recta ad Solem ducta normaliter insitat

fiſtat erit = $\frac{3S \cdot \sin. V \cdot \cos. V}{ST^3} \cdot \frac{4}{15} p \mu b^3 B^1 c$, & ſumma momentorum Terræ homogeneæ, & nuclei ſuperadditi erit = $\frac{3S \cdot \sin. V \cdot \cos. V}{ST^3} \cdot \frac{4}{15} p (\varphi a^3 A^2 + \mu b^3 B^1 c)$. Rurſus maſſa nuclei ſphæroidici denſitatis c , eſt $\frac{2}{3} p B^1 b c$, & maſſa totius Terræ $\frac{2}{3} p A^1 a + \frac{2}{3} p B^1 b c$. Quare, ſi hæc maſſa vocetur M , erit momentum virium Solarium = $\frac{3S \cdot \sin. V \cdot \cos. V \cdot M}{5ST^3} \cdot \left(\frac{2\varphi a^3 A^2 + 2\mu b^3 B^1 c}{A^1 a + B^1 b c} \right) = \frac{3S \cdot \sin. V \cdot \cos. V \cdot M}{5ST^3} \cdot \left(\frac{A^1 a (A^2 - a^2) + B^1 b c (B^2 - b^2)}{A^1 a + B^1 b c} \right)$, & momentum Lunarium virium erit = $\frac{3L \cdot \sin. V \cdot \cos. V \cdot M}{5LT^3} \cdot \left(\frac{A^1 a (A^2 - a^2) + B^1 b c (B^2 - b^2)}{A^1 a + B^1 b c} \right) \cdot \mathcal{Q} \cdot E \cdot I$.

COROLLARIUM.

Si interior Telluris nucleus omni materia vacuus intelligatur, qualem Poliniacus, alique autores excogitaverant, quibus materia interior ſupervacanea, & inutilis videbatur, erit $1 + c = 0$, ſive $c = -1$, & Solarium virium momentum in eadem hypotheſi evadet = $\frac{3S \cdot \sin. V \cdot \cos. V \cdot M}{5ST^3} \cdot \left(\frac{A^1 a (A^2 - a^2) - a^3 - B^1 b (B^2 - b^2)}{A^1 a - B^1 b} \right)$. Congruunt hæc omnia cum iis, quæ Eulerus ſecundo problemate jam memoratæ diſſertationis determinaverat.

PROPOSITIO DECIMASEPTIMA.

Determinare momentum idem ſi ad centrum accedendo* Telluris denſitas in data ratione augeatur, vel imminuatur.

E 2

R E-

RESOLUTIO.

Si femiaxis major sphæroidis alicujus sit X , femiaxis minor x , densitas Δ , ellipticitas ϕz , & z denotet functionem aliquam ex femiaxis, & constantibus quantitibus compositam, erit momentum Solarium virium in totam Sphæroidem exercitarum $= \frac{3S \cdot \sin. V \cdot \cos. V}{S T^3} \cdot \frac{4}{15} p \phi z x^3 X^2 \Delta$, & elementum momenti ipsius, sive momentum strati sphæroidici cujuscumque $= \frac{3S \cdot \sin. V \cdot \cos. V}{S T^3} \cdot \frac{4}{15} p \Delta \cdot d(\phi z x^3 X^2)$, & momentum totius Terræ quomodocumque ex stratis sphæroidicis compositæ $= \frac{3S \cdot \sin. V \cdot \cos. V}{S T^3} \cdot \frac{4}{15} p \cdot S \Delta d(\phi z x^3 X^2)$, aut si sphæroidica strata a sphæricis parum differant $= \frac{3S \cdot \sin. V \cdot \cos. V}{S T^3} \cdot \frac{4}{15} p S \Delta \cdot d(\phi z x^5)$. Erit pariter Lunarium virium momentum $= \frac{3L \cdot \sin. v \cdot \cos. v}{L T^3} \cdot \frac{4}{15} p S \Delta \cdot d(\phi z x^5)$. Q. E. I.

COROLLARIUM.

Univerſim ſtatui poterit momentum ex Sole ortum $= \frac{3S \cdot \sin. V \cdot \cos. V \cdot K}{S T^3} = \frac{3S \cdot \pi \sqrt{(1 - \pi^2)} \cdot CH^2 \cdot K}{A \cdot A G S T^3}$, & momentum, quod oritur ex Luna $= \frac{3L \cdot \sin. v \cdot \cos. v \cdot K}{L T^3} = \frac{3L \cdot \sin. A O D \cdot \cos. A O D \cdot D b^2 \cdot K}{A \cdot A g \cdot L T^3}$, denotante K constantem quantitatem, quæ in hypotheſi nuclei ſphæroidici eſt $= \frac{4}{15} p (\phi a^3 A^2 + \mu b^3 B^2 c)$, in hypotheſi homogeneitatis $= \frac{4}{15} p \phi a^3 A^2$, in hypotheſi qualibet denſitatis creſcentis, aut decreſcentis $= \frac{4}{15} p S \Delta \cdot d(\phi z x^5)$.

PRO-

PROPOSITIO DECIMA OCTAVA.

Si Terra circa axem suum uniformiter revolvatur, & Solis, aut Lunæ viribus inclinetur circa aliquam Æquatoris diametrum determinare axem totius compositæ rotationis.

RESOLUTIO.

Esto ATr , *fig.* 10. sive ds angulus quem punctum Æquatoris A elemento temporis dt circa centrum T absolveret, adeoque sit Ads spatium Ar , & $\frac{Ads}{ds}$ velocitas

puncti A , & $\frac{Ads}{ds}$ vis acceleratrix. Si Terra sit homogenea, per *Coroll.* 2. *Proposf.* 5. erit $\frac{4pA^4ads}{15ds^2}$ momentum

diurnæ revolutionis: & si Terra nucleum sphæroidicum diversæ densitatis in centro habeat, erit momentum idem

$\frac{4pA^4ads}{15ds^2} + \frac{4pB^4bcsds}{15ds^2}$: & $\frac{4pds}{15} S \Delta. d(x')$, si Terra ex

stratis sphæroidicis proxime ad sphæricos accedentibus, & diversæ densitatis constet: aut generatim erit momentum idem $= \frac{k \cdot ds}{ds^2}$. Quia vero, per Corollarium Propositionis

antecedentis, momentum Solarium virium est

$\frac{3S \cdot \pi \sqrt{(1-\pi^2)} CH^2 K}{A \cdot AG \cdot ST^3}$, si Terra ad instar penduli conside-

retur suspensi ex centro T , & duo momenta Terræ applicari intelligantur in puncto A , erit momentum prius ad posterius, ut velocitas diurni motus ad velocitatem novæ rotationis, quam vires Solis circa aliquam Æquatoris diametrum producerent. Quare per *Prop.* 8. erit tangens deviationis axis $= \frac{3S \cdot \pi \sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot K \cdot ds^2}{A \cdot AG \cdot ST^3 \cdot k \cdot ds}$, & tangens

deviationis axis ob vires Lunæ =

$$\frac{3L \cdot \sin. AOD \cdot \cos. AOD \cdot D b^2 \cdot K d t^2}{A \cdot A g \cdot L T^3 \cdot d s} \cdot Q. E. I.$$

COROLLARIUM PRIMUM.

Si Terra sit homogenea evadet tangens deviationis axis ob vires Solis = $\frac{3S \cdot \pi \sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot \varphi a^3 d t^2}{A^3 A G \cdot S T^3 \cdot d s}$: & si Terra ex stratis sphæroidicis coalescat, & fiat $x = 1$, hoc est ellipticitas stratorum omnium sit eadem, & strata similia sint inter se; erit $\frac{S \Delta \cdot d(\varphi x x')}{S \Delta \cdot d(x^3)} = \varphi$, eademque evadet axis deviatio, quæ in hypothesi Terræ homogeneæ, in quacumque demum ratione stratorum densitas ad centrum accedendo augeatur, vel imminuatur.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Si stratorum terrestrium ellipticitas accedendo ad centrum augeatur, erit $S \Delta \cdot d(\varphi x x') > S \Delta \cdot d(\varphi x')$ & deviatio axis totius Terræ major erit quam in hypothesi Terræ homogeneæ. Contra deviatio axis evadet minor si sit $S \Delta \cdot d(\varphi x x') < S \Delta \cdot d(\varphi x')$, hoc est si ellipticitas stratorum sphæroidicorum accedendo ad centrum imminuatur.

PROPOSITIO DECIMANONA.

Invenire deviationem axis, circa quem sola exterior terra, sublata interiore omni, ob vires Solis revolveretur.

RESOLUTIO.

Per Coroll. 2. Prop. 1. primæ Partis, momentum terræ exterioris, quæ sublato interiore globo circa axem revolvitur, effcet = $\frac{16 p \varphi a^5 d s}{15 d t^2}$. Quare cum sit momentum Sola-

rium

rium virium = $\frac{3S\pi'(1-\pi^2) \cdot CH^2}{AG \cdot ST^3} \cdot \frac{4}{15} p \phi a^3 A$, simili modo invenietur tangens deviationis axis =

$$\frac{3S\pi'(1-\pi^2) \cdot CH^2 \cdot \frac{2}{15} p \phi a^3 A dt^2}{AG \cdot ST^3 \cdot \frac{16}{15} f \phi a^3 dt} = \frac{3S\pi'(1-\pi^2) \cdot CH^2 \cdot A dt^2}{4AG \cdot ST^3 a^2 dt}$$

Q. E. I.

COROLLARIUM.

Tangentes deviationis axium, circa quos tota Terra, & sola terra exterior revolveretur, inter se essent ut $4\phi a^4 : A^4$, five per *Coroll. 3. Propos. 5.*, reciproce ut momenta totius Terræ, & solius terræ exterioris circa axem revolutæ.

PROPOSITIO VIGESIMA.

Invenire deviationem axis terræ exterioris ad solidum anulum redactæ, qui Æquatori interioris sphaeræ circumponatur.

RESOLUTIO.

Per *Propos. 3.* primæ Partis est $\frac{4}{3} \frac{p \phi a^3 dt^2}{dt^2}$ momentum terræ exterioris si ad solidum Æquatoris anulum reduceretur, & revolveretur circa axem. Quare, per Corollarium *Propos. 3.*, cum sit $\frac{3S\pi'(1-\pi^2) \cdot CH^2}{AG \cdot ST^3} \cdot \frac{2}{3} p \phi a^3 A$ momentum particularum omnium terræ exterioris per Æquatoris circuitum ad modum annuli uniformiter distributarum, evadet tangens deviationis axis = $\frac{3S\pi'(1-\pi^2) \cdot CH^2 \cdot A dt^2}{2AG \cdot ST^3 a^2 dt}$, aut, si idem sit radius annuli, & Æquatoris inclusæ sphaeræ = $\frac{3S\pi'(1-\pi^2) \cdot CH^2 \cdot dt^2}{2AG \cdot ST^3 \cdot a dt}$. Q. E. I.

Co-

COROLLARIUM.

Tangens deviationis axis terræ exterioris dispositæ in locis suis, & ad solidum Æquatoris annulum redactæ inter se erunt ut 1:2. Tangens autem deviationis axis solius annuli ad tangentem deviationis axis totius terræ se habebit ut A^4 : $2\phi a^4$.

SCHOLION.

Observandum est theorema illud, quod in liberis motibus locum habet, & quo cautum est non eandem prorsus velocitatem ab iisdem viribus, aut simul, aut separate agentibus eidem corpori communicari, etiam in rotationis motibus, & rotationum compositione habere locum. Nam si vis omnis Solis $\frac{3S\pi r(1-\pi^2) \cdot CH^2}{AG \cdot ST^3} \cdot \frac{4}{15} \phi \phi a^3 A$ in totam Terram quiescentem ageret, & esset ω vis acceleratrix, quæ puncto Æquatoris A circa diametrum Zz imprimeretur, esset $\frac{4}{15} \phi A^2 a^2 \omega$ momentum totius Terræ circa eandem diametrum nutantis: & quia per *Propos.* 6. quantitas momentorum in particulis singulis rotantibus æquatur semper momento vis impressæ, esset $\frac{4}{15} \phi A^2 a^2 \omega =$

$$\frac{3S\pi r(1-\pi^2) \cdot CH^2 \cdot \phi a^2 A}{AG \cdot ST^3}, \text{ \& u} = \frac{3S\pi r(1-\pi^2) \cdot CH^2 \cdot \phi a}{A \cdot AG \cdot ST^3}$$

$$= \frac{3S \cdot \text{Sin. } V. \cdot \text{Cos. } V. \cdot \phi a}{ST^3} \phi \text{ aut, si retineatur formula in Coroll. 3. } \textit{Propos. 5.} \text{ indicata, \& vocetur } \phi A \text{ differentia semimaxium} = \frac{3S \cdot \text{Sin. } V. \cdot \text{Cos. } V. \cdot \phi A^3}{(A - \phi A)^2 \cdot ST^3} = \frac{3S \cdot \text{Sin. } V. \cdot \text{Cos. } V. \cdot \phi A}{(1-2\phi) \cdot ST^3},$$

prorsus ut Sylveblius *Probl.* 3. *num.* 5. hac ipsa methodo invenerat: tum, si hic motus cum diurnæ rotationis motu componeretur, tangens deviationis axis evaderet =

$\frac{3\pi r(1-\pi^2) \cdot CH^2 \cdot \phi a d t^2}{A^2 \cdot AG \cdot ST^3 d t}$. Pariter quia momentum terræ

exterioris circa diametrum Æquatoris aliquam nutantis est =

$\frac{11\pi a^2 t \omega}{15 A}$, in hypothesi ablatae interioris sphaeræ esset $\omega =$

$\frac{3\pi r(1-\pi^2) \cdot CH^2 \cdot A^2}{a^2 \cdot AG \cdot ST^3}$, & tangens deviationis axis =

$\frac{3\pi r(1-\pi^2) \cdot CH^2 \cdot A d t^2}{a^2 \cdot AG \cdot ST^3 \cdot d t}$. Denique si exterior terra ad fo-

lidum Æquatoris annulum reduceretur, & ob vim Solis inclinaretur circa diametrum aliquam esset $\frac{2}{3} \phi a^4 \omega =$

$\frac{3\pi r(1-\pi^2) \cdot CH^2}{AG \cdot ST^3} \cdot \frac{2}{3} \phi a^4$, & inde prodiret $\omega =$

$\frac{3\pi r(1-\pi^2) \cdot CH^2}{AG \cdot ST^3}$, & tangens deviationis axis =

$\frac{3\pi r(1-\pi^2) \cdot CH^2 \cdot d t^2}{AG \cdot ST^3 \cdot d t}$. Alia igitur velocitas Terræ quie-

scenti imprimeretur circa eam diametrum Æquatoris, cui Sol ad perpendicularum insistit, alia Terræ diurno motu circa eandem diametrum revolutæ imprimitur. Cæterum in Corollario *Prop. 5.* jam adnotavimus eandem momentorum quantitatem non nisi viribus singillatim impressis servari posse, pluribus autem simul impressis non summam momentorum omnium, sed momentum, quod ex momentis omnibus componitur, immutabiliter tueri.

P A R S T E R T I A.

De motibus, qui ex Sole oriuntur.

PROPOSITIO VIGESIMAPRIMA.

Manentibus iis, quæ supra, dico quod angularis nodorum motus, sive præcessio Æquinoctiorum, quæ ex Sole oritur, erit in duplicata ratione distantiae ipsius Solis ab Æquinoctiis.

DEMONSTRATIO.

Sit recta Ac , fig. 10., Æquatori in puncto A perpendicularis, & recta Ar ad Ac sic habeat ut momentum diurni motus ad momentum Solarium virium, sive ut $\frac{k d_1}{d t^2}$ ad

$\frac{3 S \pi \nu' (1 - \pi^2) \cdot CH^2 \cdot K}{A \cdot AG \cdot ST^3}$. Compleatur rectangulum $r A c m$, &

per puncta $T A m$ traducatur planum, quod fecet Eclipticam in N' , & n' . Per *Propos.* 18. Terra diurno motu circa axem, & Solaribus viribus circa diametrum $Z z$ impulsæ, rotatione composita circa axem novum revolvetur, qui in plano prioris axis, & diametri $Z z$ jaceat, & ab eodem axe declinet angulo, cujus tangens sit $= \frac{3 S \pi \nu' (1 - \pi^2) \cdot CH^2 \cdot K d_1}{A \cdot AG \cdot ST^3 \cdot k d_1}$

$= \frac{Ac}{Ar}$ Quare erit $T A n'$ nova positio terrestris Æquatoris,

& N' , n' nodi post tempus datum, atque ex N in planum $T A N'$ ducta perpendiculari NN'' , erit $Ar : Ac = NQ :$

$NN'' = AG : NN''$, sive erit $NN'' = \frac{3 S \pi \nu' (1 - \pi^2) \cdot CH^2 \cdot K d_1}{A \cdot ST^3 \cdot k d_1}$.

Rursus erit $NN'' : NN' = \pi : 1$. Itaque erit arcus NN' , quo regredientur nodi in plano Eclipticæ =

$\frac{3S \cdot \sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot K dt^2}{A \cdot ST^3 \cdot k ds}$, & angularis nodorum motus
 evadet $= \frac{3S \cdot \sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot K dt^2}{A^2 \cdot ST^3 \cdot k ds}$. Porro si sit dz an-
 gulus dato tempore quam minimo dt a Terra circa Solem
 absolutus, & g velocitas motus annui, erit $dt = \frac{ST \cdot dz}{g}$, &
 $dt^2 = \frac{ST^2 \cdot dz^2}{g^2}$. Erit insuper $ds = t dz$, & quia vis cen-
 tripeta æqualis est quadrato velocitatis per radium circuli
 diviso, erit $\frac{S}{ST^2} = \frac{g^2}{ST}$, & angularis nodorum motus pro-
 dibit $= \frac{3S \cdot \sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot K}{A^2 \cdot ST^3 \cdot k ds} \cdot \frac{ST^2 \cdot dz^2}{g^2} =$
 $\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot K dz}{t A^2 \cdot k} \cdot Q. E. D.$

COROLLARIUM PRIMUM.

Quia summa omnium CH^2 dimidia est summæ totidem
 A^2 , erit $\frac{1}{2} A^2$ valor medius ipsius CH^2 & medius nodo-
 rum motus erit $= \frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot K dz}{2 t k}$ Scilicet in Octantibus u-
 bi est $CH^2 = \frac{1}{2} A^2$ motus medius præcessionis æquabitur mo-
 tui vero, & dum Sol ab Æquinoctiis tendet ad loca hinc
 inde æqualiter ab Æquinoctiis, & a Solstitiis distita motus
 verus motu medio erit minor, major vero dum ab iis locis
 Sol ad Solstitia progreditur. In Solstitiis motus verus duplo
 major evadet medio.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Si terra sit homogenea, & fiat $K = \frac{4}{15} p \phi a^3 A^2$, $k = \frac{4}{15}$
 $p a A^4$ per Coroll. Propof. 17., & Prop. 18. erit motus me-
 dius

dus nodorum = $\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot \phi a^2 d\tau}{21A^2}$, & motus medius annuus = $\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot \phi a^2 \cdot 360^\circ}{21A^2}$, aut proxime = $\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot \phi a \cdot 360^\circ}{21A}$, quæ quantitas dupla est quam statuerat Sylvabellius *Sett.* 4. *Probl.* 11. *num.* 32. prorsus autem cum ea convenit, quam Cl. Alembertius de *Præcess. Æquin. num.* 52., & 116. duplici alia methodo invenerat.

COROLLARIUM TERTIUM.

In hypothesi Terræ homogeneæ, & solidæ, cum sit $A: \phi a = 230:1$, erit præcessio annua Æquinoctiorum = $\frac{3 \cdot 9172533 \cdot 360^\circ}{21 \cdot 365 \frac{1}{4} \cdot 2300000000} = 21'' 13'''$. Si sit $A: \phi a = 178:1$, erit motus idem = $27'' 25'''$. Denique si sit $A: \phi a = 301:1$, erit præcessio annua = $24 \frac{1}{3}''$: prorsus ut alia methodo eruerat Eulerus in Monumentis Berolinensis Academiæ anno 1749 de *Præcess. Æquin. num.* 41.

COROLLARIUM QUARTUM.

Juxta ultimam proportionem terrestrium axium, si Terra nucleum sphaericum diversæ densitatis in centro habeat, & sit $A:B=5:3$, atque insuper $1+c:1=10:1$, Æquinoctiorum præcessio annis singulis evadet = $\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot 360^\circ}{21A}$

$$\frac{\frac{\phi a^3 A^2}{21A^2 + \frac{2187A^4}{3125}}}{21A} = \frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot \phi a \cdot 360^\circ}{21A} \cdot \frac{3125}{5312} = \frac{3125}{5312} \cdot 24 \frac{1}{3}''$$

$$= 14 \frac{1}{3}''$$
. In quacumque vero hypothesi nuclei densioris, & sphaerici præcessio semper minor erit, quam in hypothesi Terræ homogeneæ.

Co-

COROLLARIUM QUINTUM.

Si nucleus sphaericus omni materia vacuus intelligatur, & fit $c = -1$, erit præcessio annua $= \frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot 360^\circ}{2t}$.

$\frac{0.03A^2}{AA-B^2}$, major scilicet quam in hypothese terræ homogeneæ. Semper etiam major erit præcessio si nucleus rarior sit exteriore Terra, aut si Terra ex stratis sphaeroidicis diversæ densitatis constet, & ellipticitas stratorum accedendo ad centrum augeatur juxta *Coroll. 2. Propos. 18*.

PROPOSITIO VIGESIMASECUNDA.

Erit etiam nodorum motus, sive præcessio Æquinoctiorum proportionalis quadrato sinus declinationis Solis ab Æquatore.

DEMONSTRATIO.

Si alia formula accipiat, quam Corollario *Prop. 17*. exhibuimus, erit $Ar: Ac = \frac{k d t}{d t^2} : \frac{3S \cdot \sin V \cdot \cos V \cdot K}{ST^3}$. Quo dato, & cæteris manentibus ut in *Propos. 21*., evadet angularis nodorum motus $= \frac{3S \cdot \sin V \cdot \cos V \cdot AG \cdot K d t^2}{\pi \cdot ST^3 \cdot A k d s}$.

Ducatur, *fig. 11.*, recta TM lineæ nodorum perpendicularis, & radio TM , ac centro T describatur circularis arcus MH , jungaturque HT , & ex H in terrestrem axem TP demittatur perpendiculum HP . Tum si in puncto H erigatur perpendicularis plano HTP , quæ cum recta ST concurrat in puncto K , erit totum planum HPK , & recta KP axi in puncto P perpendicularis. Erit etiam $HP = A \cdot \sqrt{(1-\pi^2)}$, $TP = A\pi$, $TK = \frac{TP}{\sin V} = \frac{A\pi}{\sin V}$, $KP =$

$$\frac{TP \cdot \cos V}{\sin V} = \frac{A\pi \cdot \cos V}{\sin V}, \text{ \& ob rectam } HP \text{ parallellam rectæ}$$

MT

MT , & KP parallellam rectæ AT , erit angulus KPO æqualis angulo ATM , sive angulo ATG , & ob angulos G , & H rectos, similia erunt trianguia AGT , PHK , & prodibit $AG = \frac{HP \cdot AT}{KP} = \frac{A \cdot \sqrt{(1-\pi^2)} \cdot \sin.V}{\pi \cdot \cos.V}$, & angularis no-

dorum motus evadet $= \frac{3S \cdot \sqrt{(1-\pi^2)} \cdot \sin.V^2 \cdot K dz^2}{\pi^2 \cdot ST^3 \cdot k dt}$.

Jam vero si sit $ST \cdot dz$ spatium a Terra circa Solem elemento temporis dt absolutum, adeoque fiat $dt =$

$$\frac{t \cdot ST \cdot dz}{p \cdot ST}, \text{ \& } dt^2 = \frac{t^2 dz^2}{p^2}, \quad \frac{S}{ST^2} = \left(\frac{p \cdot ST}{t}\right)^2 \cdot \frac{1}{ST}, \quad \frac{S}{ST^3} = \frac{p^2}{t^2}, \quad ds = t dz, \text{ erit motus idem nodorum } =$$

$$\frac{3t^2(1-\pi^2) \cdot \sin.V^2 \cdot K p^2 t^2 dz^2}{\pi^2 p^2 t^2 k t dz} = \frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot \sin.V^2 \cdot K dz}{\pi^2 t k}.$$

Q. E. D.

COROLLARIUM PRIMUM.

Quia est $\sin.V = \frac{\pi \cdot CH}{A}$, ut in *Propos.* 12. invenimus, summa quadratorum omnium ex finibus declinationis Solis dimidia erit summæ totidem quadratorum declinationis maximæ, sive inclinationis Eclipticæ, & Æquatoris, & valor medius $\sin.V^2$ erit $\frac{1}{2} \pi^2$, & media Æquinoctiorum præcessio $\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot K dz}{2 t k}$, prorsus ut antea.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Si vis centripeta cujuscumque terrestris particulæ in Solem, sive $\frac{S}{ST^2}$ statui posset æqualis quadrato velocitatis per diametrum orbitæ diviso, sive $= \left(\frac{p \cdot ST}{t}\right)^2 \cdot \frac{1}{2ST}$, in hypothesi Terræ homogeneæ esset motus medius nodorum $=$

3 ✓

$\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot \text{ad} z}{41A}$, & annua Æquinoctiorum præcessio evaderet $13'' 43^m$ posito $A:\phi a = 178:1$. fere ut statuerat Sylva-
bellius *par. 2. de Præcess. Æquin. sect. 4. num. 27. & 32.*

COROLLARIUM TERTIUM.

Si vis Solis esset ad vim perturbatricem Lunæ ut $1:Q$, & Luna moveretur semper in plano Eclipticæ, esset totalis præcessio annua Æquinoctiorum, quæ ex summa duarum virium oriretur $= \frac{3(1+Q) \cdot \sqrt{(1-\pi^2)} \cdot K \cdot 360^\circ}{214}$, quæ quia juxta observationem primam esse debet $= 50.3''$, in hypothesi terræ exterioris solidæ, & homogenæ fere æqualis esset præcessio ex Luna, & ex Sole orta, & æquales vires utrimque in totam Terram exercitæ.

COROLLARIUM QUARTUM.

Quia vero exterior Terra partim solida, & partim etiam fluida est, patet annuam præcessionem Æquinoctiorum tanto minorem esse oportere, quanto major fluidæ materiæ quantitas in Terra exteriori reperitur, adeoque etiam longe aliam perturbatricium Solis, & Lunæ virium proportionem esse posse: Nam fluida omnia quibuscumque viribus agitata cum æqualiter premant versus quascumque partes; nullus ex attractione fluidarum partium massæ totius motus oriri potest, ut recte ab Alembertio notatum fuit *num. 8. de Præcess. Æquin.* Observationum collatione definienda supererit annua Præcessio ex Sole orta, & accurata perturbatricium virium proportio.

PRO-

PROPOSITIO VIGESIMATERTIA.

Præcessionem jam inventam corrigere.

RESOLUTIO.

Quoniam dum Sol in Ecliptica percurrit angulum dz , nodi regrediuntur angulo $\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot K dz}{2 A^2 k}$, & redeunti Soli obviam fiunt; erit horarius Solis motus $dz - \frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot K dz}{2 A^2 k}$, atque hac quantitate in locum quantitatis simplicis dz subrogata, erit correctus nodorum motus $= \frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot K dz}{2 A^2 k} - \left(\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} K}{2 A^2 k} \right)^2 \cdot CH^4 \cdot dz$.

Jam vero summa omnium $CH^2 dz$, sive, *fig. 12.*, omnium $CH^2 \cdot Cc$, aut, quod idem est, omnium $A \cdot CH \cdot Hb$ æquatur toti areæ circulari per radium multiplicatæ, sive

$\frac{1}{2} p A^3$. Pariter est $CH^4 dz = A \cdot CH^3 \cdot Hb = A^3 \cdot (A^2 - TH^2)^{\frac{1}{2}} \cdot Hb - A \cdot (A^2 - TH^2)^{\frac{1}{2}} \cdot TH^3 \cdot Hb$, cujus

summa est $\frac{3}{4} A^3 \cdot NCH + \frac{1}{4} A \cdot TH \cdot (A^2 - TH^2)^{\frac{3}{2}}$,

adeoque posteriore termino per totum semicirculum evanescente, erit summa omnium $CH^4 \cdot dz = \frac{3}{8} p A^3$, & pro-

dabit correctus nodorum motus annis singulis $\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot K p A}{2 k}$

$- \left(\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot K}{2 k} \right)^2 \frac{3}{2} p A = \frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot K \cdot 360^\circ}{2 k} -$

$\left(\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot K}{2 k} \right)^2 \frac{3}{2} 360^\circ =$

$\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot K \cdot 360^\circ}{2 k} \left(1 - \frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot K \cdot \frac{3}{2}}{2 k} \right)$. *Q. E. I.*

Co-

COROLLARIUM PRIMUM.

Quia regredientibus nodis angulo $\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot K dz}{sA^{2k}}$
 $-(\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot K}{sA^{2k}})^2 \cdot CH^4 dz$, motus horarius angularis So-
 lis non amplius est $dz - \frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot K dz}{sA^{2k}}$, sed $dz -$
 $\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot K dz}{sA^{2k}} + (\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot K}{sA^{2k}})^2 \cdot CH^4 dz$, corri-
 gi rursus poterit æquatio, & motus nodorum erui vero ut-
 cumque proximus.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Quia vero ob affinitatem sphaeræ, & sphæroidis illius, cu-
 jus formam præfert Tellus, quantitas K satis parva est, ut
 possint negligi altiores omnes ipsius potestates, cenferi etiam
 poterit verus horarius nodorum motus $\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot K dz}{sA^3}$,
 idem scilicet ac si horis singulis elapsis nodi in locum pristi-
 num retraherentur.

PROPOSITIO VIGESIMAQUARTA.

Dico insuper quod dato quocumque tempore motus to-
 talis medius, & motus verus, mediique, ac veri motus dif-
 ferentia inter se erunt ut sector NCT , segmentum NCH ,
 & triangulum HCT .

DEMONSTRATIO.

Quia dato Solis loco C in Ecliptica, & distantia NC a
 nodo N motus verus est ut CH^2 , erit summa motuum om-
 nium verorum pergente Sole ab N ad C , ut summa omnium
 CH^2 , sive ut CT ducta in circulearem aream CNH . Rur-
 sus

fus erit summa motuum omnium mediorum ut summa omnium $\frac{1}{2} CT^2$, sive ut circularis arcus NC in $\frac{1}{2} CT$ ductus, vel ut sector NCT ductus in CT . Quare erit summa motuum omnium verorum ad summam mediorum motuum ut segmentum NCH ad sectorem NCT , & motuum differentia erit ad motum totalem verum ut triangulum CHT ad segmentum NCH , ad motum autem medium totalem ut idem triangulum ad sectorem NCT . *Q.E.D.*

COROLLARIUM.

Quia triangulum CHT fit maximum ubi est $CH=HT$, in octantibus differentia motus medii, & motus veri evadet maxima. Et erit differentia eadem maxima ad motum medium ut $\frac{1}{4}$ ad $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{8} p$, scilicet ut dupla diameter ad integram peripheriam vel ut 20000: 31415. Erit etiam differentia eadem ad totam præcessionem annuam ut 2500: 31415.

PROPOSITIO VIGESIMAQUINTA.

In toto autem præcessionis motu, neque axis instantaneus rotationis Terræ ab axe figuræ, neque totius compositæ rotationis velocitas a velocitate diurni motus sensibilibiter aberrare poterit.

DEMONSTRATIO.

Primum colligitur ex 8., & 10. Propositione. Cum enim axis instantaneus rotationis semper esse debeat in plano, quod perpendicularare sit rectæ a centro Terræ ad Solem, aut Lunam ductæ, si statuamus motum omnem diurnum referri ad Solem, & ad Lunam, planumque illud circulariter revolvi, polus etiam instantaneus rotationis circa polum figuræ in terra circulariter aberrabit, eoque ampliozem circulum describet, quo vires Luminarium potiores erunt, & maxima utriusque poli distantia erit ipse radius circuli, qui maximæ Lumi-

na-

narium declinationis die describetur. Jam vero quia juxta *Propof. 21.* angulus aberrationis axis instantanei rotationis ad motum præcessionis se habet ut $\pi : 1$, & juxta *Coroll. 1.* ejusdem *Prop.* maxima unius diei præcessio esse debet $= \frac{2 \cdot 50''}{365}$ erit peripheria maximi illius circuli $= \frac{2\pi \cdot 50''}{365} = \frac{4 \cdot 50''}{5 \cdot 365} = \frac{24000''}{365}$ $= 6 \cdot 6''$ circiter, quæ quantitas si diminuatur in ratione peripheriæ ad radium sive 44:7, dabit aberrationem maximam $1''$, quæ nullo modo sensibilis esse poterit. *Q. E. primum.*

Alterum ex primo infertur: Cum enim motus circa aliquam Æquatoris diametrum conceptus rotationis axem mutare sensibilibiter non possit, neque poterit efficere ut compositæ totius rotationis motus a motu circa axem figuræ, sive a motu diurno differat sensibilibiter. *Q. E. alterum.*

COROLLARIUM PRIMUM.

Quia Luminarium ab Æquatore ad Tropicos declinantium vires augentur in duplicata ratione distantiae a punctis Æquinoctialibus, polus etiam instantaneus rotationis Æquinoctiorum tempore a polo figuræ egressus, in duplicata illa ratione recedet usque ad Solstitia, & spiralem curvam describet. Tum vero Luminarium viribus decrefcentibus, ut antea creverant, rotationis polus iisdem gradibus, quibus antea recesserat, accedet ad polum alium, & Luminaribus ad nodos rursus delatis, rursus cum polo figuræ congruet.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Locus medius poli, & axis instantanei rotationis semper erit polus, & axis Terræ. Sive enim major, sive minor sit conus, qui ab axe rotationis describitur singulis diebus, circa axem figuræ in Terra quam proxime describi debet. In spatio autem absoluto figuræ axis, sive axis medius circa axem verum, & instantaneum rotationis delatus cum tota Terra,

singulis temporis instantibus eo ampliores conos describere incipiet, quo Luminarium vires majores erunt.

COROLLARIUM TERTIUM.

Velocitas totius compositi diurni motus Luminaribus maxime ab *Æquatore* declinantibus evadet maxima, & ad velocitatem minimam se habebit ut radix summæ quadratorum ex momentis motus diurni, & Solarium, ac Lunarum virium ad momentum diurni motus. Hic ergo motus cum a viribus perturbatricibus minime afficiatur per *lem. 2.*, si etiam componatur cum motu, qui oritur ex ipsis viribus, sensibilibiter non augetur.

PROPOSITIO VIGESIMASEXTA

Definire motum terrestres axis circa lineam nodorum, & circa axem *Eclipticæ*.

RESOLUTIO.

Vocetur dy angularis nodorum motus, & Ady sit arcus quem regrediendo nodi in plano *Eclipticæ* describunt, & arcus NN^i sit $A\pi dy$. Qui per *Propos. antec.* rotationis axis in Terra cum axe figuræ sensibilibiter semper est idem, erit $\frac{A\pi dy}{AG}$ angulus PTp , & $\frac{A\pi dy}{AG}$ arcus Pp , *fig. 13.*, quem polus Telluris P circa lineam AB , & secundum TD describet. Resolvatur motus hujusmodi in duos alios secundum TQ , DQ , sive in $\frac{TQ \cdot a\pi dy}{AG}$ & $\frac{DQ \cdot a\pi dy}{AG}$. Quia ob æquales angulos DTQ , ATG est $AG = DQ$, & $TG = TQ$, erit etiam $\frac{TQ \cdot a\pi dy}{AG} = \frac{TG \cdot a\pi dy}{AG}$, & $\frac{DQ \cdot a\pi dy}{AG} = a\pi dy$. Itaque polus instantaneus rotationis binos motus præferet quorum unus parallele ad rectam TQ , & circa lineam Nn nodorum absolvetur, inclinationemque *Eclipticæ*, & *Æquatoris*

va-

variabit angulo $\frac{TG \cdot \pi dy}{AG}$. Alter vero qui parallelus erit Eclipticæ, efficiet ut polus terræ P circa axem Eclipticæ TH circulariter rotetur angulo $\frac{\pi \pi dy}{HP} = \frac{\pi \pi dy}{\pi \pi} = dy$. Q. E. I.

COROLLARIUM PRIMUM.

Si sit Pp arcus, quem polus Terræ circa diametrum Æ -quatoris AE describit, tum vero ex P , & p in planum Eclipticæ demittantur perpendiculara PV , $p v$, & ex p in PV perpendicularum aliud pu ; erit angulus pHu , quem polus terræ circa axem Eclipticæ TH absolvet æqualis angulo VTu . Itaque nodorum motus dy æquabitur angulo VTu , quem terrestris axis projectio TV describet in plano Eclipticæ.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Angulus $\frac{TG \cdot \pi dy}{AG}$ metietur variationem horariam inclinationis Eclipticæ ad Æ quatorem, five axis terræ ad Eclipticam, & se habebit ad angularem nodorum motum ut TG . π : AG . Est vero $\frac{-d\pi}{\sqrt{(1-\pi^2)}}$ elementum anguli, cujus sinus sit π , & cosinus $\sqrt{(1-\pi^2)}$. Itaque erit etiam variatio eadem inclinationis = $\frac{-d\pi}{\sqrt{(1-\pi^2)}}$.

COROLLARIUM TERTIUM.

Si negligatur motus, qui solam inclinationem afficit, & ducatur planum PTM , quod sit Eclipticæ, & lineæ nodorum perpendicularare; manifestum est motis nodis, & per totam Æ quatoris peripheriam decurrentibus, planum ipsum, ac totam terram circa axem Eclipticæ revolvī oportere. Ita ex omnibus terræ oscillationibus circa omnes diametros Æ quatoris AB conceptis alius motus habebitur, qui nodos dum-

dumtaxat retrahet, & circa solum axem Eclipticæ absolvetur.

COROLLARIUM QUARTUM.

Axis terræ circa axem Eclipticæ duos conos sibi invicem in centro obversos designabit, & poli terræ circa polos Eclipticæ duos circulos. Quia vero nodorum motus æquabilis non est, iidem circuli æquabiliter non percurrentur, & velocitas maxima terrestres poli solstitiorum tempore habebitur; aliis autem temporibus velocitas proportionalis erit quadrato distantiae Solis ab Æquinoctiis.

COROLLARIUM QUINTUM.

Hoc ipso motu cum terra circa axem Eclipticæ revolvatur ab Oriente in Occidentem, Stellæ fixæ, & alia cælestia corpora ab Occidente in Orientem progredi videbuntur, & retrocedentibus semper nodis, Stellarum longitudo, quæ a prima intersectione Eclipticæ, & Æquatoris supputatur, semper augebitur, & incrementum annuum longitudinis annuo nodorum motui æquale erit.

PROPOSITIO VIGESIMASEPTIMA.

Variatio inclinationis Eclipticæ, & Æquatoris erit in ratione composita sinus, & cosinus distantiae Solis ab Æquinoctiis.

DEMONSTRATIO.

Per *Coroll. 2. Prop. 26.* dato quolibet Solis loco erit horarius nodorum motus ad variationem horariam inclinationis Eclipticæ, & Æquatoris ut $AG : TG \cdot \pi$, five erit variatio eadem inclinationis = $\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot TG \cdot \pi \cdot Kdz}{AG \cdot 1 \cdot A^2 \cdot k}$. Est

vero juxta duodecimam propositionem $CH = \frac{A \cdot \sin V}{\pi}$, $AG = A$

$$= \frac{A \cdot \sin V \cdot \sqrt{(1-\pi^2)}}{\pi \cdot \cos V} = \frac{CH \cdot \sqrt{(1-\pi^2)}}{\cos V}, \text{ adeoque } TG =$$

$$\sqrt{(A^2 - AG^2)} = \sqrt{\left(\frac{A^2 \cdot \cos V^2 - CH^2 \cdot (1-\pi^2)}{\cos V^2} \right)} =$$

$$\sqrt{\left(\frac{A^2(1 - \frac{CH^2}{A^2} \cdot \pi^2) - CH^2 \cdot (1-\pi^2)}{\cos V^2} \right)} = \frac{TH}{\cos V}. \text{ Itaque e-}$$

rit variatio horaria inclinationis $= \frac{3\pi \cdot CH \cdot TH \cdot K \cdot dz}{2 \cdot A^2 \cdot k}$. \mathcal{Q} .
E. D.

COROLLARIUM PRIMUM.

In quadrantibus *N TL*, πTl , *fig. 12.*, five Sole ab *Æ*-quinocitiis ad Solstitia pergente augebitur inclinatio Eclipticæ ad *Æ*quatorem. Sole autem redeunte ad *Æ*quinocitia, ob rectangulum *CH. TH* in quadrantibus *LTn*, *ITN* negativum, minuetur iisdem gradibus, quibus antea augebatur, & post quamlibet Solis revolutionem Eclipticæ obliquitas ad statum pristinum redibit. Variatio horaria obliquitatis evadet maxima in singulis octantibus, in quibus rectangulum *CH. TH* est maximum, & in locis aliis hinc inde æqualiter diffitis ab octantibus æqualiter variabitur.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Et erit præcessio horaria *Æ*quinocetiorum ad variationem horariam inclinationis Eclipticæ, & *Æ*quatoris ut

$$\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot Kdz}{2A^2 \cdot k} : \frac{3\pi \cdot CH \cdot TH \cdot Kdz}{2A^2 \cdot k}, \text{ five ut}$$

$$\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH : \pi \cdot TH : \text{scilicet erit tangens } \frac{CH}{TH} \text{ distan-}$$

tiæ Solis ab *Æ*quinocitiis ad tangentem $\frac{\pi}{\sqrt{(1-\pi^2)}}$ obliqui-
 tatis Eclipticæ, ut præcessio horaria *Æ*quinocetiorum ad va-
 riationem horariam ejusdem obliquitatis.

Co-

COROLLARIUM TERTIUM.

Est vero summa omnium $CH \cdot TH \cdot dz$, aut $CH \cdot TH \cdot A \cdot Cc$, five $\frac{CH \cdot TH \cdot A^2 \cdot Hb}{CH}$, quo tempore Sol tendit ab

N ad $C = \frac{1}{2} A^2 (A^2 - TH^2) = \frac{1}{2} A^2 \cdot CH^2$. Est etiam summa omnium $CH^2 \cdot dz$ æqualis quadrato A^2 ducto in segmentum circulare NCH . Tota igitur præcessio Æquinoctiorum ad variationem totam inclinationis erit ut $\sqrt{(1 - \pi^2)} \cdot NCH : \frac{1}{2} \pi \cdot CH^2$, in ratione scilicet composita cosinus, & sinus obliquitatis Eclipticæ, & segmenti NCH ad dimidium quadratum semiordinatæ CH .

COROLLARIUM QUARTUM.

Et quia pergente Sole ab Æquinoctiis ad Solstitia summa omnium $CH \cdot TH \cdot dz$ est $\frac{1}{2} A^4$, erit variatio tota inclinationis = $\frac{3\pi \cdot \phi a \cdot 90^\circ}{2\pi \cdot \frac{1}{4} p A} = \frac{6\pi \cdot \phi a \cdot 90^\circ}{\pi p A} = 1'' 55'''$ in hypo-

thesi terræ solidæ, & homogeneæ, ac posita $A : \phi a = 178 : 1$. Dupla igitur est variatio, quam Cl. Sylvabellius statuerat *probl. 14. num. 28*.

COROLLARIUM QUINTUM.

Denique variatio tota inclinationis erit quarta proportionalis ad $\frac{1}{4} p$, $\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot \phi a \cdot 90^\circ}{2\pi A}$, & $\frac{\pi}{\sqrt{(1-\pi^2)}}$: scilicet *motus Solis erit ad motum Æquinoctiorum vi Solis genitum, ut tangens inclinationis mediocris Eclipticæ ad Equatorem ad tangentem variationis totius ejusdem inclinationis*: Quod est elegans Cl. Walmesley theorema.

Pro-

PROPOSITIO VIGESIMAOCTAVA.

Si Sol non in circulo SRC , *fig. 14.*, sed in Ellipsi MPB revolvatur, erit horarius nodorum motus in circulo ad motum horarium in ellipsi, ut distantia Solis in ellipsi, ad distantiam Solis in circulo: & si radius circuli æquetur semi-axi majori ellipseos motus etiam annuus in circulo, & in ellipsi idem erit.

DEMONSTRATIO.

Pars prior. Motus horarius nodorum habitus eo tempore, quo Sol in circulo SRC absolvit arcum Ss erit ad motum horarium nodorum eo tempore habitum, quo Sol in ellipsi absolveret arcum Pp , directe ut tempus, & reciprocè ut cubus distantiae Solis a centro T , sive, ob areas in circulo, & in ellipsi proportionales temporibus, ut $\frac{ST_1}{ST_2}$:

$\frac{PT_2}{PT_1}$. Est vero area $PTp = \frac{1}{2} PT \cdot Pm = \frac{PT \cdot S_1}{2ST} = \frac{ST_1 \cdot PT_1}{2ST_1}$. Itaque erunt iidem motus ut $\frac{1}{ST} : \frac{1}{PT}$, sive nodorum motus in circulo ad motum nodorum in ellipsi se habebit ut distantia Solis in ellipsi ad distantiam Solis in circulo. *Q. E. 1.^a*

Pars altera. Ducatur PSB parallela majori axi MTN , & sit L alter focus ellipseos. Erit $BT = PL$, & motus horarius nodorum habitus eo tempore, quo Sol in circulo absolvit binos arcus Ss, Bb , erit ad motum horarium nodorum eo tempore habitum, quo Sol in circulo absolveret arcus Pp, Hb , ut $PT + BT : 2ST = PT + PL : 2ST$, scilicet in ratione æqualitatis. Quod quidem cum in punctis omnibus locum habeat, idem erit horarius nodorum motus, sive Sol in ellipsi, sive in circulo moveatur, cujus diameter æquetur axi majori ellipseos. *Q. E. alterum.*

H

Co-

COROLLARIUM PRIMUM.

Quia motus horarius nodorum dum Sol in Ellipsi, & in circulo absolvet arcus $Pp + Hb$, & $Ss + Bb$, ubique est in constanti ratione $RQ : MN$, si semiaxis major ellipseos radio circuli non sit æqualis, nodorum motus annuus augebitur, aut imminuetur in simplici ratione ipsius semiaxis, aut imminuti, aut aucti.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Et quia summa linearum TP , & PL æquatur semper axi majori MN , si eodem axe majore MN , & minore alio axe describatur ellipsis alia, idem erit annuus nodorum motus, sive in una ex his ellipsis, sive in altera Sol revolvatur. In utraque enim ellipsi delato Sole annuus nodorum motus æquabitur motui, qui annis singulis haberetur ubi Sol circulum diametro MM descriptum circa centrum T paragraret.

COROLLARIUM TERTIUM.

Et erit differentia motus horarii in ellipsi, & in circulo ad totalem motum in circulo ut $PS : PT$, scilicet erit eadem differentia $= \frac{3\sqrt{1-e^2} \cdot CH^2 \cdot K dz}{1A^2 \cdot k} \cdot \frac{PS}{PT}$. Quare cum ellipsis a Sole circa terram descripta tam proxime accedat circulo, ut possit negligi productum differentie PS distantiarum PT , ST in differentiam semiaxium terrestrium, & annuus, & horarius nodorum motus idem censi poterit ac si in mediocri distantia a Sole circulus circa terram describeretur.

PROPOSITIO VIGESIMANONA.

Determinare præcessionem Æquinoctiorum solius terræ, quæ exterius, sublato interiore globo relinqueretur.

R. E.

RESOLUTIO.

Per *prop.* 19. effiet $\frac{3S\pi\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot Adt^2}{4AG \cdot ST^2 \cdot a^2 dt}$ tangens
 anguli comprehensi inter axem terræ, & axem instantaneum
 rotationis, que ex momento diurni motus, & momento So-
 larium virium componeretur. Hoc dato evaderet $NN'' =$
 $\frac{3S\pi\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot Adt^2}{4ST^2 \cdot a^2 dt}$, & $NN'' = \frac{3S\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot Adt^2}{4ST^2 \cdot a^2 dt}$,
 & angularis nodorum motus erueretur =
 $\frac{3S\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot dt^2}{4ST^2 \cdot a^2 dt} = \frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot ST^2 \cdot g^2 dz^2}{4a^2 g^2 dt \cdot ST^2}$
 $= \frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot dz}{4a^2 t}$. Q. E. I.

COROLLARIUM.

Motus medius nodorum terræ folius exterioris effiet =
 $\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot A^2 dz}{8a^2 t} = \frac{3\sqrt{(1-\pi^2)}(2+29)dz}{8t}$. Est vero motus
 medius nodorum totius terræ = $\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot \phi a^2 dz}{2t A^2}$. Qua-
 re erunt motus medii inter se ut $A^2 : 4\phi a^2$, scilicet ut
 momenta totius terræ, & terræ exterioris circa axem revo-
 lutæ.

PROPOSITIO TRIGESIMA.

Invenire motum nodorum terræ exterioris, si circa Æ-
 quatorem inscriptæ sphaeræ ad modum annuli uniformiter di-
 stribueretur.

RESOLUTIO.

Per *prop.* 20. exteriore terra ad anulum solidum reda-
 cta, qui Æquatori globi interioris circumponatur, effiet tan-
 H 2 gens

gens deviationis axis = $\frac{3S\pi\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot dt^2}{2AG \cdot ST^3 \cdot a ds}$. Quo dato eadem methodo, qua in propositionibus antecedentibus ufi fumus, eructur $NN'' = \frac{3S\pi\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot dt^2}{2ST^3 \cdot a ds}$, & $NN' = \frac{3S\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot dt^2}{2ST^3 \cdot a ds}$, & angularis nodorum motus prodibit = $\frac{3S\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot dt^2}{2ST^3 \cdot a^2 ds} = \frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot dz}{2a^2 s}$, & motus medius = $\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} dz}{4s}$. Q. E. I.

COROLLARIUM PRIMUM.

Si Luna aliqua unius diei spatlo in terrestri Æquatore revolveretur, per *coroll. 1.*, & 2. *prop. 30. lib. 3. Princip. Mathem.* Newtoni, motum verum nodorum haberet in loco $A = \frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot dz}{a^2 s}$, & motum medium in una revolutione = $\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot CH^2 \cdot dz}{2a^2 s}$, & motum medium annuum pro quolibet Solis loco = $\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot dz}{4s}$. Constat igitur, quod Newtonus hypotheseos loco assumpserat, quod scilicet si annulus prædictus, terra omni reliqua sublata, solus in orbe terræ, motu annuo circa Solem ferretur, & interea circa axem suum ad planum Eclipticæ in angulo graduum $23 \frac{1}{2}$ inclinatum, motu diurno revolveretur; idem foret motus punctorum Æquinoctialium, siue annulus iste fluidus esset, siue is ex materia rigida, & firma constaret.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Motus medius nodorum annuli erit ad motum medium nodorum terræ exterioris ut 2 : 1. Quare cum vires a Sole ex-

ercitæ in exteriorem terram prout ad solidum Æquatoris annulum reducitur, aut jacet in locis suis, sint inter se ut 5 : 2, alia erit ratio virium, alia motus medii nodorum annuli, & totius terræ exterioris : atque hic error Newtoni erit, qui motum medium nodorum annuli $\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot dz}{4s}$ in ratione virium minuendo, motum medium nodorum terræ exterioris circa inclusum globum dispositæ definivit

$$\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot dz}{10s}.$$

SCHOLION.

Newtonus hunc motum medium nodorum terræ exterioris, aut relictæ prout jacet, aut ad solidum Æquatoris annulum redactæ, & iisdem viribus Solaribus, quas patitur in locis suis, agitata, transeundo ad terram totam minuendum censuit in ratione quantitatis motus in annulo ad quantitatem motus in annulo, & globo incluso, sive in ratione $1000000 A^2 - 74725 a^2 : 1000000 (A^2 - a^2)$, & præcessionem annuam Æquinoctiorum eruit

$$\frac{300000 (A^2 - a^2) \sqrt{(1-\pi^2)} \cdot 360^\circ}{10 \cdot s (1000000 A^2 - 74725 a^2)}, \text{ aut } 9'' \text{ circiter, posita dif-}$$

ferentia semiaxium = $\frac{1}{230}$. Si motus medius nodorum terræ exterioris, transeundo ad terram totam minuendus esset

in ratione quantitatis motus, quæ in exteriore terra, & terra tota circa eandem Æquatoris diametrum oscillanteprehenditur, per *Coroll. 1. Propos. 4.*, prodiisset annua præcessio Æquinoctiorum $\frac{3\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot 9s \cdot 360^\circ}{4As}$, scilicet du-

plo minor quam *Propos. 21. & 22.* inventa sit, ac fere = $10'' 36'''$. Correcta igitur distributione motus, quæ non eodem penitus modo fit, sive exterior terra consistat in locis suis, sive ad annulum solidum reducatur Æquatori sphaeræ interioris circumpositum, Newtonianæque methodo pressius

in-

inhærendo, nonnisi $1 \frac{1}{2}$ " augetur præcessio annua, & adhuc præcessionis veræ dimidia esset. Juxta *Coroll. Propos. 3.* adhuc dimidia præcessionis quantitas crueretur si motus medius nodorum terræ exterioris deberet minui in ratione quantitatis momentorum annuli circa aliquam diametrum revoluti ad quantitatem momentorum annuli, & globi inclusi: ut recte etiam ab Alembertio notatum est *cap. 14. num. 143. § 144.* Verum licet momentum annuli ad momentum globi fere se habeat ut quantitas motus terræ exterioris dispositæ in locis suis ad quantitatem motus inclusi globi; momentum tamen terræ exterioris ad momentum globi minime se habet ut quantitas ad quantitatem motus. Per *Cor. 2. Prop. 5.* differentia momentorum sphaeræ, & sphaeroidis est ad momentum sphaeroidis totius circa aliquam Æquatoris diametrum oscillantis ut $3\phi a^3 : A^3$, & si motus fiat circa axem, ut $4\phi a^3 : A^3$. Tripliciter ergo a Newtono in solutione hujus problematis erratum est: primo quod ad motum medium nodorum terræ exterioris dæcniendum minuere voluit motum medium nodorum annuli in ratione virium a Sole in totam exteriorem terram exercitarum, prout jacet in locis suis, aut ad ad solidum Æquatoris anulum reducit: deinde quod in communicatione motus, quæ in corporibus oscillantibus, ac rotantibus fieri potest, eandem quantitatem motus, ut in corporibus libere impulsis, ac motis, tueri censuit, & non potius eandem quantitatem momentorum, quæ ex massa, & velocitate uniuscujusque particulæ metiuntur, & ex distantia ab axe motus: tertio quod habita ratione diurni motus, neque idem momentum virium conservatur, & motus terræ exterioris transeundo ad terram totam minuitur in ratione momentorum totius terræ, & terræ exterioris non circa diametrum Æquatoris, sed circa axem diurni motus revolutæ. Hæc quæ in *Prop. 6. & Coroll. Prop. 29., & 30.* fatiis attigimus, rationem omnem dissensus, qui nostram inter, ac Newtonianam solutionem problematis intercedit, manifestam, ac certam faciunt. Sylvabellius vero in Transactionibus Philosophicis ad eandem fere Newtoni solutionem di-

diversa methodo pervenit, ea potissimum de causa, quod *par. 2. de præc. Equin. sect. 4. n. 27.* vim centripetam aequalem fecerit quadrato arcus non per radium, sed per diametrum circuli diviso, ut supra jam adnotavimus. Hic idem plane error est, quem olim Grandius Varignonio, aliisque alii objecerunt. In quo quidem Grandio, Alembertio, aliisque Mathematicis præclarissimis neque non sulragari. Cum enim vis centripeta metiri debeat ex velocitate, quæ per sinum versum dati arcus cadendo gigneretur, & eadem velocitate, quæ motu æquabiliter accelerato gignitur, eodem tempore uniformiter continuata duplus sinus versus absolvi possit; vis centripeta exprimitur duplo sinu verso, aut duplo quadrato arcus per diametrum diviso, sive quadrato arcus diviso per solum radium. Utique etiam Eulerus *num. 31.* eandem vis centripetæ expressionem retinuit, quam Sylvabelius, & Varignonius usurpaverat. Quia vero *num. 26. prob. 3.* tangentem deviationis axis diurni motus non $\frac{5 S d t^2}{2 M a^2 d t}$, sed

$\frac{5 M a^2 d t}{4 S d t^2}$ statuit, hisce omnibus compensatis ad eandem solutionem problematis, quam *Coroll. 2. Propos. 21.* attigimus, pervenit.

P A R S Q U A R T A.

De Præcessionis Æquationibus ex Luna ortis.

L E M M A P R I M U M.

Data inclinatione Lunaris orbitæ ad Eclipticam, & distantia nodorum Æquatoris, & Lunaris orbitæ cum Ecliptica invenire distantiam nodorum Lunaris orbitæ, & Eclipticæ cum Æquatore.

Sint N, n , *fig. 7.*, duo puncta in quibus Æquator $ANBn$ secat Eclipticam CNn ; M , & m puncta, in quibus Æquator secat Lunarem orbitam DMm ; O , & o intersec-

nes

æ Lunaribus orbitæ cum Æquatore. Sit insuper N punctum Æquinoctii verni, & M nodus descendens Lunæ, ac denique vocetur $\pm q$ cofinus arcus MN , l vero, & $\sqrt{(1-l^2)}$ finus, & cofinus inclinationis Lunaribus orbitæ ad Æclipticam. In triangulo sphærico obliquangulo MON erit finus anguli MON ad finum anguli OMN , ut finus arcus MN priori angulo oppositi ad finum arcus ON , sive erit finus arcus

$$ON = \frac{\sin. MN \cdot \sin. OMN}{\sin. MON} = \frac{\sqrt{(1-q^2)} \cdot \sin. OMN}{\sin. AOD} =$$

$$\frac{l \cdot \sqrt{(1-q^2)}}{\sin. AOD} \text{ Q. E. I.}$$

LEMMA SECUNDUM.

Dato nodorum loco, & inclinatione Lunaribus orbitæ ad Æclipticam, & Æclipticæ ad Æquatorem invenire inclinationem Lunaribus orbitæ ad Æquatorem.

Ex M ducatur arcus circuli maximi MP plano Æquatoris perpendicularis. Erit in triangulo sphærico rectangulo MPN finus anguli NMP ad finum anguli OMP , ut cofinus anguli MNP ad cofinum anguli MOP , adeoque erit $\cos. MOP = \frac{\sin. OMP \cdot \cos. MNP}{\sin. NMP}$. Quia vero angulus OMP est differentia duorum angulorum NMP , NMO , erit $\sin. OMP = \sin. NMP \cdot \cos. NMO - \sin. NMO \cdot \cos. NMP$, & $\cos. MOP$ evadet $= \cos. MNP \cdot \cos. NMO - \frac{\sin. NMO \cdot \cos. MNP \cdot \cos. NMP}{\sin. NMP}$. Denique cum sit cofinus

arcus MN ad finum totum ut tangens complementi anguli PNM ad tangentem anguli NMP , sive $\cos. MN$, ad finum totum ut $\frac{\cos. MNP}{\sin. NMP}$ ad $\frac{\sin. NMP}{\cos. NMP}$, prodibit $\frac{\cos. NMP}{\sin. NMP} = \frac{\cos. MN \cdot \sin. MNP}{\cos. MNP}$, & $\cos. MOP = \cos. MNP \cdot \cos. N$

$MO - \sin. NMO \cdot \sin. MNP \cdot \cos. MN$, & substitutis speciebus evadet cofinus inclinationis Lunaribus orbitæ ad Æquatorem $= \sqrt{(1-\pi^2)} \sqrt{(1-l^2)} \mp \pi l q$, finus vero $= \sqrt{1 - \pi^2}$

$(1-l^2) + l^2 \pm 2\pi l q \sqrt{(1-\pi^2)} \sqrt{(1-l^2)} - \pi^2 l^2 q^2$], aut neglecto l^2 ob parvitatem $= \pi \sqrt{(1-l^2)} \pm l q \sqrt{(1-\pi^2)}$.
 Q. E. I.

LEMMA TERTIUM.

Dato sinu distantiae Lunæ ab intersectionibus Lunarum orbitæ, & Æquatoris invenire sinum distantiae a punctis Æquinoctialibus.

Pro quovis nodorum loco est $AG = \sin. AO \cdot \cos. NO \mp \cos. AO \cdot \sin. NO$. Quia vero terminus $\mp \cos. AO \cdot \sin. NO$ ambiguo signo per totam peripheriam destruitur, ceteri poterit $AG = \sin. AO \cdot \cos. NO =$

$$Ag. \sqrt{\left(1 - \frac{l^2(1-q^2)}{\sin. AOD^2}\right)} = \frac{Ag.}{\sin. AOD} \sqrt{(\sin. AOD^2 - l^2(1-q^2))} =$$

$$\frac{Ag.}{\sin. AOD} \sqrt{(\pi^2(1-l^2) + l^2 \pm 2\pi l q \sqrt{(1-\pi^2)} \sqrt{(1-l^2)} - \pi^2 l^2 q^2 - l^2(1-q^2))} =$$

$$\frac{Ag.}{\sin. AOD} \sqrt{(\pi^2(1-l^2) \pm 2\pi l q \sqrt{(1-\pi^2)} \sqrt{(1-l^2)} + l^2 q^2(1-\pi^2))} =$$

$$\frac{Ag.}{\sin. AOD} (\pi \sqrt{(1-l^2)} \pm l q \sqrt{(1-\pi^2)}) , \text{ aut quam proxime } = Ag.$$

Q. E. I.

PROPOSITIO TRIGESIMAPRIMA.

Determinare præcessionem Æquinoctiorum, quæ vere ex Luna oritur.

RESOLUTIO.

Quia per Prop. 18. axis rotationis Terræ ob vires Lunæ ab axe figuræ declinat angulo, cujus tangens est =

$$\frac{3L \cdot \sin. AOD \cdot \cos. AOD \cdot D b^2 \cdot K d t^2}{A \cdot Ag \cdot LT^3 \cdot k d s} , \text{ erit perpendicularum ex } N \text{ demissum in planum novi Æquatoris} =$$

$$\frac{3L \cdot \sin. AOD \cdot \cos. AOD \cdot D b^2 \cdot AG \cdot K d t^2}{A \cdot Ag \cdot LT^3 \cdot k d s} , \text{ \& motus nodo-}$$

I

rum

rum Æquatoris vi Lunæ genitus =

$$\frac{3L \cdot \sin AOD \cdot \cos AOD \cdot Db^2 \cdot AG \cdot Kdz}{\pi \cdot A^2 \cdot Ag \cdot LT^3 \cdot kdt}, \text{ aut potius =}$$

$$\frac{3Q \cdot \sin AOD \cdot \cos AOD \cdot Db^2 \cdot AG \cdot Kdz}{\pi k t A^2 \cdot Ag}, \text{ si vis perturbatrix}$$

Solis ad vim perturbatricem Lunæ se habeat ut 1 : Q. Hoc dato per lemma 3. evadet motus idem nodorum quam proxime =

$$\frac{3Q \cdot \sin AOD \cdot \cos AOD \cdot Db^2 \cdot Kdz}{\pi k t A^2}, \text{ \& per lemma 2.}$$

substituendo valorem sinus, & cosinus fiet =

$$\frac{3Q \cdot Db^2 \cdot Kdz}{\pi k t A^2} \left(\sqrt{(1-\pi^2)} \sqrt{(1-l^2)} + \pi l q \right) \left(\pi \sqrt{(1-l^2)} \pm l q \sqrt{(1-\pi^2)} \right) =$$

$$\frac{3Q \cdot Db^2 \cdot Kdz}{\pi k t A^2} \left(\pi \sqrt{(1-\pi^2)} \sqrt{(1-l^2)} + \left((1-\pi^2) - \pi^2 \right) l q \sqrt{(1-l^2)} - \pi l q^2 \sqrt{(1-\pi^2)} \right)$$

Q. E. I.

COROLLARIUM PRIMUM.

Data igitur positione nodorum Lunaris orbitæ cum Ecliptica verus præcessionis motus augebitur in duplicata ratione distantiae Lunæ a nodis ipsis, & si pro Db^2 substituitur valor medius $\frac{1}{2} A^2$, erit motus medius nodorum Eclipticæ,

& Æquatoris vi Lunæ genitus =

$$\frac{3Q \cdot Kdz}{2\pi k t} \left(\pi \sqrt{(1-\pi^2)} \sqrt{(1-l^2)} + \left((1-\pi^2) - \pi^2 \right) l q \sqrt{(1-l^2)} - \pi l q^2 \sqrt{(1-\pi^2)} \right)$$

COROLLARIUM SECUNDUM.

Et erit $\frac{3Q \cdot Kdz}{2\pi k t} \sqrt{(1-\pi^2)} \sqrt{(1-l^2)}$ motus medius nodorum eorundem pro loco quolibet nodorum Lunaris orbitæ, & Eclipticæ: æquatio autem motus medii pendens ex vario loco nodorum Lunaris orbitæ erit

$$\frac{3Q \cdot Kdz}{2\pi k t} \left(\pm \left((1-\pi^2) - \pi^2 \right) \sqrt{(1-l^2)} l q - \pi l q^2 \sqrt{(1-\pi^2)} \right), \text{ five}$$

dumtaxat $\pm \frac{3Q \cdot Kdz}{2\pi k t} \left((1-\pi^2) - \pi^2 \right) \sqrt{(1-l^2)} l q$, ob modicam incli-

clinationem Lunaræ orbitæ negligendo terminum quantitate
 affectum.

COROLLARIUM TERTIUM.

In regressu nodi ascendentis Lunaræ orbitæ ab Æquinoctio verno ad solstitium hyemale motus verus nodorum Æquatoris, & Æclipticæ major erit medio in ratione cosinus distantiae nodi ascendentis ab Æquinoctio. Nodo ascendente ab hyemali Solstitio tendente ad Æquinoctium autumnale motus verus iidem gradibus imminuetur, quibus antea augebatur, ac demum æquabitur motui medio ubi nodus ascendens pervenerit ad ipsum autumnale Æquinoctium. In altera semirevolutione nodorum Lunaræ orbitæ contrarium accidet, & motus verus semper motu medio erit minor.

PROPOSITIO TRIGESIMASECUNDA.

Invenire differentiam inter motum medium præcessionis, & motum maximum, sive minimum, qui pendet ex vario loco nodorum Lunaræ orbitæ, & Æquatoris.

RESOLUTIO.

Juxta secundum, ac tertium propositionis antecedentis corollarium nodo ascendente in punctis Æquinoctialibus constituto differentia inter motum medium præcessionis, & motum verum evadet maxima, & erit =

$$\frac{\pm 3Q \cdot Kdz}{2\pi k t} \left((1-\tau^2) - \tau \right) \sqrt{(1-l^2)}. I. Itaque ad motum medium$$

$$\text{præcessionis } \frac{3Q \cdot Kdz}{2k t} \sqrt{(1-\tau^2)} (1-l^2) \text{ differentia eadem ma-}$$

$$\text{xima se habebit ut } \pm \left((1-\tau^2) - \tau \right) : \pi \sqrt{(1-\tau^2)} \sqrt{(1-l^2)}.$$

Quare si in punctis Æquinoctialibus semper maneret nodus ascendens Lunaræ orbitæ, & media præcessio annua ex viribus Lunæ orta vocaretur P , esset differentia mediæ,

12

&

& maximæ, aut minimæ præcessionis =

$$\frac{\pm P \cdot (1 - \pi^2) - \pi^2}{\pi \sqrt{(1 - \pi^2)} \sqrt{(1 - h)}} \cdot Q. E. I.$$

COROLLARIUM PRIMUM.

Est vero $(1 - \pi^2) - \pi^2 = 2(1 - \pi^2) - 1$, qui est cosinus duplæ inclinationis Eclipticæ, & Æquatoris, atque est $\pi \sqrt{(1 - \pi^2)}$ dimidium sinus ejusdem duplæ inclinationis, adeoque est $\frac{\pi \sqrt{(1 - \pi^2)}}{(1 - \pi^2) - \pi^2}$ dimidia tangens duplæ ejusdem inclinationis. Itaque tangens duplæ inclinationis Eclipticæ, & Æquatoris se habebit ad duplam tangentem inclinationis Eclipticæ, & Lunariorum ut præcessio annua mediocris Æquinoctiorum vi Lunæ genita ad differentiam inter præcessionem mediam, & maximam, sive minimam.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Si ob modicam inclinationem Lunariorum orbitæ pro $\sqrt{(1 - h)}$ scribatur 1 prodibit aliud plane elegans Cl. Walmesley theorema; scilicet erit tangens duplicatæ inclinationis Eclipticæ ad Æquatorem ad sinum duplicatæ inclinationis orbitæ Lunariorum ad Eclipticam ut præcessio annua mediocris vi Lunæ genita ad differentiam inter præcessionem mediocrem, & maximam, sive minimam.

PROPOSITIO TRIGESIMATERTIA.

Dato loco nodorum Lunariorum orbitæ invenire æquationem totam motus medii præcessionis.

RESOLUTIO.

Summa motuum omnium mediorum erit ad totam præcessionis æquationem, quo tempore nodus ascendens Lunæ
per

per datum arcum Eclipticæ MN regreditur ut summa omnium $\pi \sqrt{(1-\pi^2)(1-l^2)}$ ad summam omnium \pm

$((1-\pi^2)-\pi^2) \sqrt{(1-l^2)} \cdot lq - \pi \sqrt{(1-l^2)} \cdot l^2 q^2$, sive ut

summa omnium $\pi \sqrt{(1-\pi^2)} \frac{(-l) \cdot dq}{\sqrt{(1-q^2)}}$ ad summam omnium \pm

$((1-\pi^2)-\pi^2) \sqrt{(1-l^2)} \cdot lq dq - \pi \sqrt{(1-\pi^2)} \cdot l^2 q^2 dq$. Est ve-

ro summa omnium $\pi \sqrt{(1-\pi^2)} \frac{(1-l) \cdot dq}{\sqrt{(1-q^2)}} = \pi \sqrt{(1-\pi^2)}$

$(1-l) \cdot MN$, & summa omnium $\pm ((1-\pi^2)-\pi^2)$

$\sqrt{(1-l^2)} \frac{lq dq}{\sqrt{(1-q^2)}} = \pm ((1-\pi^2)-\pi^2) \sqrt{(1-l^2)} \cdot l \cdot \sin. MN$,

ac denique est summa omnium $\frac{q^2 dq}{\sqrt{(1-q^2)}} = -q \sqrt{(1-q^2)} + Sdq$

$\sqrt{(1-q^2)}$. Itaque motus medius præcessionis Æquinoctio-

rum erit ad totam medii motus æquationem ut $\pi \sqrt{(1-\pi^2)}$

$(1-l) \cdot MN: \pm ((1-\pi^2)-\pi^2) \sqrt{(1-l^2)} \cdot l \cdot \sin. MN$

$+ \pi \sqrt{(1-\pi^2)} \cdot l^2 \cdot \sin. MN \cdot \cos. MN - \pi \sqrt{(1-\pi^2)} \cdot l^2 \cdot Sdq \sqrt{(1-q^2)}$. $\mathcal{Q}. E. I.$

COROLLARIUM PRIMUM.

Quia summa omnium $\pm ((1-\pi^2)-\pi^2) \sqrt{(1-l^2)} \cdot lq$ proportionalis est sinui arcus MN , qui metitur distantiam nodi ascendentis Lunaræ orbitæ a puncto verni Æquinoctii, reliqui autem termini, qui æquationem totalem exprimunt, multiplicantur per l^2 , adeoque ob parvitatem negligi possunt; tota mediocris motus præcessionis Æquinoctiorum æquatio augebitur in simplici ratione sinus distantie nodi ascendentis Lunaræ orbitæ a puncto verni Æquinoctii quam proxime.

Co-

COROLLARIUM SECUNDUM.

Quo tempore nodus ascendens Lunæ ab Æquinoctio ad Solstitium regreditur, erit tota præcessio media Æquinoctiorum ad totam præcessionis æquationem ut $\pi \sqrt{(1-\pi^2)} (1-l^2) \cdot \frac{1}{4} p : \pm ((1-\pi^2) - \pi^2) \sqrt{(1-l^2)} \cdot l - \pi \sqrt{(1-\pi^2)}$.

$l^2 \cdot \frac{1}{8} p$, aut negligendo posteriorem terminum ob parvitem ipsius l , & scribendo 1 pro $\sqrt{(1-l^2)}$, erit tota præcessio media ad differentiam veræ, & mediæ præcessionis ut $1 : \frac{\pm ((1-\pi^2) - \pi^2) \cdot l}{\pi \sqrt{(1-\pi^2)} \cdot \frac{1}{4} p}$.

COROLLARIUM TERTIUM.

Quare si motus medius nodi ascendentis Lunaris orbitæ ad motum medium præcessionis Æquinoctiorum vi Lunæ genitum se habeat ut $m : 1$, quo tempore nodus ascendens absolvet arcum 90° , erit motus medius præcessionis $= \frac{1}{m} 90^\circ$, & mediæ, ac veræ præcessionis differentia erit $= \frac{\pm ((1-\pi^2) - \pi^2) \cdot l \cdot 90^\circ}{m \pi \sqrt{(1-\pi^2)} \cdot \frac{1}{4} p}$.

COROLLARIUM QUARTUM.

Cum vero fit $\pm \frac{((1-\pi^2) - \pi^2)}{\pi \sqrt{(1-\pi^2)}}$ tangens inclinationis duplæ Æquatoris ad Eclipticam, & 2 l duplus sinus inclinationis Lunaris orbitæ ad Eclipticam, aut proxime sinus inclinationis duplæ; aliud habebitur Cl. Walmesley theorema: *est tangens duplicatæ inclinationis Æquatoris, & Eclipticæ ad radium ut sinus duplicatæ inclinationis orbis Lunaris,*
G

§ *Eclipticæ ad finem quemdam, tumque est motus medius nodorum ad motum medium Æquinoctiorum vi Lunæ genitum ut sinus mox inventus ad finem æquationis Æquinoctiorum maximæ.*

PROPOSITIO TRIGESIMAQUARTA.

Invenire motum medium præcessionis, quæ ex Luna oritur, pro qualibet nodorum Lunarum orbitæ revolutione.

RESOLUTIO.

Quia dato loco nodorum Lunarum orbitæ motus medius præcessionis per *Coroll. 1. Propos. 31.* est =

$$\frac{3QKdz}{2\pi k} \left(\pi \nu (1-\pi^2)(1-l^2) \pm [(1-\pi^2)-\pi^2] \cdot lq \sqrt{(1-l^2)} - \pi l^2 q^2 \sqrt{(1-\pi^2)} \right),$$

& termini $\pm q$ una nodorum eorundem revolutione se mutuo destruunt, atque est insuper $\frac{3QKdz}{2\pi k} \sqrt{(1-\pi^2)}$ præcessio

media, quam Luna gigneret si in plano Eclipticæ revolveretur; erit præcessio in hypothese Lunæ revolutæ in Ecliptica ad præcessionem mediam veram, ut summa omnium radiorum ad summam totidem $(1-l^2) - l^2 q^2$, sive ut summa omnium $\frac{dq}{\sqrt{(1-q^2)}}$ ad summam omnium $((1-l^2) - l^2 q^2)$

$\frac{dq}{\sqrt{(1-q^2)}}$, sive denique ut $p : (1-l^2)p - \frac{1}{2}l^2p = 1 : 1 - \frac{3}{2}l^2$, & erit motus medius in priore hypothese ad differentiam duorum motuum ut $2 : 3l^2$. *Q. E. I.*

COROLLARIUM.

Effet vero motus medius annuus præcessionis

$\frac{3QK \cdot 360^\circ}{2\pi k} \cdot \sqrt{(1-\pi^2)}$, si Luna non in orbe suo, sed in plano Eclipticæ revolveretur. Revoluta igitur Luna in orbe suo

erit

erit præcessio media Æquinoctiorum $\frac{3QK \cdot 3600}{2sk} \cdot \sqrt{(1-\tau^2)}$
 $\left((1-l^2) - \frac{1}{2} l^2 \right) = \frac{3QK \cdot 3600}{2sk} \cdot \sqrt{(1-\tau^2)} (1-l^2) \left(\frac{1-l^2}{2(1-l^2)} \right)$,
 videlicet duplo major quam Sylvabellius *sect. 4. probl. 12.*
1711. 35. invenerat.

PROPOSITIO TRIGESIMAQUINTA.

Invenire variationem inclinationis Eclipticæ, & Æquatoris, quæ ex Luna oritur.

RESOLUTIO.

Cum tangens deviationis axis, quæ ex viribus Lunæ gignitur, sit $\frac{3L \cdot \sin.AOD \cdot \cos.AOD \cdot Db^2 \cdot Kdz}{A \cdot Ag \cdot LT^3 \cdot kds}$, erit angulus, quem axis, ac polus Terræ circa lineam nodorum *Nn* describet $\frac{3L \cdot \sin.AOD \cdot \cos.AOD \cdot Db^2 \cdot TG \cdot Kdz}{A^2 \cdot Ag \cdot LT^3 \cdot kds}$, aut potius $\frac{3Q \cdot \sin.AOD \cdot \cos.AOD \cdot Db^2 \cdot TG \cdot Kdz}{A^2 \cdot Ag \cdot sk}$. Est autem $TG = \cos.AN = \sin.AO \sin.NO - \cos.AO \cdot \cos.NO = Ag \cdot \sin.NO - Tg \cdot \cos.NO$. Proditur igitur variatio eadem $\frac{3Q \cdot \sin.AOD \cdot \cos.AOD \cdot Db^2 \cdot \left(\sin.NO - \frac{Tg}{Ag} \cdot \cos.NO \right) \cdot Kdz}{A^2 sk}$. Rursum in triangulo spherico *AOD* est $\cos.AOD$ ad finem totum ut cotangens arcus *DO*, sive $\frac{Tb}{Db}$, ad cotangentem arcus *AO*, sive $\frac{Tg}{Ag}$; adeoque variatio evadet $= \frac{3Q \cdot \sin.AOD \cdot \cos.AOD \cdot Db^2 \cdot \sin.NO \cdot Kdz}{A^2 sk} - \frac{3Q \cdot \sin.AOD \cdot Db \cdot Tb \cdot \cos.NO \cdot Kdz}{A^2 sk}$. *Q. E. I.*

Co-

COROLLARIUM PRIMUM.

Prior hujus æquationis terminus pendebit ex vario loco nodorum Lunarum orbitæ, & vario loco Lunæ in sua orbita, posterior vero una Lunæ semirevolutione contrariis finis destruetur. Est vero $\frac{1}{2} A^2$ valor medius quantitas $D b^2$,

& $\frac{\frac{1}{2} A^3}{\frac{1}{4} p A}$, five $\frac{2 A}{p}$ valor medius quantitatis $D b \cdot T b$. Itaque

erit variatio media inclinationis Eclipticæ, & Æquatoris vi Lunæ genita = $\frac{3 Q \cdot \sin. A O D \cdot \cos. A O D \cdot \sin. N O \cdot K d z}{p t k}$

$\frac{6 Q \cdot \sin. A O D \cdot \cos. N O \cdot K d z}{p t k}$.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Si Luna in plano Eclipticæ revolveretur, foret $\sin. N O = 0$, $\cos. N O = 1$, $\sin. A O D = \pi$, & motus medius variatæ inclinationis evaderet = $\frac{6 Q \pi K d z}{p t k}$, & si fieret $\frac{1}{4} t$ ad quar-

tam partem periodici temporis Lunæ ita $\frac{6 Q \pi K \cdot 90^\circ}{p t k}$ ad

quantum numerum proportionalem, esset tota variatio inclinationis genita eo tempore, quo Luna tenderet ab Æquatore ad Tropicos = $\frac{6 Q \pi K \cdot 27 \frac{1}{2} 90^\circ}{t (365 \frac{1}{4})^3 \cdot \frac{11}{7}}$.

COROLLARIUM TERTIUM.

In hypothefi Terræ homogeneæ cum fit $\frac{K}{k} = \frac{p}{A}$, erit tota variatio inclinationis tendente Luna ab Æquatore ad

K

Tro-

Tropicos = $\frac{6Q\pi\varphi a \cdot 27 \frac{1}{3} \cdot 900}{A \left(365 \frac{1}{4}\right)^2 \cdot \frac{11}{7}}$, dupla scilicet quam statuerat
Sylvabellius *prob. 15. num. 39.*

PROPOSITIO TRICESIMASEXTA.

Invenire quantitatem nutationis terrestris axis.

RESOLUTIO.

Quoniam est $\text{Sin. } NO = \frac{\sqrt{(1-q^2)} \cdot \text{Sin. } OMN}{\text{Sin. } AOD}$ erit pars variationis $\frac{3Q \cdot \text{Sin. } AOD \cdot \text{Cos. } AOD \cdot \text{Sin. } NO \cdot Kdz}{2\pi k}$, quæ per
binos quadrantes contrariis signis non destruitur =
 $\frac{3Q\sqrt{(1-q^2)} \cdot \text{Sin. } OMN \cdot \text{Cos. } AOD \cdot Kdz}{2\pi k} =$
 $\frac{3Q \cdot \sqrt{(1-q^2)} \cdot l \left(\sqrt{(1-\pi^2)} \sqrt{(1-h)} + \pi l q \right) \cdot Kdz}{2\pi k}$, aut neglecto posteriore termino = $\frac{3Q \cdot l \sqrt{(1-\pi^2)} \sqrt{(1-h)} \sqrt{(1-q^2)} \cdot Kdz}{2\pi k}$,
Est vero summa omnium $\sqrt{(1-q^2)} = 1 + q$, adeoque una
semirevolutione nodorum Lunæ erit $\frac{2}{\frac{1}{2}p}$, five $\frac{4}{p}$ valor
medius quantitatis $\sqrt{(1-q^2)}$, atque ita emerget motus medius
variatae inclinationis Eclipticæ ad Æquatorem =
 $\frac{6Q \cdot l \cdot \sqrt{(1-\pi^2)} \sqrt{(1-h)} \cdot Kdz}{p\pi k}$, & summa motuum omnium
mediorum, five tota inclinationis variatio pro unaquaque
nodorum Lunæ semirevolutione =
 $\frac{6Q \cdot l \cdot \sqrt{(1-\pi^2)} \sqrt{(1-h)} \cdot K \cdot 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot 1800}{p\pi k} \cdot Q. E. I$

COROLLARIUM PRIMUM.

Dato nodorum loco erit summa variationum omnium habitarum ad variationem totam ut $1 + q : 2$, sive ut sinus versus distantiae nodi ascendentis Lunæ ab Æquinoctio vero ad diametrum. Differentia vero inter dimidium variationis totius, & variationem habitam dato tempore quocumque erit ad dimidium totius variationis ut $q : 1$, sive ut cosinus distantiae nodi ab Æquinoctio ad radium. Hæc erit æquatio media obliquitatis Eclipticæ, & in regressu nodi ab hyemali Solstitio ad Solstitium æstivum addenda erit, ac subtrahenda in reliqua revolutionis parte ut habeatur media Eclipticæ obliquitas.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Eclipticæ obliquitas evadet maxima cum nodus ascendens Lunæ ad initium arietis perveniet, minima vero cum perveniet ad initium Libræ. Maximæ, & minimæ obliquitatis Eclipticæ differentia erit =

$\frac{6Q \cdot l \cdot \sqrt{(1 - e^2)} \sqrt{(1 - h)} \cdot K \cdot 9 \frac{1}{3} 3600}{p \cdot k}$, dupla similiter quam statuerat Sylvellius *probl. 13. num. 37.*

COROLLARIUM TERTIUM.

Quia denique est $\frac{1800}{m}$ præcessio Æquinoctiorum, quæ una semirevolutione nodorum Lunaris orbitæ gignitur ob vim Lunæ, & ad variationem inclinationis Eclipticæ, & Æquatoris sese habet ut $\frac{3Q \cdot \sqrt{(1 - e^2)} \sqrt{(1 - h)} \cdot K dz}{2rk}$,

$\frac{6Q \cdot l \cdot \sqrt{(1 - e^2)} \sqrt{(1 - h)} K dz}{p \cdot k}$ sive ut $p \sqrt{(1 - h)} : 4 l$, aut proxime ut $p : 4 l$, erit variatio tota = $\frac{4 l \cdot 1800}{p \cdot m}$, adeoque erit

K 2

110-

motus nodorum ad motum *Æquinoctiorum* vi *Lunæ* genitum ut sinus duplæ inclinationis orbitæ *Lunaris* ad *Eclipticam* ad sinum semissis variationis totius inclinationis *Eclipticæ* ad *Æquatorem*. Hoc aliud *Cl. Walmesley* theorema est.

PROPOSITIO TRIGESIMASEPTIMA.

Invenire proportionem virium *Solis*, & *Lunæ*.

RESOLUTIO.

Juxta observationem primam, & *Propof.* 21., & 31. est

$$\frac{3(1+Q)\sqrt{(1-\pi^2)} \cdot K \cdot 360^\circ}{2ik} = 50.3''$$

Pariter juxta observationem secundam, & tertiam, & *Propof.* 36. est

$$\frac{3Q \cdot l \sqrt{(1-\pi^2)} \sqrt{(1-l^2)} \cdot K \cdot 18\frac{7}{12} \cdot 360^\circ}{pik} = 19''$$

Abolvitur enim revolutio nodorum *Lunaris* orbitæ annis 18, & 7 mensibus, ut dictum est. Erit itaque $(1+Q) \cdot p : Q \cdot l \cdot \sqrt{(1-l^2)}$.

$18\frac{7}{8} = 503:95$. Jam vero juxta observationem quartam est $l = \sin. 5^\circ 8\frac{1}{2}' = 0.0896186$, & $\sqrt{(1-l^2)} = \sin. 74^\circ 51\frac{1}{2}' = 0.9959761$; adeoque hisce numeris specierum loco substitutis habebimus

$$(1+Q) 31415 : Q \cdot 0.0896186 \cdot 0.9959761 \cdot 5000 \cdot \frac{225}{12} = 503:95$$

$$(1+Q) 376980 : Q \cdot 100417 = 503:95$$

$$1+Q : Q = 100417 \cdot 503 : 376980 \cdot 95 = 503:356$$

$$1 : Q = 147:356 = 1:2.422 \cdot Q \cdot E. I.$$

COROLLARIUM PRIMUM.

Quia vires, per *Coroll.* 14. *Prop.* 66. lib. 1. *Princip. Mathem.* *Newtoni*, sunt ut densitates corporum *Solis*, & *Lunæ*, & cubi diametrorum apparentium conjunctim; densitas *Solis*

lis erit ad densitatem Lunæ ut $1 : 2 \cdot 422$ directæ, & cubus diametri Solis ad cubum diametri Lunæ inverse, sive (diametros apparentes mediocres Solis, & Lunæ statuendo cum eodem Newtono $32' 12''$, & $36' 16 \frac{1}{2}''$), ut $1 : 2 \cdot 422$, & $52861038777 : 57691436544$ conjunctim, sive denique ut $1 : 2 \cdot 643$.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Densitas autem Terræ ad densitatem Solis se habet ut $4 : 1$ per *Coroll. 3. Propos. 8. lib. 3. Princip. Mathem.* Quare densitas Terræ ad densitatem Lunæ se habebit ut $4 : 2 \cdot 643$. Et quoniam vera Lunæ diameter est ad veram diametrum Terræ ut $100 : 365$, erit massa Terræ ad massam Lunæ ut $4 : 2 \cdot 643 \cdot 48627125 : 1000000$ conjunctim, sive ut $1945085 : 26430$, vel denique ut $73 : 1$.

COROLLARIUM TERTIUM.

Si distantia Terræ, & Lunæ 60 circiter semidiametrorum terrestrium dividatur in ratione $73 : 1$, habebitur distantia Terræ a centro gravitatis, circa quod cum Luna simul revolvitur. Et si fiat ut $22000 : \frac{60}{74}$ ita sinus totus ad quartum, erit $3 \cdot 5$ sinus anguli maximæ aberrationis Terræ ab eodem centro: adeoque Terra in prima quadratura septem secundis circiter gravitatis centrum antecedit, & totidem subsequetur in altera quadratura Lunæ, & differentia locorum omnis ne ad quartam quidem minuti unius partem ascendet.

PROPOSITIO TRIGESIMAOCTAVA.

Invenire quantitatem præcessionis annuæ, quæ ex Sole, & ex Luna oritur.

RESOLUTIO.

Summa duarum virium Solis, & Lunæ erit ad vim Lunæ

næ ut tota præcessio Æquinoctiorum, quæ ex Sole, & ex Luna oritur annis singulis, ad quantitatem præcessionis annuæ, quæ oritur ex Luna. Sunt vero per propositionem antecedentem duæ vires ad vim Lunæ ut 503 : 356, & per observationem primam est 50. 3" tota præcessio annua Æquinoctiorum. Itaque erit 35. 6", sive 35" 36" præcessio, quæ oritur ex vi Lunæ. Pariter erit præcessio ex Sole orta = 50. 3" - 35. 6" = 50" 18" - 35" 36" = 14" 42". Q. E. I.

COROLLARIUM PRIMUM.

Quia præcessio Æquinoctiorum eo tempore habita, quo Sol tendit ab Æquinoctiis ad Solstitia, est ad variationem totam inclinationis Eclipticæ, & Æquatoris, quæ ex Sole oritur, ut $\sqrt{(1 - \pi^2)} \cdot \frac{1}{8} p : \frac{1}{2} \pi$, sive ut $\sqrt{(1 - \pi^2)} \cdot p : 4 \pi$ erit

$$\text{tota inclinationis variatio} = \frac{\pi \cdot 14'' 42''}{p \sqrt{(1 - \pi^2)}} =$$

$$\frac{\pi \cdot 14'' 42''}{\pi \sqrt{(1 - \pi^2)}} = 1'' \text{ circiter.}$$

COROLLARIUM SECUNDUM.

Et quia præcessio, quæ ex Luna oritur annis singulis, est 35" 36", & quæ 7 dierum spatio habetur, scilicet eo fere tempore, quo Luna ab Æquatore ad Tropicos digreditur, est fere 41", si fiat ut $p \sqrt{(1 - \pi^2)}$ ad π , ita 41" ad quartum, manifestum fiet Luna ab Æquatore ad Tropicos transiente 11" circiter obliquitatem Eclipticæ imminui. Unde maxima obliquitatis Eclipticæ imminutio ex causis hisce orta erit circiter $1\frac{1}{6}''$, minor scilicet quam ut observationibus possit detegi. Sole, & Luna redeuntibus a Tropico ad Æquatorem Eclipticæ obliquitas redibit eadem.

COROLLARIUM TERTIUM.

Motus medius praeceffionis ad differentiam motus medii, & veri se habet ut sector NCT , *fig. 12.*, ad triangulum CHT .

Est autem sector NCT in octantibus $= \frac{1}{16} p A^2$, & triangulum $CHT = \frac{1}{4} A^2$. Si fiat igitur $\frac{1}{16} p A^2 : \frac{1}{4} A^2 =$

$\frac{14'' 37''}{8} : \frac{832''}{2p}$, eructur maxima aequatio motus medii in Octantibus. Prorsus autem contemnenda erit aequatio alia medii praeceffionis motus, quae pendet ex vi, & ex loco Lunae.

PROPOSITIO TRIGESIMANONA.

Invenire praeceffionis mediae aequationem, quae pendet ex loco nodi ascendentis Lunaris orbitae.

RESOLUTIO.

Praeceffio media æquinoctiorum vi Lunae genita eo tempore, quo nodus ascendens Lunaris orbitae a punctis Sol-

stitiis ad Æquinoctialia regreditur est $\frac{356'' \cdot 9 \frac{1}{2}}{20} = 166''$.

Insuper per *Coroll. 2. Prop. 33.* est motus medius Æquinoctiorum ad aequationem motus medii ut $\pi \sqrt{(1 - \pi^2)} \cdot p : 4 (1 - 2\pi^2) l = 1147734538494149580000 :$

122366528719932959616 . Erit igitur $18''$ circiter aequatio maxima praeceffionis praeceffioni mediae addenda dum nodus ascendens a Solstitio æstivo ad Æquinoctium vernum transibit, detrahenda vero dum a Solstitio hyberno transibit nodus ad Autumnale Æquinoctium. Quod si fiat ut sinus totus ad sinum distantiae nodi ascendentis Lunaris orbitae a puncto

to *Æquinoctii* verni, aut *Autumnalis*, ita $18''$ ad quantum habebitur *aquatio*, quae dato nodi *ascendentis* loco toti *praeceffioni* mediae addenda, aut detrahenda erit.

COROLLARIUM PRIMUM.

Quoniam initio *Novembris* mensis anno 1759 nodus *ascendens* *Lunae* ad prima *Cancr*i puncta perveniet, anno illo labente *cenferi* poterit *praeceffionem* *mediam* *aequinoctiorum* *verae* *aequalem* *effe*. Et quoniam nodus ipse medio *febre* anno 1764 ad *Æquinoctium* *vernum* *deferetur*, eo anno maxima habebitur *praeceffionis* *quantitas*, quae rursus in *mediam* *recidet* initio anni 1769, & circa finem anni 1773 *evadet* *minima*. A fine anni 1759 ad medium usque anni 1764 tota *praeceffio* *praeceffionem* *mediam* $18''$ *circiter* *superabit*, & $18''$ *pariter* a *praeceffione* *media* *deficiet* ab anni 1769 initio ad finem anni 1773.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Quod si accipiat *ur* *media* *nodi* *ascendentis* *longitudo*, quae anno *proposito* *cui*cumque *convenit*, & *quæ*ratur *aquatio* *tota* *praeceffionis* *anno* *illius* *debita*, tum *alia* *aquatio* *antede* *ndentis* *anni* *subtrahatur*, *prodibit* *quantitas*, qua *annua* *praeceffio* *vera* *mediam* *praeceffionem* *annuam* *proposito* *tempore* *superabit*. Ita *praeceffio* *maxima* anno 1764 erit $56''$, & erit $44''$ *circiter* *praeceffio* *minima* anno 1773. Annis 1762, & 1766 erit *vera* *praeceffio* $55''$, & $53''$ annis 1761, & 1767.

COROLLARIUM TERTIUM.

Et erit *differentia* *maximæ*, & *minimæ* *praeceffionis*, *fi* *ve* *differentia* *angulorum* a polo *terræ* circa *polum* *Eclipticæ* *una* *nodi* *ascendentis* *femi* *revolutione* ob *Lunæ* *vim* *descriptorum* $36''$. Si fiat igitur ut *sinus* *totus* ad *sinum* *inclinationis* *axis* *terrestris* ad *axem* *Eclipticæ* *sive* 10000000: $3983044 = 36'' : 14''$, is erit *angulus*, quem *axis* *terræ*

ræ in plano Coluri Æquinoctiorum ob Lunæ vim nutando eodem tempore absolvet.

PROPOSITIO QUADRAGESIMA.

Dato loco medio terrestris Poli, & distantia nodi ascendentis Lunaræ orbitæ ab Æquinoctio verno assignare locum verum.

RESOLUTIO.

Sit P , *fig. 17.*, locus medius terrestris Poli, & semiaxibus PA , PL , quorum primus jaceat in plano Coluri Solitiorum, & sit $= \frac{1}{2} 19''$, alter jaceat in plano Coluri Æquinoctiorum, & sit $= \frac{1}{2} 7''$ describatur Ellipsis $ALVQ$, & Ellipsi circumscribatur circulus $AGVD$, ac denique planum circuli, & ellipseos sit plano Eclipticæ parallelum. Respiciat punctum D initium Arietis, & angulus oPD exhibeat distantiam nodi ascendentis Lunaræ orbitæ, & accipiat angulus APO æqualis angulo oPD , atque ex O in semiaxem majorem PA demittatur perpendicularum OB , quod secet ellipsum in b ; dico punctum b esse locum verum terrestris poli. *Q. E. I.*

Etenim per *Coroll. 1. Prop. 36.* variatio dimidia inclinationis Eclipticæ, & Æquatoris est ad differentiam inter dimidiam variationem, & variationem habitam dato tempore ut sinus totus ad cosinum distantie nodi ascendentis a puncto Æquinoctii vernali, sive ut $PA:PA-BA=PA:PB$. Rursus juxta *Coroll. 1. Prop. 33.* erit $PL: Pb = PG:BO$, quæ est ratio sinus totius ad sinum rectum distantie ejusdem. *Q. E. D.*

COROLLARIUM.

Si nodus Lunæ uno signo distet a punctis Solstitialibus erit nutatio $8''$, si vero distet uno signo, & insuper 10° , 15° , 25° , 30° , erit $7''$, $6''$, $5''$, $4''$. Universim motus poli terrestres satis accurate exhiberi poterit ea curva, quæ describitur revolutione ellipsoe, cujus centrum circa polum Eclipticæ peripheriam circuli describat velocitate, quæ ad velocitatem maximam se habeat ut summa duorum quadratorum ex sinibus distantiarum Solis, & Lunæ ab Æquinoctiis in respectivas vires ductorum ad duplum quadratum sinus totius ductum similiter in vires ipsas.

SCHOLION GENERALE.

Newtonus *lib. 3. Principiorum Prop. 37.* comparatione maximorum, minimorumque æstuum maris, quos pedum 25 in Quadraturis, in Conjunctiōe vero, & Oppositione Luminarium 45 pedum Samuel Sturmīus ante Avonæ ostium deprehenderat, collegit vires Solis, & Lunæ inter se esse ut 1: 4. 4815. Maximos autem, minimosque æstus diversam proportionem inter se habere Maclovii D. Thouroud, & alii observatores alibi deprehenderunt. Insuper motus quilibet posterioris maris prioribus afficiuntur aliquo modo, immutanturque, & ne magnitudini virium impellentium accurate respondere possint impediuntur. Hæc ratio, & causa fuit, propter quam ex intervallo, & duratione æstuum potius quam ex æstuum quantitate vires Luminarium metiendas esse Daniel Bernoullius existimaverat. Porro ex duorum æstuum sibi proxime succedentium maxima earum virium proportio eruitur 1: 2, minima 1: 3, media 2: 5. At cum circa oras maris, ubi observationes circa æstum omnes institutæ sunt, non magnitudo æstuum dumtaxat, sed intervallum quoque, & duratio ex littorum, vadorumque loco turbetur, & alius plane fiat æstus, ac in libero, apertoque mari, Bernoulliana simul, & Newtoniana proportio virium rejicienda erat, &

& certioribus Præcessionis Æquinoctiorum, & nutationis terrestris axis Phænomenis determinanda.

At vero data ratione virium, & quantitate præcessionis annuæ, quæ ex Sole, & quæ ex Luna præcessio oriatur annis singulis definiri potest sine ullis fictis hypothesebus aut quantitatis fluidi, quod in terra exteriori sit, aut legis densitatis solidarum partium in interiore terra, aut Ellipticitatis Meridianorum. Id tanto quidem libentius præstitum a nobis est, quanto majores tenebras quæstioni de figura terræ, & proportionem terrestrium axium observationes nuper in Galliis habitæ offuderunt. Nam anno quidem 1751 cum de Telluris figura, & magnitudine differentes Peruvianum, & Lapponiensem Meridiani terrestris gradum, & Parisiensem etiam, ut post reditum Maupertuisii ex Lapponia correctus fuerat, ob oculos haberemus, putavimus Newtonianam terrestrium axium proportionem, & homogeneam Terræ hypothesein institutis observationibus non adversari. Deinde vero in dissertatione de motu diurno Terræ, quæ anno 1756 impressa est, cum de Africano insuper, & Italo Meridiani gradu ageremus, utrumque ab ea homogeneitatis hypothesei magis dissentire animadvertimus, licet aliquo modo utrumque posset conciliari. Nunc autem, quæ bis in Galliis diligentissime habita est Parisiensis gradus recognitio, quæstionem omnem, ut acute agebat Alembertius, efficit quantum Pyrrhonici desiderare possunt obscurissimam.

Et plane si semiaxis minor ellipseos vocetur a , differentia minoris, & majoris ϕa , abscissa a centro in minore axe supputata x , neglectis altioribus differentiae illius potestatibus, erit normalis perimetro ellipseos $= a - \phi a + \frac{\phi^2 a x^2}{a^3}$, & radius osculi

$\left(a - \phi a + \frac{\phi^2 a x^2}{a^3} \right) \frac{(a + \phi a)^2}{a^4} = a - \phi a + \frac{3\phi^2 a x^2}{a^3}$, adeoque inter ra sphaeroidica pergendo ab Æquatore ad Polos radii osculatores, & minimi arcus similes, & gradus Meridiani augebuntur in duplicata ratione applicatarum majoris axis, aut potius sinuum rectorum latitudinis. Et quia radius circuli osculatoris in communi intersectione Æquatoris, & Meridiani fiet a

L 2

— ϕ

— ϕa , in Polis vero $a + 2\phi a$, erunt inter se radius ille $a - \phi a$, semiaxis minor a , semiaxis major $a + 2\phi a$, & radius osculi in Polis $a + 2\phi a$ Arithmetice proportionales: quod alia methodo theorema *seft. 6. num. 16.* de Figura Terræ a Cl. Bouguerio erutum est. Si primus Meridiani gradus vocetur g , evadet

$\frac{3^{\circ} 28'}{a}$ differentia primi, & postremi gradus, qui ad polos desinit, quarta scilicet proportionalis semiaxi minori, differentia semiaxium, & triplo gradui, qui ab Æquatore incipit.

Quare si ϕa ad a se habeat ut 1: 229, & primus Meridiani gradus cum eodem Bouguerio definiatur Parisiensium hexapedarum 56753, erit differentia gradus primi, & ultimi hexapedarum 743: differentia vero duorum graduum in latitudine 0, & $66^{\circ} 20'$ erit hexapedarum 623: quo gradus iste evaderet hexapedarum 57376. Maupertuisius, focique alii præclarissimi in *lat. 66^{\circ} 20'* ex sex triangulorum seriebus probe inter se congruentibus statuerunt gradum hex. 57437. 9: Bouguerius vero correctione refractionis addita 57422. Quatuor aliæ triangulorum series gradum ipsum 30 circiter hexapedis breviorẽ exhiberent. Quare juxta probabilitatum regulas differentia omni divisa in ratione 6: 4, ex decem seriebus triangulorum gradus assumi posset hex. 57412. Ex serie ultima prodiret gradus hex. 59370, brevior scilicet 52 circiter hexapedis. Unde rursus differentiam 42 dividendo in ratione 10: 1, ex undecim omnibus seriebus pro suæ simul probabilitatis ordine compositis eruetur gradus hexapedarum circiter 57408, nonnisi 32 minor, quam juxta Newtonianam terrestrium axium proportionem, & homogeneæ terræ hypothesein esse oporteret. Hic autem error inter duos gradus Lapponiensem, & Peruvianum, qui inter se invicem referebantur, distributus errorem terrestrium mensurarum utrobique indicaret 16 dumtaxat hexapedarum, aut 1" in cælestibus observationibus: qui longe minor certe error est, quam ut idcirco Newtoniana axium proportio improbari debeat.

Pariter in latitudine $49^{\circ} 22'$ Meridiani gradus evaderet he-

xa-

xapedarum 57181. Ex veteribus Picarti mensuris definiebatur hexapedarum 57060, & iisdem eum Maupertuisio emendatis 56925. 7: ex nova vero amplitudine, quæ post reditum Parisiensem Academicorum ex polari circulo anno 1739 sumpta est, retentis Trigonometricis Picarti dimensionibus prodiit 57183, & habita refractionis ratione 57164. Præterea in latitudine $43^{\circ} 31'$ prodiret gradus hexapedarum 57105. Ex Cassini senioris observationibus hexapedarum circiter 57097 eo tutius assumi posse videbatur, quo observationes ipsæ per longius spatium institutæ fuerant, ut errores omnes exigui, qui subrepissent, in sex, & amplius gradus distributi unius gradus mensuram minus alterarent. Ulterius terrestres mensuras ad libellam maris reductas ab eodem Cassino fuisse constat, & in utroque extremo recognitas, magna cum lineis actu dimensis consensione: & in cælestibus observationibus omnes refractionis, præcessionisque Æquinoctiorum correctiones fuisse adhibitas: correctione vero alia propter lucis aberrationem, ob habitas iisdem tempestatibus in Septentrionali, & Australi Galliarum parte observationes, opus non fuisse. Novissime a Domino de Thury in latitudine $43^{\circ} 31'$ mensura unius gradus statuta est Parisiensem hexapedarum 57048. Differentiam 57, quæ non minus theoriam, observationesque inter, quam ipsas inter observationes deprehenditur, adhuc minorem esse Astronomi intelligent, quam ut Newtonianæ terrestrium axium proportionis in Octantibus minor, quam in Polis, & Æquatore cum Phænomenis consensio censetur.

Quia vero radius æquatorem osculans est ipsa semidiameter Æquatoris, evadet Æquatoris gradus = $\frac{ag + gag}{a - gag} = g +$

$\frac{2gag}{a}$, hoc est differentia gradus unius Æquatoris, & primi gradus Meridiani erit quarta proportionalis semiaxi minori, duplæ semiaxium differentiæ, & ipso gradui Meridiani. In iisdem hypothesibus prodibit gradus Æquatoris hexapedarum 57248, Æquatoris ambitus 20609280, semiaxis major Terræ 3180166, semiaxis minor 3265904, differentia semiaxium

axium 14262, five pedum 85572, pedibus 100 major, quam Newtonus in *Prop. 19. lib. 3.* Principiorum determinaverat. Paralleli gradus pro qualibet latitudine erit =

$$(57248 + 57248 \cdot \frac{9 \cdot a \cdot x^2}{a^3}) \sqrt{\frac{(a^2 - x^2)}{a}}. \text{ Ita in latitudine } 43^\circ 32'$$

erit gradus circuli paralleli hexapedarum 41588. Ex accuratissimis Cassini, & Caillii observationibus prodiit idem gradus hexapedarum 41618, scilicet major 30 hexapedis: quod rursus observationum, & Newtonianæ proportionis axium discrimen exiguum est, & in exiguos Astronomicæ praxeos errores satis commode refundi posset.

Quid erit ergo, quod Meridiani gradus in latitudine $43^\circ 32'$ hexapedarum Parisiensium 56979, a Claris. Boscovichio, & Mairio deprehensus sit, quem hexap. 57098 juxta eandem hypothesen esse oporteret? Ego in jam indicata de diurno motu dissertatione cum plane nollem observatorum diligentissimorum industriam criminari, aut Romanorum instrumentorum cum Gallicis comparationem aliquam instituere, prætereundum tamen non censui quod ex mutua omnium corporum gravitate in quavis aut homogeneæ, aut heterogeneæ terræ hypothesi consequitur, non omnia scilicet superficiei terrestres loca instituendis observationibus æque apta, nec gravitatis directionem citra, & ultra majores montes, & in ipsis montium verticibus eandem esse. Maximi idcirco duxi mensuram gradus 1200 hex. supra libellam maris, & prope altissimos Peruvianos montes institutam, qui cum in plano Meridiani jaceant quadrantis filum ad Boream, aut ad Austrum deflectere non poterant. Eodem loco Lapponienses observationes habui: quippe ad metiendam totius arcus amplitudinem poli elevatio in vertice montis Kittis sumpta est, ubi nulla aberratio fieri esse poterat, atque ex altero arcus ipsius extremo Torneæ, quæ Urbs fere duas inter montium series constituitur. Paralleli gradus in latitudine $43^\circ 32'$ ex Pyrenæorum montium actione, qui quali arcum paralleli circuli alterius referunt, alterari nequaquam poterat: nec alia potest intelligi variatio Meridiani gradus, qui in Orientali montium eorundem termino desinebat. Hæc ratio, & causa fuit,
pro-

propterquam, cum eas quatuor observationes inter se satis convenientes animadverterem, Newtonianam terrestrium axium proportionem adhuc in tuto positam esse existimaui.

Porro in Italia nostra, ad definiendam terrestris arcus, duorum circiter graduum, amplitudinem, elevationes poli citra, & ultra Appenninos montes Romæ, & Arimini sumptæ sunt: qui plane montes cum attractione sua pendulum utrobique trahendo in contrarias partes interjectum caelestem arcum majorem faciant, terrestris etiam gradus mensuram breviorcm exhibere debent. Neque ad observationes cum homogeneitatis hypothefi conciliandas aberratione magna opus est. Ubi errorem terrestrium omnium, ac caelestium mensurarum, secundis duobus inter se dissentientium, 30, aut 40 hexapedarum censeamus, actionem Appenninorum montium statuamus solius Chimborasi actione subduplam fuisse, eam pariter in Italia mensuram gradus habebimus, quæ cum aliis observationibus, & homogeneae terrae hypothefi conveniat. Ob contrariam rationem conjici facile, ac divinari poterat in Australi Africae parte, & circa Promontorium Bonae Spci Meridiani terrestris gradum justo majorem, longiorcmque esse. Nam si omnem differentiam materiae, quæ in tota Africa, & amplissimo Oceano Australi est alicujus montis Æquatorem versus constituti vices gerere intelligamus, in extremo arcus per Promontorium ipsum transeuntis quadrantis filum Æquatorem versus aberrare necesse erit, & magis quidem ubi Æquatori filum erit propius. Quo jam in caelo observatus arcus minuetur, & spatium uni gradui respondens in terra augebitur. Discrimen omne 61 hexapedas non superat: cum ex Caillii observationibus in latitudine $33^{\circ} 18'$ meridiani gradus sit 57037 hexapedarum, & juxta superius dicta 56976 dumtaxat esse debeat.

Tot & tantorum montium Italiae nostrae attractione alterari gravitatis directionem, erroresque alios in caelesti arcu, & terrestri Meridiani gradu subrepere Alembertius etiam suspicatus fuerat in praefatione tertiae partis suarum de Mundi systemate disquisitionum. At vero in Galliis, ubi nihil hujusmodi conspicitur, quod breviorcm arcum efficiat, in latitu-

tu-

tudine scilicet $49^{\circ} 22'$, ex nova caelestis arcus amplitudine, novisque terrestribus mensuris a Caillio, & Cassino institutis anno 1740, Meridiani gradus statutus est hexapedarum $57074 \frac{1}{2}$, hexapedis 106 $\frac{1}{2}$ minor quam ex principiis superioribus esse oporteat. Et ne posterioris hujus gradus correctionis, quae ab aliis prioribus adeo discrepat, indigentiae suspicio aliqua esse posset, anno rursus 1756 a Cl. Monnierio, aliisque Academiae Regiae sociis celeberrimis recognita, & confirmata correctio est. Ubi quis differentiam omnem observationum, & Newtonianae hypotheseos majorem censcat, quam ut quibusdam praxeos erroribus tribuatur, rejicienda telluris homogeneitas, & plures interni textus dissimilitudines admittendae erunt. Idem ex pendulorum longitudinibus dubium instaurari posset. Nam si longitudo penduli secundis singulis oscillantibus cum Cl. Bouguerio sub aequatore definiatur linearum 439. 21, Parisiis 440. 67, Pelli 441. 27, differentiae 1. 46, 2. 06 erunt quidem inter se quam proxime ut quadratum sinus recti latitudinum $48^{\circ} 50'$, $66^{\circ} 48'$, quemadmodum in ellipsi quacumque esse oportet: At si ex iisdem differentiis quaerantur ellipseos semiaxes, praesto erit nonnisi admissio erroris quintae partis unius lineae experimenta inter se invicem comparata ad Newtonianam proportionem reduci posse. Nos cum alibi satis de erroribus, qui in pendulorum longitudinibus, aut Meridiani gradibus determinandis observatorum industria declinari nequeunt, disseruissimus, modo a quaestione omni, quae in dies fit implicatio, abstinuimus, & nihil aliud dissertationis hujus initio assumpsimus loco hypotheseos, ac postulati, quam quod ex ipsa diurni motus ratione videtur consequi, quod scilicet Figura Terrae ad sphacroidicam proxime accedat, sub polis aliquantulum compressam, & duabus hemisphaeroidibus fere similem. Conclusiones autem inde erutas, & quaedam etiam theoremata, quibus pervenimus ad conclusiones ipsas, cum aliis Celeberr. Simplicii convenire, non sine magna animi voluptate, dum haec eduntur accipimus, nobis modo ex Anglia delatis summi, & ingeniosissimi Mathematici operibus.

DIS-

PAULLI FRISII
D E
A T M O S P H Æ R A
CÆLESTIUM CORPORUM
DISSERTATIO PHYSICO-MATHEMATICA,
Q U Æ A N N O M D C C L V I I I .
A REGIA PARISIENSI SCIENTIARUM ACADEMIA
PRÆMIUM CONSECUta EST,

P R Æ F A T I O.

SEro, & cum adhuc pauciores menses ad constitutum dissertationibus absolvendis terminum superessent, in regionibus hisce nostris nuntiatum fuit Regiam scientiarum Academiam, præmio proposito, quæsisse utrum caelestia corpora suas Atmosphæras habeant, & quousque Atmosphærarum limites pertingant. Et primo quidem me perculit argumenti hujus elegantia, & pulchritudo: deinde, quasi experiundi animo, nonnulla, quæ occurrebant menti ea de re, certo ordine distribuere, & diligentius mecum ipse considerare capi: & cum denique pedetentim, ut fieri solet, progressus essem, atque ex operibus celeberrimis Clarissimorum Clairaut, d'Alembert, de Mairan, Cassini, de la Caille, aliorumque Academiæ Regiæ sociorum plura eduxissem, quæ ad illustrandam, enodandamque quæstionem pertinent, visum fuit toti Academiæ, quæ jam quodamodo sua erant, singula communicare. Dissertationem omnem decem capitibus complexus sum. Primo Astronomicas, & Physicas observationes, veteres, recentioresque collegi undique, quibus compertum, atque exploratum est Soli, & Lunæ, & reliquis Planetis, ac Satellitibus, Cometisque, ac Stellis fixis Atmosphæras suas non deesse. Secundo initis calculis investigavi quam Atmosphærae amplitudinem circa Planetas, potissimum Secundarios patiatur esse universalis, ac mutua eorum gravitas. Capite tertio, cum Atmosphærae uniuscujusque motum observationibus, ac Mechanicis legibus definissem, exploravi limites alios, qui ex æquilibrio gravitatis, & vis centrifugæ oriri possunt. Quarto Atmosphærae formam determinavi, quæ cum diversis hypothesebus vis centrifugæ, & interioris nuclei diversimodè respondeat, nibilominus ad sphaeroidem circa Polos compressam proxime accedat necesse est. Quinto ex aliorum Planetarum actionibus

M 2

tran-

transire in eam figuram demonstravi, quæ gigneretur revolutione Ellipseos Apollonianæ circa majorem axem, si interim axis minor data ratione imminui, augerique intelligeretur. Capite sexto accuratiorem methodum exhibui, quæ montium altitudines, & rarioris aëris termini ex altitudinibus Barometricis supputentur. Septimo densitatem, confinia, variationes Atmosphæræ Solis, & variationum earumdem causas scrutatus sum. Octavo reliqua comprehendendi, quæ de Atmosphæra Planetarum inferiorum, Cometarumque, & caudarum genesi, figura, & magnitudine probabiliter dici posse mihi videbantur. Nono explicavi sententiam meam circa Atmosphæræ Lunaris indolem, & extensionem. Denique postremo capite dissertationis nonnulla adjeci, quæ superiorum Planetarum Atmosphæras, & diurnum Saturni motum, & Martis attractionem, densitatem, massam limite aliquo definiunt. Academia judicio singula subjicere honoris causa, & singillatim recensere necesse est.



DE



D E

ATMOSPHERA CÆLESTIUM CORPORUM

DISSERTATIO.



CAPUT PRIMUM.

De phenomenis uniuscujusque Atmosphære.

QUamvis tanto intervallo cælestia corpora a nobis disjuncta sint, ut pleraque nudis oculis non aliam speciem, quam lucentium, & scintillantium punctorum referant; nihilominus post inventum Telescopium, perfectamque Astronomiam eousque ab Astronomis celeberrimis progressum est, ut vestigia etiam fluidorum Planetas omnes, Cometasque, ac Stellas fixas circumambientium innotuerint. Cassinus, quem nobis anno antecedente ereptum desideravimus, in Monumentis Regiæ Scientiarum Academiæ, retulit, Telescopio pedum 114, Saturnum
fan-

ansis destitutum anno 1715, die 25 Martii, hora 10 $\frac{3}{4}$ vespertina, ejusdem formæ vidisse se, cujus Jovem Telescopio pedum 34 solebat intueri. Præferebat illæ tres Zonas, libi invicem parallellas, & rectilineas, quarum quæ media erat, & formabatur ex projecta umbra annuli, ægre distingui poterat: Aprili mense cum ad eamdem observationem sæpius rediisset, nihil aliud discriminis invenit, quam quod octava die Meridionalis Zona intermediæ propius accesserat. Adjecit etiam Cassinus, Augusto mense anni 1696 in conspectum prodeunte annulo Saturnum binas zonas consimiles exhibuisse, arctiores quidem, & curvas aliquantulum, ac verus annulum convexas; annis vero 1675, 1683, 1708, non nisi unicam habuisse; ac sæpe nullam. Porro hæc vicissitudo zonarum, modo apparentium, modo evanescentium, & modo unam, modo aliam formam præferentium, cujuspiam fluidi, quod circumquaque Saturnum ambiat, indicium est. Eodem argumento Hugenius Atmosphæram Jovis irregulari, & varia zonarum forma demonstravit, quæ cum parallellissimum accurate servant inter se invicem, modo majorem distantiam tamen, & modo minorem habent. Idiplum confirmat varius zonarum numerus: siquidem Cassino teste in Monumentis anni 1735 quandoque binæ, & quandoque tres, & etiam quinque zonæ apparent in disco Jovis. Nec prætereundæ sunt maculæ, quas primum anno 1665 detexit Cassinus senior, & quas numero plures, amplioresque deprehendit anno 1690, quando ex Solis propinquitate Jupiter vehementius incaluerat. Singulares earundem macularum variationes Cassinus ipse observavit subsequente anno 1691, & potissimum quod cum Jupiter 9^h 56' circa centrum revolvatur, ut ex zonarum periodo colligitur, maculæ illæ 9^h 50', aut 9^h 51' absolverint revolutionem suam, adeoque aliquem motum proprium habuerint, quo periodum Jovis 5', aut 6' anteverterint, & qui non nisi in fluidis partibus motus proprius concipi, & esse potest.

Quæ in Martis etiam superficie maculæ, & zonæ distinguuntur, diversam adeo figuram, extensionem, locum, Cassino

sino seniori anni 1666, 1670, & Maraldo annis 1704, &, 1719 obtulerunt. Anno insuper 1672 Cassinus idem in distantia 6' a disco Martis, Briaræ, Telescopio pedum 3, Stellam in effusione Aquarii positam distinguere amplius non potuit: Roemerus autem Lutetiæ Parisiorum, optimo Telescopio, non antea eamdem Stellam emerfam vidit, quem ipsius distantia a limbo Martis exæquasset duas tertias partes diametri. Stellam aliam quintæ magnitudinis Marti proximam disparuisse retulit Cassinus filius in Monumentis Parisiensibus anni 1735. Porro, quod nonnulli objecerunt, tot Phænomena, tot in locis, tantisque instrumentis observata observationum indigentia, & vitio instrumentorum tribuenda esse, ineptum adeo, ac injurium mihi videtur, ut ne rejici quidem longiore Oratione aliqua mereatur.

Lunæ suam pariter esse Atmosphæram cum alii ex aliis argumentis colligant, tum ego ex eo potissimum fulgore ostendi censéo, qui Eclipseos Solaris tempore, ad instar annuli, Lunarem discum circumambit, & circa interiorem marginem vividior est, & usque in latitudinem patet, ut duodecimam partem diametri totius exæquet. De phænomeni veritate dubitare amplius non licet, cum illud Neapoli Keplerus, Heinrichus Wratislaviæ, Wolfius Lipsiæ, Tiguri Scleuzerus, Narbonæ Pechius, Londini Hallejus, Parisiis Maraldus, Berolini Eulerus, Bononiæ Manfredius, & Stancarius, alique alibi observaverint. Phænomenon autem ipsum videtur in solam Lunæ Atmosphæram refundi posse. Quod Bononiensi Academiæ Stancarius, & Parisiensi Isleus junior proposuerat anno 1715, radios Solis prope Lunæ marginem transeuntes, inflexosque conjicere sese in umbram, & coruscantis annuli speciem exhibere, cum tanta illa annuli altitudine componi nequit, nisi statuatur vim inflectentem lucis, quæ in minimis dumtaxat terrestrium corporum distantis se prodit, ad usque integrum Lunarem digitum, seu tria fere minuta prima extendi posse. Contra longe amplior, & non Lunæ, sed Soli concentricus esset annulus, si, ut censuerat Cassinus, oriretur ex ipsa Luce ab Atmosphæra Solis reflexa, remissaque ad terram nostram, quæ licet præsen-
te

10 Sole non conspiciatur, fiat tamen sole obtesto manifestissima. Superest ergo, quæ Louvillei, Wolfii, aliorumque erat sententia, consurgere annulum ex luce, quæ ab Atmosphæra Lunæ circumquaque Eclipsæ Solaris tempore ad nos reflectitur.

Idem confirmat, quod solertissimi Stephens, & Harris in Transactionibus *Philos. vol. 47. num. 23.* memorant, se scilicet magno Shortii Telescopio die 22 Aprilis anno 1751, crescente Luna oblongam lucis semitam conspexisse, quæ per totam Platonis maculam traducebatur: tum alteram agnovisse priori similem, & parallellam, quæ rursus in binas alias dividi visa est. Lucidam unam, ac rubescentem semitam jam observaverat Blanchinus, & genitam censuerat ex radiis lucis, qui per apertos montium hiatus, veluti per fenestras traderentur. Angli autem hiatus ipsos, & divisionem montium, ex qua oriebantur, conspexerunt. Jam vero subruer color alicujus refractionis, & refringentis medii certissimum indicium est. Deinde sine ullo fluido nullus radiorum tractus per totam maculam transeuntium videri posset: sicuti ablati æris particulis, quæ lumen undique reflectunt, nullum amplius appareret vestigium luminis per exiguum foramen in obscurum cubiculum trajecti. Denique quicumque in solidas montium partes, & circumpolita hiatuum latera occursum fiat, cum eodem angulo semper incidat, & reflectatur lux, atque in ea Lunæ crescentis phase ad maculam Platonis obliquitate maxima perveniat, numquam ad oculos inde nostros remitti posset.

Solares etiam maculas, quæ 12 diebus apparent in disco Solis, & latent postmodum diebus 15, supra Solem altius ascendere, & Atmosphæra alicui innatare necesse est. Hoc enim dato cum tota apparitionis, & occultationis differentia in integra macularum periodo sit dierum 3, in singulis quadrantibus fiet 18 horarum, quo tempore absolvunt maculæ trigessimam sextam partem unius revolutionis, sive 10° . Cum igitur sinus versus 10° se habeat ad sinum totum ut 1520 : 100000, atque ob maximam Solis distantiam, & radiorum inde emergentium parallellissimum, sinus versus 10° fere ex-

hi-

hibeat differentiam semidametrorum Solis, & orbitæ a maculis percurfæ; erit altitudo macularum supra Solem ad orbitæ semidiametrum ut 15: 1000, & ad semidiametrum Solis ut 15: 985. Ita cum supra Solem ad hanc usque altitudinem ferantur maculæ, ac pensiles subsidant, & duas, aut tres etiam revolutiones quandoque absolvant, fluidum aliquod debet esse, quod a Solari superficie avulsas exhalationes suæ gravitatis excessu elevet, ac diutissime sustineat. Idipsum confirmat lumen, quod anno 1683, cum per Zodiacum latissime extendi cerneret Cassinus senior, Zodiacale appellavit, & cujus extensionem, variationem, figuram, Phænomena omnia post Cassinum Eimmartus, Fatius, Mairanus, Kirchius, aliique tanta diligentia observarunt.

Deprehenderunt autem potissimum celeberrimi observatores Zodiacalem hanc lucem, sive Atmosphæram Solis ultra Mercurii, & Veneris, & quandoque etiam Terræ orbitam protendi. Nam cum maxima Veneris distantia a Sole sit 48° , longitudo lucis Zodiacalis nunquam minor est 60° , aut 50° , & aliquando major 80° , 90° , & 100° . Utique die 6 Februarii anni 1688 solum 45° visa est. At observavit optime Mairanus nitorem Veneris, & fulgura prope horizontem conspicua apparentem longitudinem tunc temporis imminuisse. Quo posito cum Atmosphæræ Solari innatent Venus, & Mercurius, & corpora omnia attrahant sese mutuo, partem aliquam illius fluidi circum undique debent rapere, & cohibere, & nisi jam peculiarem Atmosphæram habeant, sibi illico comparare. Id in Cometis quoque, ut Cl. Mairanus animadverterat, locum obtinet. Maxime cum Soli propius accedentes Cometæ, ac vehementer incallescens, vapores copiosissime emittant, & capillitium illud exhibeant, quod interiorem nucleum complectitur, & ex parte Soli adversa in longissimam caudam abit. Hac vero aucti caloris, & emergentium exhalationum ratione simul probari poterat Planetas omnes Primarios, ac Secundarios fluido aliquo circumdari.

Cassinus tandem similitudinem, & analogiam quamdam apprehendit Solaris hujus Atmosphæræ, & luminis alterius, quod circa nebulosam Andromedæ conspicitur. Magnis e-

tenim Telescopiis circa nebulosam illam detexit scintillas quasdam, & lucis globulos, reliquis affines, quos in luce Zodiacali & ipse aliquando, & Mairanus postmodum Telescopiis 7, & 8 pedum observaverat. Plane hæc phænomena, & variationes aliæ quibus Kirchius disparere agnovit nebulosam, & in conspectum redire alternis vicibus, atque insuper gradatio lucis, quæ primum Simoni Mario vividior circa centrum anno 1612 visa est, Atmosphæram nebulosæ aliquam indicarent. Similis est macula, quam Kirchius anno 1681 prope pedem Borealem Antinoi centro suo stellam completi animadvertit. Maculas alias anno 1677 exhibuit Halæjus in Centauro, & in Constellatione Herculis anno 1714. Pariter anno 1665 Abrahamus Ihle maculam detexit, quæ caput inter, & arcum Sagittarii radium fere vibrare videbatur. Denique tractus lucidus, quem circa nebulosam Orionis anno 1656 observaverat Hugenus, figura irregularem, partibus suis continuum, & colore degenerem a toto cælo, & quem exteriore forma, & lucis quantitate mutatum esse Picartus anno 1673, & postea Astronomi celeberrimi Grand Jean, de Mairan, & Goudin deprehenderunt, satis ostenderent stellis fixis suas Atmosphæras non deesse, ubi etiam reliqua analogiæ, & convenientiæ argumenta omitteremus.

CAPUT SECUNDUM.

De gravitate, & limite Atmosphære.

Qui primi Atmosphære limites censendi sint Cl. Mairanus de Aurora Boreali cum ageret *sect. 3. cap. 1.* indicavit. Scilicet cum corpora omnia gravitent in se mutuo, & cum gravitas sit directe massis attrahentibus, & quadratis distantiarum reciproce proportionalis; ibi Atmosphæra consistere non poterit, ubi attractione aliorum corporum a Planeta, quem ambit, distraheretur. Sit F quantitas materiæ Planetæ unius S , *fig. 16*, ϕ quantitas materiæ Planetæ alterius in T positi, ac fiat $ST = a$, $TN = x$, $NM = y$; crit attractio puncti M

ver-

versus primum = $\frac{F}{x^2 \pm 2ax + x^2 + y^2}$, attractio versus alterum

= $\frac{F}{x^2 + y^2}$: & si binæ vires hujusmodi inter se æquantur, e-

rit $y^2 = \frac{F x^2 \pm 2 a x x - x^2}{F - F}$, æquatio ad curvam, quæ transi-

bit per omnia puncta M : & si statuatur $y = 0$, prodibit x
 $\sqrt{F} = (a - x) \sqrt{\phi}$, & attractionum limes LT evadet =

$\frac{a \sqrt{\phi}}{\sqrt{F} + \sqrt{\phi}}$. Sit itaque T Terra, S Sol, & massa Solis se habeat

ad massam Terræ ut 227512 : 1, quemadmodum in se-

cunda Principiorum editione ex parallaxi horizontali Solis

10" deduxerat Newtonus, & distantia Terræ a Sole juxta

Ephemerides Parisienses definiatur semidiametrorum terre-

strium 21626: erit attractionum limes quam proxime semi-

diametrorum 45, & fere 52, si massarum proportio 169282:

1 assumatur, quam in tertia editione operis ipse cruerat ex

parallaxi horizontali 10" 30". Pariter si massa Terræ ad mas-

sam Lunæ sit ut 50: 1, quemadmodum ingeniosissimus A-

lembertius ex Phenomenis nutationis terrestris axis deter-

minaverat, & minima Lunæ distantia definiatur semidiamet-

rorum terrestrium 54, semidiametris 6 $\frac{3}{4}$ circiter distabit a

Lunæ centro attractionum terrestrium limes, ac limes alius

Solarium attractionum semidiametris 7 $\frac{1}{2}$. Ad tantum usque

intervallum portionem aliquam Solaris Atmosphæræ uterque

Planeta abripere, & copulare sibi ipsi poterit: neque tamen

is erit limes terrestris, aut Lunaris Atmosphæræ. Cum e-

nim præ attractione, qua circumpositas, extremasque parti-

culas Sol agitat, negligenda amplius non sit vis alia exerci-

ta in Terram totam; illi Atmosphæræ evadent limites, in qui-

bus gravitas versus Terram exæquat differentiam eorumdem

attractionum. Ita nostræ Atmosphæræ satis amplos terminos

permittet gravitas, & ampliores adhuc Saturno, & Jovi, qui

& magis a Sole distant, & majorem quantitatem materiæ

complectuntur. Hanc vero ob causam Saturniorum, & Jo-

vialium Satellitum Atmosphæaræ arctiores erunt. Ponatur Satellites aliquis in T , & Primarius in S , ac reliqua maneant ut supra. In limite L habebitur

$$\frac{\phi}{x^2} = \frac{F}{a^2 - 2ax + x^2} - \frac{F}{a^2} = \frac{(2ax - x^2) \cdot F}{(a^2 - 2ax + x^2) a^2}, \text{ \& neglctis altioribus abscissæ } x \text{ potestati-}$$

bus eruetur $\phi a^3 = 2 F x^3$, sive $x = a \sqrt[3]{\frac{\phi}{2F}}$. His positis

si quantitas materiae in Jove, & Terra statuatur cum Newtono $\frac{1}{1067}$ & $\frac{1}{169282}$ & Satellites singuli Lunae nostrae proxime aequales sint, erunt massæ Jovis, & Satellitis cujuslibet 7933,

& 1, atque x evadet proxime $= \frac{1}{25} a$: scilicet si distantiae qua-

tuor Satellitum Jovialium a centro Primarii sui juxta Cassinum definiantur semidiametrorum Jovis 5, 8, 13, 23, respectivi attractionum limites erunt 0.2, 0.32, 0.52, 0.92. Pari ratione si massa Saturni ad massam Terrae sit ut 169282:3021, adeoque ad massam Satellitis ut 8464100:3021, sive ut 2802:1, fiet $x = \frac{1}{8} a$ circiter, aut, quia Satellitum distantiae

assumi possunt 1.95, 2.5, 3.5, 8, & 24 semidiametrorum annuli, fient attractionum limites 0.108, 0.139, 0.194, 0.444, 1.333. Hi maximi Atmosphæararum limites in ea parte, qua Primarios respicient, censendi erunt. Aliis enim in locis hinc inde positis, Primariorum actione, gravitas versus centrum Satellitum augebitur quoquomodo, & fluidi, quod in acquilibrio esse debet, altitudines imminuentur.

In Luna nostra evadet $x = a \sqrt[3]{\frac{1}{100} \cdot \frac{54}{4 \cdot 65}} = 11.6$ semidiametrorum terrestrium. Nec si attractiones Terrae, & Solis simul conspirent, & conjungantur, sensibilibiter arctiores Atmosphæaræ hujus limites prodibunt. Sit enim quantitas materiae in Sole, Terra, & Luna F , π & ϕ , distantia Solis

a , distantia Terrae b , fiet $\frac{\phi}{x^2} = \frac{F}{a^2 - 2ax + x^2} - \frac{F}{a^2} +$

$$\frac{x}{b^2 - 2bx + x^2} - \frac{\tau}{b^2} = \frac{(2ax - x^2) \cdot F}{(a^2 - 2ax + x^2) a^2} = \frac{(2bx - x^2) \tau}{(b^2 - 2bx + x^2) b^2},$$

& altioribus neglectis ipsius x potestatibus $\frac{F}{x^2} + \frac{2Fx}{a^3} + \frac{2\tau x}{b^3}$,

unde eruetur $x = \frac{ab \sqrt[3]{9}}{\sqrt[3]{(2b^3 F + 2a^3 \tau)}} = \sqrt[3]{\frac{1167804}{1014078732322400}} = 11.$

6. Aliae igitur in natura universa causae quaerendae erunt, quae arctiores Atmosphaerarum limites efficiant.

CAPUT TERTIUM.

De motu, & limitibus aliis Atmosphaerae.

U No, eodemque angulari motu circa centrum Planetas simul, & Planetarum Atmosphaeras volvi ex quibusdam observationibus, & Mechanicae legibus compertum est. Maculae Solis, licet diversis temporibus appareant, occultenturque, nec pari intervallo semper ultra Solarem superficiem eleventur; integram tamen revolutionem diebus 27 respectu Terrae, & diebus $25 \frac{1}{2}$ Fixarum respectu absolvunt. Cassinus anno 1676, Kirchius anno 1684, Newtoni Interpretes anno 1739, Stannyanus anno 1703, alique maculas diebus 12 in Solis disco apparere deprehenderunt, & diebus 15 ultra Solem occultari, adeoque distare a Sole $\frac{15}{985}$ totius semidiametri Solaris, sive una fere, ac dimidia terrestri semidiametro, si Solis semidiametro semidiametri terrestres centum tribuantur, & tota macularum periodus statuatur dierum 27. Quare periodum, & altitudinem macularum minuendo in ratione 27: 25 $\frac{1}{2}$, erit vera altitudo semidiametri terrestris 1.

32.

Jam vero tom. 7. Petropolitanae Scientiarum Academiae Kraftius ex omnibus iis maculis, quas annis 1728, 1729, 1730

1730 conspexerat, unam memorat, cujus certa erat reversio, & quae apparuit diebus 13, & 14 diebus latuit, adeoque a Solis superficie non nisi sexta semidiametri terrestris parte distare poterat. Plures maculas, quae dimidio revolutionis totius tempore conspicuae fuerint, ipsique adhaeserint Solis superficiei Cl. Monnierius indicat *Instit. Astronom. cap. 5.*, & Keillius *lett. 5.* Ex tot iis, quarum historiam contexerat Scheinerus, vix fuit aliqua, quae apparuerit diebus 12, plures quae diebus $12\frac{1}{2}$, 13, & $13\frac{1}{2}$ visae sint. Quae anno 1625, die 3 Julii, hora 8 matutina ingressa erat in Solis discum, die postmodum 15, hora 8 vespertina egressa est. Pariter quae eodem anno die 23 Maji oriente Sole discerni amplius non poterat, mane die 6 Junii jam erat redux, & post decimam octavam diem noctu occubuerat. Macula etiam, quae in Solis discum die 22 Martii, matutina hora $8\frac{1}{8}$ intraverat, exivit

die 4 Aprilis, hora $1\frac{2}{9}$ vespertina, & die 18, hora 3 vespertina rursus apparuit, ac demum die 1 Maji, hora 8 matutina, extra Solem deprehensa est. Jam vero si omnium macularum, & fluidi, cui innatant, velocitas esset eadem in Solis superficie, & altitudine 1.32 semidiametri terrestris, periodica earum tempora pro varietate distantiarum fore ut 10000, & 10132, & discrimine horarum octo different inter se invicem. Quare cum diversarum revolutionum tempora aequalia sint, velocitas absoluta proportionalis erit distantiae a centro, & ubique angularis velocitas erit eadem.

In Tellure etiam nostra nullos sensibiles, & regulares ventos experimur, qui ex vario angulari motu Telluris ipsius, & aeris, aut in extrema superficie, aut in vertice altissimorum montium oriri possint. Si radius aequatoris ut supra statuatur hexapedarum Parisiensium 3280166, & Chimborasi montis altitudo sit 3220 hexapedarum, erit differentia spatiorum diurno motu a radice, & vertice Chimborasi circa axem Terrae descriptorum 20231 hexapedarum circiter, sive pedum Parisiensium 121386, quos per unam naturalem diem, sive

86164ⁿ

86164" dividendo, præsto erit ventum ex eo defectu velocitatis angularis ortum in montis vertice pedes $3 \frac{1}{2}$ unoquoque secundo temporis absolvere debere.

At vero legem istam æqualium temporum periodicorum in singulis Atmosphæris, & in quocumque vortice ad permanentem statum delato universaliter locum habere jam indicavit, demonstravitque Alembertius in tractatu de fluidis §. 404, & 405. Nam si dato axe rotationis vortex, aut Atmosphæra in quocumque strata cylindrica, & concentrica dividi intelligatur, particulae in eodem strato sibi invicem contiguæ, se accelerabunt semper, aut retardabunt, donec communem velocitatem adeptæ sint. Rursus ab inferioribus ad superiora strata motus aliquis semper transibit, donec idem angularis motus, & una fiat omnium periodus. Quæcumque igitur potentia, ac vires Atmosphærae particulis impressæ sint, unica hac lege demum componi poterunt, nisi Atmosphæra alicubi evadat varior, quam ut finito aliquo tempore ad eandem motus rationem deducatur. Hoc posito cum vis centrifuga sub æquatore proportionalis sit distantis simplicibus a centro, gravitas vero in ratione duplicata auctarum distantiarum imminuat, fient denique inter se æquales. Scilicet si Planetæ radius sit $=r$, gravitas sub æquatore $=g$, vis centrifuga, $=c$ gravitas in distantia quacumque $x = \frac{r^2 g}{x^2}$, vis centrifuga $= \frac{c x}{r}$, sta-

tuendo $\frac{r^2 g}{x^2} = \frac{c x}{r}$, eructur $x = r \sqrt[3]{\frac{g}{c}}$. Ultra hos limites constitutas Atmosphærae alicujus particulas dum suam singulae velocitatem adipiscuntur proportionalem distantiae a centro, vis centrifugae conceptae excessu dispergi undique, ac dissipari necesse erit. In Æquatore Telluris nostrae cum gravitas ad vim centrifugam se habeat ut 289 : 1, erit quæsitus limes $= r \sqrt[3]{289} = r \cdot 6 \frac{1}{13}$. Est vero gravitas in superficie Jovis ad gravitatem in superficie Terræ in ratione 943 : 435 per *Cor. 1. Prop. 8. lib. 3. Princip. Mathem.* & vis centrifuga in Æquatore Terræ ad vim centrifugam in Æquatore

tore Jovis est in ratione composita ex simplici directa diametrorum $1 : 10$, & reciproca duplicata temporum periodicorum 24 , & 10 , sive ut $10 : 576$. Erit itaque gravitas in Æquatore Jovis ad vim centrifugam in ratione composita ex rationibus $943 : 435$, $289 : 1$, $10 : 576$, sive ut $11 : 1$, & limes erit $2 \frac{1}{4}$ semidiametrorum Jovis, sive terrestrium semi-

diametrorum $22 \frac{1}{2}$. Est etiam gravitas in superficie Solis ad gravitatem in superficie Terrae ut $10000 : 435$, & vis centrifuga in Æquatore Terrae ad vim centrifugam in Æquatore Solis in ratione directa diametrorum $1 : 100$, & reciproca duplicata temporum periodicorum $1 : 25 \frac{1}{2}$, adeoque gravitas ad vim centrifugam in Æquatore Solis se habet circiter ut $42387 : 1$, & numero integro limes idem evadet 35 semidiametrorum Solis, sive terrestrium semidiametrorum 3500 .

CAPUT QUARTUM.

De figura Atmosphaerae.

ESTO $AHFB$, fig. 17., Meridianus aliquis sphaeroidis circa Polos H , B compressae, proxime ad sphaeram accedentis, in suis omnibus partibus homogeneae, & quae fluido $MGED$ satis raro circum ambiatur, ut scilicet possit negligi attractio fluidarum partium inter se. Esto insuper semiaxis minor $HS = n$, major $AS = n + b$, sinus latitudinis puncti $T = s$, semidiameter $TS = n + b - bs^2$, & semidiameter conjugata $SZ = n + bs^2$. Denique per ordinatas singulas semidiametro TS traductis planis quibuslibet proposito Meridiano perpendicularibus, dividatur sphaeroidis in totidem ellipses similes, & circulis affines. Intelligitur facile, quod Cl. Clairaut §. 41., 42., & 44 par. 2. de Figura Terrae demonstravit, Ellipseos cujuscumque attractionem in punctum

Quæqualem esse attractioni circuli ejusdem areae, qui in centro suo perpendiculariter semidiametrum TS secet: ac propterea attractioni sphaeroidis nostrae substitui posse attractionem alterius sphaeroidis, cujus revolutionis semiaxis sit TS , & quae eandem soliditatem cum priore illa complectatur, quae scilicet semidiametrum Aequatoris habeat mediam proportionalem inter SZ , & SA , sive inter $n + b s^2$, & $n + b$.

Esset vero hæc semidiameter $n + \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}b s^2$, differentia se-

midiametri, & semiaxis $-\frac{1}{2}b + \frac{3}{2}b s^2$, & differentia eadem per semiaxem majorem novae sphaeroidis divisa, sive sphae-

roidis excentricitas $\frac{-b + 3b s^2}{2n + 2b - 2b s^2}$. Porro si fiat $SP = x$, P

$Q = y$, & radius sit ad peripheriam ut $1 : p$, juxta §. 45. citati operis, erit attractio sphaeroidis hujus exercita in pun-

ctum $Q = \frac{2p(n + b - b s^2)^3}{3(x^2 + y^2)} + \frac{4p(n + b - b s^2)^3}{3(x^2 + y^2)} \cdot \frac{(-b + 3b s^2)}{(2n + 2b - 2b s^2)}$

$- \frac{4p(n + b - b s^2)^5}{5(x^2 + y^2)^2} \cdot \frac{(-b + 3b s^2)}{(2n + 2b - 2b s^2)} =$

$\frac{2p n^3 + 6p n^2 b - 6p n^2 b s^2 - 2p n^2 b + 6p n^2 b s^2}{(x^2 + y^2)} + \frac{2p n^4 b - 6p n^4 b s^2}{5(x^2 + y^2)^2}$

$= \frac{2p n^3 + 4p n^2 b}{3(x^2 + y^2)} + \frac{2p n^4 b}{5(x^2 + y^2)^2} - \frac{6p n^4 b s^2}{5(x^2 + y^2)^2}$

Gravitas in Aequatore fiet $\frac{2}{3}p n + \frac{2}{5}p b$, & si ratio gravitatis ad vim centrifugam sit $g : c$, & quantitas vis centrifugae prae gravitate factis sit parva, evadet absoluta vis centrifuga in $A = \frac{2p n c}{3g}$, & in P , aut $Q = \frac{2p c x}{3g}$. Cum ergo me-

dia harum virium directio RC ad æquilibrium tuendum esse debeat curvæ $MGED$ perpendicularis in puncto Q , ob subnormalem $PC = \frac{y dy}{dx}$, & interceptam $CS = \frac{x dx + y dy}{dx}$, habebitur

$\frac{2p n^3 + 4p n^2 b}{3(x^2 + y^2)} + \frac{2p n^4 b}{5(x^2 + y^2)^2} - \frac{6p n^4 b s^2}{5(x^2 + y^2)^2} : \frac{2p c x}{3g} = \frac{\sqrt{(x^2 + y^2)} : x dx + y dy}{dx}$

$$\frac{cx dx}{3g} = \frac{(n^3 + 2n^2 b)(xdx + ydy)}{3(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{n^4 b(xdx + ydy)}{5(x^2 + y^2)^{\frac{5}{2}}} - \frac{2n^4 b y^2 (xdx + ydy)}{5(x^2 + y^2)^{\frac{7}{2}}}$$

$$\frac{cx^2}{6g} + C = -\frac{(n^3 + 2n^2 b)}{3(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}} - \frac{n^4 b}{15(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{3n^4 b S y^2 (xdx + ydy)}{5(x^2 + y^2)^{\frac{7}{2}}}$$

$$\text{Est vero } \frac{S y^2 (xdx + ydy)}{(x^2 + y^2)^{\frac{7}{2}}} = \frac{-y^2}{5(x^2 + y^2)^{\frac{5}{2}}} + \frac{S_2 y dy}{5(x^2 + y^2)^{\frac{5}{2}}},$$

$$\& \frac{S_2 y dy}{5(x^2 + y^2)^{\frac{5}{2}}} = \frac{-2}{15(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{S_2 x dx}{5(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \&c. \text{ Quare per}$$

feriem infinitam definietur aequatio curvae *MGED*.

Quod si interior sphaerois ad sphaeram ita proxime accedat, ut cenferi possit $b = 0$, erit quaesita aequatio $\frac{cx^2}{6g} +$

$$C = \frac{-n^3}{3(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}}; \& \text{ quia posito } SM = a, y = 0, \& \frac{ca^2}{6g} +$$

$$C = \frac{-n^3}{3a} \text{ eruitur } C = \frac{-n^3}{3a} - \frac{ca^2}{6g},$$

completa aequatione habebitur

$$\frac{n^3}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{n^3}{a} + \frac{ca^2}{2g} - \frac{cx^2}{2g},$$

& quadrando utrimque ad tollendam asymmetriam

$$n^6 = \frac{n^6 x^2}{a^2} + \frac{n^6 y^2}{a^2} + \frac{ca n^3 x^2}{g} + \frac{ca n^3 y^2}{g} + \frac{2^2 a^4 x^2}{4g^2} + \frac{c^2 a^4 y^2}{4g^2} -$$

$$\frac{cn^3 x^4}{g^2} - \frac{cn^3 x^2 y^2}{g^2} - \frac{c^2 a^2 x^4}{2g^2} - \frac{c^2 a^2 x^2 y^2}{2g^2} + \frac{c^2 x^6}{4g^2} + \frac{c^2 x^4 y^2}{4g^2},$$

& ob parvitatem ipsius c negligendo omnes c^2 ,

n^3

$$n^3 = \frac{n^3 x^3}{a^3} + \frac{n^3 y^3}{a^3} + \frac{c a x^3}{g} + \frac{c a y^3}{g} - \frac{c x^4}{g a} - \frac{c x^3 y}{g a},$$

$$g a^3 n^3 - g n^3 x^3 - c a^3 x^3 + c a x^4 = g n^3 y^3 + c a^3 y^3 - c a x^3 y a^3$$

$$y^3 : a^3 - x^3 = g n^3 - c a x^3 : g n^3 + c a^3 - c a x^3.$$

Denique si altitudinem totius fluidi circumpositi modicam esse intelligamus, & fiat $a = n + \omega$, $n = a - \omega$, $n^3 = a^3 - 3 a^2 \omega$, prodibit

$$y^3 : a^3 - x^3 = g a^3 - 3 g a^2 \omega - c a x^3 : g a^3 - 3 g a^2 \omega + c a^3 - c a x^3$$

$$y^3 : a^3 - x^3 = \frac{g a^3 - 3 g a^2 \omega - c a x^3}{g a^3 - 3 g a^2 \omega - c a x^3} - \frac{c a^3}{g a^3 - 3 g a^2 \omega - c a x^3} : 1,$$

$$g^3 : a^3 - x^3 = 1 - \frac{c}{g} : 1 = g - c : g,$$

in hoc scilicet casu fluidi totius figura erit sphaeroidica, semiaxium quadrata inter se crunt ut $g - c : g$, semiaxes ipsi ut $g - \frac{1}{2} c : g$, & semiaxium differentia evadet $= \frac{c a}{2 g}$. Id plane

convenit cum theoremate, a quo elegantissimam tractationem de generali ventorum causa exorsus fuerat Alembertius. Quam priore aequatione definivimus, censi poterit figura Atmosphaerarum Terrae, & Jovis, qui duo prae caeteris Planetæ magis ad Polos compressi sunt. At c. animadvertamus differentiam semiaxium Jovis esse $\frac{1}{12}$, & semiaxium Terræ

differentiam esse circiter $\frac{1}{230}$ semiaxis totius minoris, deprehendimus non adeo posse a sphaeroide compressa abudere utriusque Atmosphaeræ formam, aut densiorum saltem stratorum, quæ Jovem propius, ac Terram ambiunt. In Planetis aliis Primariis, ac secundariis nulla hætenus diametrorum inæqualitas, detecta est. Planetæ insuper secundarii cum eodem tempore, & circa centrum, & circa suum Primarium revolvantur, minorem vim centrifugam concipiunt, quam ut a figura sphaerica sensibilibiter abducantur. Ex. gr. est vis centri-

trifuga in Æquatore terræ ad vim centrifugam in Æquatore Lunæ in ratione composita ex simplici diametrorum 4 : 1, & reciproca duplicata periodicorum temporum 1 : 27, sive ut 2916 : 1. Rursus in Æquatore Terræ est vis centrifuga ad gravitatem ut 1 : 289, & gravitas in superficie Terræ ad gravitatem in superficie Lunæ ut 3 : 1. Adeoque gravitas ad vim centrifugam in Æquatore Lunæ est ut 2916 . 289 : 3 = 280908 : 1. In Æquatore Solis gravitatem ad vim centrifugam se habere ut 42387 : 1 jam supra notatum fuit. Quare ad formam Sphæroidum compressarum Atmosphæræ Solis, Lunæ, & aliorum Planetarum omnium accedent maxime, & semiaxium differentia erit quarta proportionalis ad duplum gravitatis, vim centrifugam sub Æquatore, & majorem Atmosphæræ altitudinem supra centrum.

Neque id minus accurate dictum censeretur, quod gravitatem, & vim centrifugam inter se invicem componendo impulsionem radiorum luminis neglexerimus. Licet enim Solaris lux oculi humoribus collecta, delicatissimas nervi optici fibrillas impellendo sensum visionis excitet, & minimas etiam aliorum corporum partes calefaciendo agitet, solvat, fundat, & in vapores, ac fumum dissipet; vix tamen potest intelligi lucem tenuissimam, ac subtilissimam communicare aliis corporibus motum aliquem translationis, & eam vim corpora urgendo exercere, quæ ad totam vim gravitatis sensibilem rationem habeat. Motus illos, quibus Hombergus amianthi fila in foco speculi ustorii posita abripi animadvertit in Monumentis Parisiensibus anni 1708., ex calore, rarefactione, & explosione aëris speculi foco circumpositi ortos fuisse potius quam ex impulsiva radiorum vi, irregularitate eorundem motuum ostendit Cl. Mairanus, & ex eo quod teste Hombergi nulli amplius motus hujusmodi observabantur ubi amianthum *fût présente fort doucement, & une partie après de l'autre, de sorte qu'elle ne fût pas heurtée par le foyer trop rudement, ni dans tout sa surface à la fois.* Id etiam Mairanus confirmavit levissima ferri rota, ope acus magneticæ, horizontaliter suspensa. Animadvertit enim radios ex ipsius peripheria emergentes in foco lentis ita agitari, ut
mo-

modo antecederent, modo retrocederent. Figura denique, quam supputata impulsiva radiorum vi Atmosphæra Solis indueret, & quæ non amplius lenticularis juxta institutas observationes esset, sed alicubi asymptotos, & ramos duplices, ac cylindroides ad infinitum usque protensas complecteretur, satis indicat data illa, ex quibus hoc curvæ genus eruebatur, in natura locum non habere. Vide to. 2. Berolinensis Academiæ, & Commentaria Academiæ Parisiensis anni 1747.

CAPUT QUINTUM.

De variationibus Atmosphærae.

HÆc Atmosphærae figura esset, si sola singulas particulas vis centrifuga, & gravitas versus centrum agitare. At vero Planetarum aliorum omnium attractione figuram Atmosphærae, & totius fluidi altitudines immutari necesse est. Si altitudines sint satis parvæ, & Planetæ alii ab Æquatore uniuscujusque Atmosphærae parum recedant, facili calculo nova forma determinabitur. Esto enim *MGED* fig. 18., Meridianus atmosphærae aliquis, *MAEB* Æquator, *QCF* circulus Æquatori parallelus. Planeta in plano Æquatoris positus, & productione radii *SM* duplicem vim exercet in punctum *Q*. Vis $\frac{3}{2} QV$ proportionalis est radio paralleli circuli *QCF*, & vis *QS* in duas alias *SV*, $\frac{1}{2} V$ resolvi potest, quarum prior *SV* agit extra planum circuli ipsius, altera vero $\frac{1}{2} V$ est eidem radio proportionalis. Ex quo intelligitur adjectis iis attractionibus parallellos circulos in curvas similes esse abituros, & ex nova omnes Æquatoris forma determinari.

Jam vero si fiat $SZ = x$, & $HZ = y$, erit gravitas puncti *H* in Æquatore *MHAEB* utcumque positi =

2p

$$\frac{ns}{x^2 + y^2} = \frac{1}{a} + \frac{ca^2}{2g} + \frac{\Delta a^2}{g} - \frac{cx^2}{2g} - \frac{3\Delta x^2}{g} + \frac{\Delta y^2}{2g}$$

$$\frac{a^2 ns}{x^2 + y^2} = ns + \frac{ca^3}{y} + \frac{2\Delta a^3}{g} - \frac{cax^2}{g} - \frac{c\Delta ax^2}{g} + \frac{\Delta ay^2}{g}$$

$$ga^2n^2 = gn^2x^2 + gn^2y^2 + ca^3x^2 + ca^3y^2 + 2\Delta a^3x^2 + 2\Delta a^3y^2 - cax^4 - cax^2y^2 - 2\Delta ax^4 - 2\Delta ax^2y^2 + \Delta ax^2y^2 + \Delta ay^4,$$

$$gn^2y^2 + ca^3y^2 - cax^2y^2 - 2\Delta a^3y^2 - \Delta ax^2y^2 + \Delta ay^4 = ga^2n^2 - gn^2y^2 - ca^3x^2 + cax^4 - 2\Delta a^3x^2 + 2\Delta ax^4$$

$$y^2 : a^2 - x^2 = gn^2 - cax^2 - 2\Delta ax^2 : gn^2 - cax^2 - 2\Delta ax^2 + ca^3 + 2\Delta a^3 + \Delta ay^2 + \Delta ax^2,$$

$$y^2 : a^2 - x^2 = 1 - \frac{c}{g} - \frac{3\Delta}{g} : 1 = g - c - 3\Delta : g, \text{ videlicet Meridianus in ellipſim aliam abibit, cujus ſemiaxes erunt ut } g - \frac{1}{2}c - \frac{3}{2}\Delta, \& g.$$

Sectiones inſuper, quæ planis quibuſcumque diametro *ME* normalibus poſſunt effici, ellipſum ſimilium formam referent, & ſemiaxes habebunt $g - \frac{1}{2}c$, & g . Quo dato oſtendi poterit ſectiones omnes, quæ planis per totam diametrum *ME* traduſtis exoriuntur Ellipſes eſſe. Eſto aliqua ſectio hujusmodi *MndEF*, *fig. 19.*, quæ cum plano Meridiani *MDEG* conſtituat angulum *DSd*. Quoniam ſectiones diametro *ME* perpendiculares, ſunt ellipſes inter ſe ſimiles, ſimiles etiam erunt ſectores *DSd*, *NON*, ſive erit *Sd : On = SD : ON*, & quia Meridianus *MDEG* eſt ellipticus erit *SD : ON = MS : √MO . OE*, adeoque *Sd : On = MS : √MO . OE*. Ita in hypotheſi Planetæ ſphærici, motus diurni, & mutuæ gravitatis eam Atmoſphæra figuram adipiſceretur, quæ gigni poſſet variabili ellipſi *MGE* circa invariabilem axem *MS* *E* revoluta. Et quidem *MS*, *GS*, & ſemiaxis in

centro S Meridiani plano perpendicularis inter se erunt ut $g, g - \frac{1}{2}c - \frac{3}{2}\Delta, g - \frac{3}{2}\Delta$: tertia vero hæc semiaxis, quæ in tota ellipseos revolutione variabilis intelligitur, a plano \mathcal{E} -quatoris recedendo imminuetur in duplicata ratione sinus latitudinis.

CAPUT SEXTUM.

De Atmosphæra Terræ.

MOdo ut legem densitatis, & Atmosphæaræ terrestris limites accuratiore calculo determinemus, revertamur ad priorem terræ sphaeroidicæ hypothèsim, statuamurque, *fig.* 17, $SN = z$, sinum latitudinis puncti $N = s$, cosinum $= t$. Cæteris omnibus manentibus ut supra erit gravitas in loco

$$N = \frac{2pn^3}{3z^3} + \frac{4pn^2b}{3z^3} + \frac{2pn^4b}{5z^4} - \frac{6pn^4b^2}{5z^4}, \text{ vis centrifuga} =$$

$$\frac{2pctz}{3g}, \text{ \& ea portio vis centrifugæ, quæ secundum } NS \text{ ex-}$$

$$\text{xeritur} = \frac{2pctz}{3g}, \text{ adeoque erit totale pondus in loco } N =$$

$$\frac{2pn^3}{3z^3} + \frac{4pn^2b}{3z^3} + \frac{2pn^4b}{5z^4} - \frac{6pn^4b^2}{5z^4} - \frac{2pctz}{3g}. \text{ Si aëris densitas in}$$

eodem loco sit $= \pi$, atque ut ferunt plura Mariotti, aliorumque experimenta, sit proportionalis ponderibus comprimentibus, & propterea densitatum decremента proportionalia sint differentiis ponderum, seu pressionum, posita C constante aliqua quantitate, fiet $-Cd\pi =$

$$\frac{2pn^3\pi dz}{3z^3} + \frac{4pn^2b\pi dz}{3z^3} + \frac{2pn^4b\pi dz}{5z^4} - \frac{6pn^4b^2\pi dz}{5z^4} - \frac{2pct\pi z dz}{3g},$$

& si aëris densitas in loco T vocetur D , & sit A altitudo aëris homogenei pondere suo toti columnæ aëreæ TQ , sive Mercurio in Barometris suspensio æquipollentis, ob, $TS = n + b - bs^2$, erit in loco eodem $C \cdot D =$

P

A.

$$A \cdot D \cdot \left(\frac{2}{3}pn - \frac{4}{3}pb + \frac{4}{3}pbs^2 + \frac{4}{3}pb + \frac{2}{5}pb - \frac{6}{5}pbs^2 - \frac{2pec^2n}{3g} \right)$$

$C = A \cdot \left(\frac{2}{3}pn + \frac{2}{5}pb + \frac{2}{15}pbs^2 - \frac{2pec^2n}{3g} \right)$, & hoc valore in superiore æquatione substituto

$$-A \cdot \left(\frac{2}{3}pn + \frac{2}{5}pb + \frac{2}{15}pbs^2 - \frac{2pec^2n}{3g} \right) \frac{d\pi}{\pi} = \frac{2pn^3 dz}{3z^2} + \frac{4pn^2 b dz}{3z^2} + \frac{2pn^4 b dz}{5z^4} - \frac{6pn^4 bs^2 dz}{5z^4} - \frac{2pec^2 z dz}{3g},$$

$$-A \cdot \left(\frac{2}{3}pn + \frac{2}{5}pb + \frac{2}{15}pbs^2 - \frac{2pec^2n}{3g} \right) \cdot \log. \pi = -\frac{2pn^3}{3z} - \frac{4pn^2 b}{3z} - \frac{2pn^4 b}{15z^3} + \frac{2pn^4 bs^2}{5z^3} - \frac{pec^2 z^2}{3g},$$

quæ in loco T æquatio ad hanc alteram reducetur

$$-A \left(\frac{2}{3}pn + \frac{2}{5}pb + \frac{2}{15}pbs^2 - \frac{2pec^2n}{3g} \right) \log. D = -\frac{2}{3}pn^3 + \frac{2}{3}pnb - \frac{2}{3}pbn^2 - \frac{4}{3}pnb - \frac{2}{15}pn^2b + \frac{2}{5}pnbs^2 - \frac{pec^2 n^2}{3g} \quad \&$$

posteriorem hanc æquationem ex prioræ subtrahendo

$$\left(\frac{2}{3}pn + \frac{2}{5}pb + \frac{2}{15}pbs^2 - \frac{2pec^2n}{3g} \right) A \cdot \log. \frac{D}{\pi} = \frac{2}{3}pn^3 + \frac{4}{5}pbn + \frac{4}{15}pnbs^2 + \frac{pec^2 n^2}{3g} - \frac{2pn^3}{3z} - \frac{4pn^2 b}{3z} - \frac{2pn^4 b}{15z^3} + \frac{2pn^4 bs^2}{15z^3} - \frac{pec^2 z^2}{3g},$$

$$A \cdot \log. \frac{D}{\pi} = n + \frac{3}{5}b + \frac{1}{5}bs^2 + \frac{3ec^2 n}{2g} - \frac{n^2}{z} - \frac{7bn}{5z} - \frac{ec^2 n^2}{5z} + \frac{bn^2}{5z} - \frac{n^3 b}{5z^3} + \frac{3n^3 bs^2}{5z^3} - \frac{ec^2 z^2}{2ng},$$

$$10ngz^3 A \cdot \log. \frac{D}{\pi} = 10gn^3 z^3 + 6gbn z^3 + 2gbn^2 z^3 + 15ect^3 n^3 z^3 - 10gn^3 z^3 - 14gbn^2 z^3 - 10ect^3 n^3 z^3 + 2gbn^2 z^3 - 2gn^4 b + 6gn^4 bs^2 - 5ect^3 z^3.$$

$$\& \omega \text{ fiat } TN = u, ST = n + b - bs^2 + \omega, z^2 =$$

$$n^2 + 2nb - 2bn^2 + 2nu, z^3 = n^3 + 3n^2 b - 3n^2 bs^2 + 3n^2 \omega,$$

z⁵

$z^s = n^s + 5n^4b - sn^4bs^2 + sn^4\omega$, has quantitates rite substituendo, negligendoque terminos, in quibus aut rectangula $b\omega$, aut utriusque potestates occurrunt, eruetur

$$(n+3b-3bs^2+3\omega) 10gn^3 A. \log. \frac{D}{\pi} = 10gn^s + 30gbn^4 - 30gbbs^2n^4 + 30gn^4\omega + 6gbn^4 + 2gbbs^2n^4 + 15ct^2n^s - 10gn^s - 20gn^4b + 20gbn^4s^2 - 20gn^4\omega - 14gbbs^2n^4 - 10ct^2n^s + 2gbbs^2n^4 - 2gbn^4 + 6gbbs^2n^4 - 5ct^2n^s$$

$$(n+3b-3bs^2+3\omega) 10gn^3 A. \log. \frac{D}{\pi} = 10gn^4\omega$$

$$(n+3b-3bs^2+3\omega) A. \log. \frac{D}{\pi} = n\omega,$$

& si logarithmi ex vulgaribus tabulis accipiantur, ac modulus logarithmorum ponatur m , fiet

$$(n+3b-3bs^2+3\omega) \frac{A}{m} . \log. \frac{D}{\pi} = n\omega$$

$$mn\omega - 3\omega A. \log. \frac{D}{\pi} = (n+3b-3bs^2) A. \log. \frac{D}{\pi}$$

$$\omega = \frac{(n+3b-3bs^2)}{mn-3A} A. \log. \frac{D}{\pi}.$$

Ut hanc regulam nostram explicemus exemplo aliquo, statuamus quod Monnierii, & Cassini de Thury experimento diligentissimo compertum fuit, in *lat.* $45^\circ 25' 2''$ in vertice montis *le Puy de Domne* altitudinem Mercurii in Barometro suspensi esse *poll.* 23, *lin.* $9\frac{1}{2}$, sive *lin.* $285\frac{1}{2}$, & in radice montis *poll.* 27, *lin.* $\frac{1}{2}$, sive *lin.* $324\frac{1}{2}$. Erit in hoc

$$\text{casu } D:\pi = 324\frac{1}{2}:285\frac{1}{2} = 649:571, \text{ \& } \log. \frac{D}{\pi} = 2.8122447 - 2.7566367 = 0.0556 \text{ circiter, logarithmis Briggianis sumptis, \& posito logarithmorum modulo } 0.43429448. \text{ Tum si \AEquatoris terrestris radius sit, ut supra, hexapedarum Parisiensium } 3280166, \text{ \& sit } n+b:n = 230:229, \text{ prodibit } n = 3265904, b = 14262, 3b = 42786, 3bs^2 = 21393. \text{ Denique}$$

si proportio densitatum aquæ, & Mercurii assumatur, quam exhibuit Musschenbroekius (*Essai de Phys. chap. 24, §. 830*),

$0.001 \frac{1}{4} : 13.593 = 5 : 54372 = 1 : 10874$, erit altitudo aëris homogenei Mercurio æquiponderantis *lin.* 3528613, sive *hex.* 4084, *A. log.* $\frac{D}{\pi} = 227, 3$ *A. log.* $\frac{D}{\pi} = 681, m$ $n = 1418382$, adeoque

$$\omega = \frac{3287297 \cdot 227}{1418382 - 681} = \frac{746216419}{1417701} = 524.$$

Si accipiatur proportio alia densitatum, quam retulit Musschenbroekius *cap. 36. §. 1422*, scilicet $0.001 \frac{1}{4} : 14.000$, sive $1 : 11200$, erit *A hex.* 4206. 4, &

$$= \frac{3287297 \cdot 234}{1418382 - 701} = \frac{769227498}{1417671} = 542.$$

Denique si proportio alia $1 : 11900$ magis arrideat, quam Cl. Cotesius experimentis quibusdam suis deprehendit sicut *A hex.* 4469, &

$$\omega = \frac{3287297 \cdot 248}{1418382 - 745} = \frac{815249656}{1417637} = 575.$$

Altitudinem montis Cassinus idem geometrice determinavit *hex.* 560, qui numerus fere medius est inter binos, quos posteriore calculo assignavimus.

Neque vero ullum est dubium, quod si altitudines Barometricæ, & proportionales densitatum Mercurii, & aeris eodem tempore, ac loco explorarentur, magis etiam observationes, & calculi convenirent inter se invicem, saltem quantum pati possent exhalationes, vaporesque heterogenei, qui Atmosphæræ immiscetur, & naturalem ipsius statum, ut adnotaverat Daniel Bernoullius, perturbant maxime. Demus tamen methodi nostræ exempla alia. In vertice montis Pici Teneriffæ insulæ, ut statuit cum Feuvilleo Bernoullius *pag. 214* Hydronamicæ, est Mercurii altitudo *17 poll. 5 lin.*, sive *lin.* 209, & in libella maris *27 poll.*, *10 lin.* sive *lin.* 334. adeoque *log. D* = 2. 5237465, *log. π* = 2. 3201463, & *log. D* $\frac{D}{\pi}$ = 0. 2 quam proxime. Juxta priorem Musschenbroe-

kii proportionem altitudo aëris homogenei, sive *A* evaderet *hexap.* 4204. 7, & altitudo montis *hexap.* 1958. Juxta proportionem alteram prodiret $A = 4329.4$, & $\omega = 2017$. Juxta proportionem Cotesianam, denique esset $A = 4600$, & $\omega = 2143$. Bernoullius altitudinem totius montis statuit cum Feuilleo hexapedarum Parisiensium 2193. Thomas Heberden in *Transac. Philos. vol.* 47, *num.* 57 altitudinem montis definivit hexapedarum Londinensium 2566, scilicet Parisiensium 2737, nec tamen retulit quæ in vertice, & radice montis vera Mercurii in Barometris suspensi altitudo sit.

Veniamus ad eas etiam observationes, quas cum a regulis vulgaribus montium dimetiendorum nimium recedere animadverteret Catlinus Filius, in Monumentis Parisiensis Scientiarum Academiæ anno 1733, suspicatus est densitates aëris duplicatam potius, quam simplicem comprimentium ponderum rationem sequi. Massiliæ in *lat.* $43^{\circ} 17' 45''$ altitudinem Barometricam Plantadius deprehendit 28. *poll.*, & 2 *lin.*, sive *lin.* 338. Esset igitur juxta primam Musschenbrockii proportionem altitudo aëris homogenei *hex.* 4254.

In vertice montis *Mouffet* ad altitudinem 21 *poll.*, & $\frac{2}{3}$ *lin.*,

sive *lin.* 252 $\frac{2}{3}$ subsidebat Mercurius, adeoque erat $\frac{D}{\pi} = \frac{1014}{758}$,

log. $\frac{D}{\pi} = 0.126$, $A. \log. \frac{D}{\pi} = 536$, & 3 $A. \log. \frac{D}{\pi} = 1608$.

Quare cum sinus $43^{\circ} 17' 45''$ sit 0.6856, & quadratum sinus 0.47004736, fiet 3 *bs* = 20111, & $\omega = 1244$. Juxta secundam proportionem prodiret $A = 4381$, & $\omega = 1281$. Juxta proportionem Cotesii *A* evaderet = 4655, & $\omega = 1360$. Quare cum ex Plantadio altitudo montis sit Parisiensium hexapedarum 1289, in ea latitudine observationes magis accedent primæ, & secundæ quam tertiæ proportioni gravitatum specificarum Mercurii, & aëris.

Pariter si in vertice montis *Canigon* altitudo Mercurii statuatur 20 *poll.*, & *lin.* $2 \frac{1}{2}$ sive *lin.* 242 $\frac{1}{2}$, erit *log.* $\frac{D}{\pi} =$

log.

$\log \frac{676}{485} = 0.1454881$, $A \cdot \log \frac{D}{\pi} = 619$ circiter, $\omega = 1437$, juxta priorem Muffchenbroeckii proportionem. Juxta alteram erit $A \cdot \log \frac{D}{\pi} = 637$, & $\omega = 1478$. Plantadius autem Trigonometrice altitudinem montis determinavit *hex.* 1454. Invenit etiam altitudinem montis *Barthelemi hexap.* 1190, & altitudinem Mercurii in vertice 21 *poll.*, & *lin.* $2 \frac{1}{3}$, five

lin. $254 \frac{1}{3}$: quo dato juxta priorem proportionem illam evaderet $\log \frac{D}{\pi} = 0.1235$, $A \log \frac{D}{\pi} = 525$, & $\omega = 1218$. De-

nique ut recentiorem observationem aliquam proferamus, ad pedes montis Pichincha altitudo Mercurii Cl. Bouguerio erat 28 pollicum, & lineæ unius, five linearum 337, quæ etiam altitudo Barometrica, ut ipse animadvertit, sub zona Torrida, atque in libella maris satis constans censi potest. In montis vertice altitudo erat 15 pollicum, & linearum 11, five linearum 191, adcoque $\log \frac{D}{\pi} = 0.2466$, & juxta eam-

dem proportionem $A = 4241$, $A \cdot \log \frac{D}{\pi} = 1046$, 3 A .

$\log \frac{D}{\pi} = 3138$, &

$$\omega = \frac{3308690 \cdot 1046}{1418382 - 3138} = 2445$$

scilicet ex hoc calculo prodibit ω hexapedis fere 15 major, quam Bouguerius Geometricis mensuris definierat.

Si notum esset ad quem usque terminum aer noster expandi potest, eadem methodo Atmosphæræ limites eruenterentur. Prius autem exploratum hæc in re est, parum admodum ignis vi dilatari aërem. Ut observat Muffchenbroeckius *cap.* 36., §. 1402, aer in tubo vitreo contentus, eo caloris gradu, quo liquefieri vitrum incipit, non nisi triplo magis expanditur. Utiq; s' Gravesande aëris bullulam 15000 ampliore factam in aqua deprehendit. Cavendum est tamen,

ne

ne hanc tantam dilatationem incluso aeri tribuamus potius quam aquæ, quæ, dum in vapores abit, maxime extenditur, & elasticitatem ingentem concipit. Et plane in hoc ipso casu s' Gravesande elasticitatem aeris tercenties minorem fuisse memorat, adeoque aerem non fuisse, nisi tercenties rariorem. Mulichenbroekius etiam cum *cap. 36. Phys. §. 1408*, adnotasset calefactæ aquæ bullulam, in recipiente Antliæ Pneumaticæ, in volumen 46656000000 amplius abiisse, priusquam in extrema superficie aquæ disrumperetur, subdidit: *Je n'oserois pourtant assurer, que cette petite bulle soit de l'Air, & voici ce qui me tient en suspens à cet égard. Lorsqu'on met dans le Vuide de l'Eau bien purgée de l'Air qu'elle contient, & qu'on l'y chauffe à l'aide du Feu jusqu'à ce qu'elle soit sur le point de bouillir, on y apperçoit des Bulles semblables aux précédentes, & qui ne peuvent avoir été formées que par le Feu. Serait ce donc le Feu qui se dilate ici lui-même, & peut-il se dilater si fort ? Je n'ai garde de l'assurer, & la chose reste encore fort incertaine.*

Certum est autem Antliæ Pneumaticæ beneficio non nisi ad certos usque terminos educi aërem, ac dilari posse. Cl. Smeaton egregia machinæ eo pervenit ut fere ad tertiam lineæ partem depresserit Mercurium in Barometro suspensum, & aërem millicies rarefecerit. Vide *Transac. Philos. vol. 47. num. 69*. Quoniam igitur novis emboli agitationibus novus aer non educebatur, censeri poterit aërem millicies rarefactum per poros machinæ, & emboli interstitia libere penetrare, & nullam amplius densitatem sensibilem habere. Hoc posito Atmosphæræ totius sensibilis limes ultimus ille erit, in quo evadet $\log. \frac{D}{\pi} = 3$, & fiet maxima altitudo aeris

$$\text{sub æquatore} = \frac{3308690 \cdot 4241 \cdot 3}{1418382 - 9 \cdot 4241} = \frac{42096462870}{1380213} = 30500.$$

Hallejus ex duratione crepusculorum paulo magis elevari aërem deduxerat, scilicet ad milliaria usque Britannica 45, Hirijs vero ad 51. Hæc tamen crepusculorum supputandorum ratio incerta est ob ignotam naturam curvæ, qua radii lu-

$\frac{2pn^3}{3(x^2 + y^2)}$, vis centrifuga gravitatis contraria =
 $\frac{2pe}{3g} \sqrt{x^2 + y^2}$, vis altera, quæ gravitati secundum *HS*
 addetur = $\frac{2p\Delta}{3g} \sqrt{x^2 + y^2}$, & quæ secundum *SZ* agat =
 $\frac{2p\Delta x}{g}$, adeoque ex æquilibrii legibus habebitur

$$\frac{2pn^3}{3(x^2 + y^2)} - \frac{2pe}{3g} \sqrt{x^2 + y^2} + \frac{2p\Delta}{3g} \sqrt{x^2 + y^2} : \frac{2p\Delta x}{g}$$

$$= \sqrt{x^2 + y^2} : \frac{xdx + ydy}{dx}$$

$$3 \Delta x dx = \frac{gn^3(xdx + ydy)}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} - c(xdx + ydy) + \Delta(xdx + ydy)$$

$$\frac{3}{2} \Delta x^2 + C = \frac{-gn^3}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}} - \frac{1}{2} cx^2 - \frac{1}{2} cy^2 + \frac{1}{2} \Delta x^2 + \frac{1}{2} \Delta y^2,$$

& quia posito $x = a$, & $y = 0$, prodit $\frac{3}{2} \Delta a^2 + C = -\frac{gn^3}{a}$
 $-\frac{1}{2} ca^2 + \frac{1}{2} \Delta a^2$; adeoque est $C = -\frac{gn^3}{a} - \frac{1}{2} ca^2 - \Delta a^2$,
 completa æquatione eruetur

$$\frac{n^3}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{n^3}{a} + \frac{ca^2}{2g} + \frac{\Delta a^2}{g} - \frac{cx^2}{2g} - \frac{cy^2}{2g} - \frac{\Delta x^2}{g} + \frac{\Delta y^2}{2g}$$

$$\frac{ga^2 n^3}{x^2 + y^2} = gn^3 + ca^3 + 2\Delta a^3 - cax^2 - cay^2 - 2\Delta ax^2 + \Delta ay^2,$$

$$ga^2 n^3 = gn^3 x^2 + gn^3 y^2 + ca^3 x^2 + ca^3 y^2 + 2\Delta a^3 x^2 +$$

$$2\Delta a^3 y^2 - cax^4 - cax^2 y^2 - cax^4 y^2 - cay^4 - 2\Delta ax^4 -$$

$$2\Delta ax^2 y^2 + \Delta ax^2 y^2 + \Delta ay^4,$$

$$gn^3 y^2 + ca^3 y^2 - 2cax^2 y^2 + 2\Delta a^3 y^2 - \Delta ax^2 y^2 - cay^4 +$$

$$\Delta ay^4 = ga^2 n^3 - gn^3 x^2 - ca^3 x^2 - 2\Delta a^3 x^2 + cax^4 + 2\Delta ax^4,$$

32

$$y^3 : a^3 - x^3 = g n^3 - c a x^2 - 2 \Delta a x^2 : g n^3 + c a^3 - 2 c a x^2 \mp 2 \Delta a^3 - \Delta a x^2 - c a y^2 + \Delta a y^2$$

$$y^3 : a^3 - x^3 = g n^3 - c a x^2 - 2 \Delta a x^2 : g n^3 - c a x^2 - 2 \Delta a x^2 + c a^3 - c a x^2 + 2 \Delta a^3 - c a y^2 + \Delta a y^2 + \Delta a x^2,$$

& si fiat $n = a - \omega$, $n^3 = a^3 - 3 a^2 \omega$, emerget

$$y^3 : a^3 - x^3 =$$

$$\frac{g a^3 - 3 g a^2 \omega - c a x^2 - 2 \Delta a x^2}{g a^3 - 3 g a^2 \omega - c a x^2 - 2 \Delta a x^2} = \frac{c a (a^2 - x^2 - y^2) - \Delta a (x^2 + y^2) - 2 \Delta a^3}{g a^3 - 3 g a^2 \omega - c a x^2 - 2 \Delta a x^2} : 1,$$

& quia denique ob c , & Δ fatis parvas $c (x^2 + y^2)$ est proxime $= c a^3$, & $\Delta (x^2 + y^2) = \Delta a^3$ evadet quæsitæ æquatio,

$y^3 : a^3 - x^3 = 1 - \frac{3 \Delta}{g} : 1 = g - 3 \Delta : g$, scilicet Æquatoris circulus in Ellipsum ex adjecta attractione abibit cujus semiaxes inter se erunt ut $g - \frac{3}{2} \Delta$, & g .

Similes etiam erunt sectiones omnes Meridiano $MGE D$ parallellæ, & meridiani ipsius figura eadem methodo investigari poterit. Fiet enim in loco \mathcal{Q} vis tota secundum $\mathcal{Q} S$

$$= \frac{2 p n^3}{3 (x^2 + y^2)} + \frac{2 p \Delta}{3 g} \vee (x^2 + y^2), \text{ \& vis tota secundum } \mathcal{Q} V$$

$$= \frac{2 p c x}{3 g} + \frac{2 p \Delta x}{g}, \text{ adeoque}$$

$$\frac{\frac{2 p n^3}{3 (x^2 + y^2)} + \frac{2 p \Delta}{3 g} \vee (x^2 + y^2) : \frac{2 p c x}{3 g} + \frac{2 p \Delta x}{g} = \vee (x^2 + y^2) : \frac{x dx + y dy}{dx},$$

$$\frac{c x dx}{g} + \frac{3 \Delta x dx}{g} = \frac{n^3 (x dx + y dy)}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{\Delta}{g} (x dx + y dy),$$

$$\frac{c x^2}{2 g} + \frac{3 \Delta x^2}{2 g} + C = \frac{-n^3}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}} + \frac{\Delta x^2 + \Delta y^2}{2 g},$$

& quia statuendo $y = 0$, & $x = a$ eruitur

$$C = -\frac{n^3}{a} - \frac{c a^2}{2 g} - \frac{\Delta a^2}{g}, \text{ habebitur æquatio}$$

D E A T M O S P H A E R A

$$\frac{ns}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{2\Delta}{a} + \frac{c a^2}{2g} + \frac{\Delta a^2}{g} - \frac{c a^2}{2g} - \frac{\Delta a^2}{g} + \frac{\Delta y^2}{2g}$$

$$\frac{a^2 ns}{x^2 + y^2} = n^2 + \frac{c a^2}{y} + \frac{2 \Delta a^2}{g} - \frac{c a x^2}{g} - \frac{c \Delta a x^2}{g} + \frac{\Delta a y^2}{g}$$

$$g a^2 n^2 = g n^2 x^2 + g n^2 y^2 + c a^3 x^2 + c a^3 y^2 + 2 \Delta a^3 x^2 + 2 \Delta a^3 y^2 - c a x^4 - c a x^2 y^2 - 2 \Delta a x^4 - 2 \Delta a x^2 y^2 + \Delta a x^2 y^2 + \Delta a y^4,$$

$$g n^2 y^2 + c a^3 y^2 - c a x^2 y^2 - 2 \Delta a^3 y^2 - \Delta a x^2 y^2 + \Delta a y^4 = g a^2 n^2 - g n^2 y^2 - c a^3 x^2 + c a x^4 - 2 \Delta a^3 x^2 + 2 \Delta a x^4$$

$$y^2 : a^2 - x^2 = g n^2 - c a x^2 - 2 \Delta a x^2 : g n^2 - c a x^2 - 2 \Delta a x^2 + c a^3 + 2 \Delta a^3 + \Delta a y^2 + \Delta a x^2,$$

$$y^2 : a^2 - x^2 = 1 - \frac{c}{g} - \frac{3\Delta}{g} : 1 = g - c - 3\Delta : g, \text{ videlicet Meridianus in ellipsum aliam abibit, cujus semiaxes erunt ut } g - \frac{1}{2}c - \frac{3}{2}\Delta, \text{ \& } g.$$

Sectiones insuper, quæ planis quibuscumque diametro *ME* normalibus possunt ellici, ellipsum similibus formam referent, & semiaxes habebunt $g - \frac{1}{2}c$, & g . Quo dato ostendi poterit sectiones omnes, quæ planis per totam diametrum *ME* traductis exoriuntur Ellipses esse. Falso aliqua sectio hujusmodi *M n d E F*, *fig. 19.*, quæ cum plano Meridiani *MDEG* constituat angulum *DSd*. Quoniam sectiones diametro *ME* perpendiculares, sunt ellipses inter se similes, similes etiam erunt sectores *DSd*, *NON*, sive erit *Sd : On = SD : ON*, & quia Meridianus *MDEG* est ellipticus erit *SD : ON = MS : MO*, adeoque *Sd : On = MS : MO*. Ita in hypothese Planetæ sphaerici, motus diurni, & mutue gravitatis cam Atmosphæra figuram adipiscetur, quæ gigni posset variabili ellipsi *MGE* circa invariabilem axem *MSE* revoluta. Et quidem *MS*, *GS*, & semiaxis in

cer-

centro S Meridiani plano perpendicularis inter se erunt ut $g, g - \frac{1}{2}c - \frac{3}{2}\Delta, g - \frac{3}{2}\Delta$: tertia vero hæc semiaxis, quæ in tota ellipseos revolutione variabilis intelligitur, a plano Æquatoris recedendo imminuitur in duplicata ratione sinus latitudinis.

C A P U T S E X T U M.

De Atmosphæra Terræ.

Modo ut legem densitatis, & Atmosphærae terrestris limites accuratiore calculo determinemus, revertamur ad priorem terræ sphaeroidicæ hypothesim, statuamusque, *fig. 17*, $SN = z$, sinum latitudinis puncti $N = s$, cosinum $= t$. Cæteris omnibus manentibus ut supra erit gravitas in loco

$$N = \frac{2pn^3}{3z^3} + \frac{4pn^2b}{3z^3} + \frac{2pn^4b}{5z^4} - \frac{6pn^4bs^2}{5z^4}, \text{ vis centrifuga} =$$

$$\frac{2pctz}{3g}, \text{ \& ea portio vis centrifugæ, quæ secundum } NS \text{ c-}$$

$$\text{xeritur} = \frac{2pct^2z}{3g}, \text{ adeoque erit totale pondus in loco } N =$$

$$\frac{2pn^3}{3z^3} + \frac{4pn^2b}{3z^3} + \frac{2pn^4b}{5z^4} - \frac{6pn^4bs^2}{5z^4} - \frac{2pct^2z}{3g}. \text{ Si aëris densitas in}$$

eodem loco sit $= \pi$, atque ut ferunt plura Mariotti, aliorumque experimenta, sit proportionalis ponderibus comprimentibus, & propterea densitatum decrementsa proportionalia sint differentiis ponderum, seu pressionum, posita C constante aliqua quantitate, fiet $-Cd\pi =$

$$\frac{2pn^3\pi dz}{3z^3} + \frac{4pn^2b\pi dz}{3z^3} + \frac{2pn^4b\pi dz}{5z^4} - \frac{6pn^4bs^2\pi dz}{5z^4} - \frac{2pct^2\pi z dz}{3g},$$

& si aëris densitas in loco T vocetur D , & sit A altitudo aëris homogenei pondere suo toti columnæ aëreae TQ , five Mercurio in Barometris suspensio æquipollentis, ob, $TS = n + b - bs^2$, erit in loco eodem $C \cdot D =$

P

A.

$$A \cdot D \cdot \left(\frac{2}{3}pn - \frac{4}{3}pb + \frac{4}{3}pbs^2 + \frac{4}{3}pb + \frac{2}{5}pb - \frac{6}{5}pbs^2 - \frac{2pc^{12}n}{3g} \right)$$

$$C = A \cdot \left(\frac{2}{3}pn + \frac{2}{5}pb + \frac{2}{15}pbs^2 - \frac{2pc^{12}n}{3g} \right), \text{ \& hoc valore in superiore æquatione substituto}$$

$$-A \cdot \left(\frac{2}{3}pn + \frac{2}{5}pb + \frac{2}{15}pbs^2 - \frac{2pc^{12}n}{3g} \right) \frac{d\pi}{\pi} = \frac{2pn^3 dz}{3z^2} + \frac{4pn^2 b dz}{3z^2} + \frac{2pn^4 b dz}{5z^4} - \frac{2pn^4 bs^2 dz}{5z^4} - \frac{2pc^{12} z dz}{3g},$$

$$-A \cdot \left(\frac{2}{3}pn + \frac{2}{5}pb + \frac{2}{15}pbs^2 - \frac{2pc^{12}n}{3g} \right) \cdot \log. \pi = -\frac{2pn^3}{3z} - \frac{4pn^2 b}{3z} - \frac{2pn^4 b}{15z^3} + \frac{2pn^4 bs^2}{15z^3} - \frac{pc^{12} z^2}{3g},$$

quæ in loco T æquatio ad hanc alteram reducetur

$$-A \left(\frac{2}{3}pn + \frac{2}{5}pb + \frac{2}{15}pbs^2 - \frac{2pc^{12}n}{3g} \right) \log. D = -\frac{2}{3}pn^3 + \frac{2}{3}pnb - \frac{2}{3}pbn^2 - \frac{4}{3}pnb - \frac{2}{15}pnb + \frac{2}{5}pnbs^2 - \frac{pc^{12}n^2}{3g} \text{ \&}$$

$$\text{posteriorem hanc æquationem ex priorẽ subtrahendo}$$

$$\left(\frac{2}{3}pn + \frac{2}{5}pb + \frac{2}{15}pbs^2 - \frac{2pc^{12}n}{3g} \right) A \cdot \log. \frac{D}{\pi} = \frac{2}{3}pn^3 + \frac{4}{5}pbn$$

$$+ \frac{4}{15}pnbs^2 + \frac{pc^{12}n^2}{3g} - \frac{2pn^3}{3z} - \frac{4pn^2 b}{3z} - \frac{2pn^4 b}{15z^3} + \frac{2pn^4 bs^2}{15z^3} - \frac{pc^{12}z^2}{3g},$$

$$A \cdot \log. \frac{D}{\pi} = n + \frac{3}{5}b + \frac{1}{5}bs^2 + \frac{3c^{12}n}{2g} - \frac{n^2}{z} - \frac{7bn}{5z} - \frac{c^{12}n^2}{5z} + \frac{bn^2}{5z} - \frac{n^3 b}{5z^3} + \frac{3n^3 bs^2}{5z^3} - \frac{c^{12}z^2}{2ng},$$

$$10ngz^3 A \cdot \log. \frac{D}{\pi} = 10gn^3 z^3 + 6gbnz^3 + 2gbs^2 n z^3 + 15c^{12}n^2 z^3 - 10gn^3 z^2 - 14gbn^2 z^2 - 10ct^2 n^3 z^2 + 2gbn^2 z^2 - 2gn^4 b + 6gn^4 bs^2 - 5c^{12}z^2.$$

$$\text{\& } \omega \text{ fiat } TN = \omega, ST = n + b - bs^2 + \omega, z^2 =$$

$$n^2 + 2nb - 2bn^2 + 2n\omega, z^3 = n^3 + 3n^2 b - 3n^2 bs^2 + 3n^2 \omega,$$

z'

$\omega = n^4 + 5n^4b - 5n^4bs^2 + 5n^4\omega$, has quantitates rite substituendo, negligendoque terminos, in quibus aut rectangula $b\omega$, aut utriusque potestates occurrunt, eruetur

$$(n+3b-3bs^2+3\omega) 10gn^3 A. \log. \frac{D}{\pi} = 10gn^4 + 30gbn^4 - 30gb^2s^2n^4 + 30gn^4\omega + 6gbn^4 + 2gb^2s^2n^4 + 15ct^2n^4 - 10gn^4 - 20gn^4b + 20gbn^4s^2 - 20gn^4\omega - 14gbn^4 - 10ct^2n^4 + 2gb^2s^2n^4 - 2gbn^4 + 6gbn^4s^2 - 5ct^2n^4$$

$$(n+3b-3bs^2+3\omega) 10gn^3 A. \log. \frac{D}{\pi} = 10gn^4 \omega$$

$$(n+3b-3bs^2+3\omega) A. \log. \frac{D}{\pi} = n\omega,$$

& si logarithmi ex vulgaribus tabulis accipiantur, ac modulus logarithmorum ponatur m , fiet

$$(n+3b-3bs^2+3\omega) \frac{A}{m}. \log. \frac{D}{\pi} = n\omega$$

$$mn\omega - 3\omega A. \log. \frac{D}{\pi} = (n+3b-3bs^2) A. \log. \frac{D}{\pi}$$

$$\omega = \frac{(n+3b-3bs^2)}{mn-3A. \log. \frac{D}{\pi}} A. \log. \frac{D}{\pi}.$$

Ut hanc regulam nostram explicemus exemplo aliquo, statuamus quod Monnierii, & Cassini de Thury experimento diligentissimo compertum fuit, in *lat.* $45^\circ 25' 2''$ in vertice montis *le Puy de Donne* altitudinem Mercurii in Barometro suspensi esse *poll.* 23, *lin.* $9\frac{1}{2}$, five *lin.* 285. $\frac{1}{2}$, & in

radice montis *poll.* 27, *lin.* $\frac{1}{2}$, five *lin.* $324\frac{1}{2}$. Erit in hoc

casu $D:\pi = 324\frac{1}{2}:285\frac{1}{2} = 649:571$, & $\log. \frac{D}{\pi} = 2.8122447 - 2.7566367 = 0.0556$ circiter, logarithmis Briggianis sumptis, & posito logarithmorum modulo 0.43429448. Tum si *Aequatoris* terrestris radius sit, ut supra, hexapedarum Parisienfium 3280166, & sit $n+b:n = 230:229$, prodibit $n = 3265904$, $b = 14262$, $3b = 42786$, $3bs^2 = 21393$. Denique

si proportio densitatum aquæ, & Mercurii assumatur, quam exhibuit Musschenbroekius (Eisai de *Phys. chap.* 24, §. 830),

$0.001 \frac{1}{4} : 13.593 = 5 : 54372 = 1 : 10874$, erit altitudo
aëris homogenei Mercurio æquiponderantis *lin.* 3528613,
sive *hex.* 4084, *A. log.* $\frac{D}{\pi} = 227, 3$ *A. log.* $\frac{D}{\pi} = 681, m n$
 $= 1418382$, adeoque

$$\omega = \frac{3287297 \cdot 227}{1418382 - 681} = \frac{746216419}{1417701} = 524.$$

Si accipiaturs proportio alia densitatum, quam retulit Musschenbroekius *cap.* 36. §. 1422, scilicet $0.001 \frac{1}{4} : 14.000$,
sive $1 : 11200$, erit *A hex.* 4206. 4, &

$$= \frac{3287297 \cdot 234}{1418382 - 701} = \frac{769227498}{1417671} = 542.$$

Denique si proportio alia $1 : 11900$ magis arrideat, quam
Cl. Cotelius experimentis quibusdam suisprehendit fiet *A hex.* 4469, &

$$\omega = \frac{3287297 \cdot 248}{1418382 - 745} = \frac{815249656}{1417637} = 575.$$

Altitudinem montis Cassinus idem geometrice determinavit
hex. 560, qui numerus fere medius est inter binos, quos
posteriore calculo assignavimus.

Neque vero ullum est dubium, quod si altitudines Barometricæ, & proportiones densitatum Mercurii, & aeris eodem tempore, ac loco explorarentur, magis etiam observationes, & calculi convenirent inter se invicem, saltem quantum pati possent exhalationes, vaporesque hetherogenei, qui Atmosphæræ immisceantur, & naturalem ipsius statum, ut adnotaverat Daniel Bernoullius, perturbant maxime. Demus tamen methodi nostræ exempla alia. In vertice montis Pici Teneriffæ insulæ, ut statuit cum Feuilleo Bernoullius *pag.* 214
Hydronamica, est Mercurii altitudo 17 *poll.* 5 *lin.*, sive
lin. 209, & in libella maris 27 *poll.*, 10 *lin.* sive *lin.* 334.
adeoque *log.* $D = 2.5237465$, *log.* $\pi = 2.3201463$, &
log. $\frac{D}{\pi} = 0.2$ quam proxime. Juxta priorem Musschenbroe-

kii proportionem altitudo aëris homogenei, siue A evaderet *hexap.* 4204. 7, & altitudo montis *hexap.* 1958. Juxta proportionem alteram prodiret $A = 4329$. 4, & $\omega = 2017$. Juxta proportionem Cotesianam, denique esset $A = 4600$, & $\omega = 2143$. Bernoullius altitudinem totius montis statuit cum Feuilleo hexapedarum Parisiensium 2193. Thomas Heberden in *Transac. Philos. vol. 47, num. 57* altitudinem montis definivit hexapedarum Londinensium 2566, scilicet Parisiensium 2737, nec tamen retulit quæ in vertice, & radice montis vera Mercurii in Barometris suspensi altitudo sit.

Veniamus ad eas etiam observationes, quas cum a regulis vulgaribus montium dimetiendorum nimium recedere animadverteret Cassinus Filius, in Monumentis Parisiensis Scientiarum Academiae anno 1733, suspicatus est densitates aëris duplicatam potius, quam simplicem comprimentium ponderum rationem sequi. Massiliae in *lat.* $43^{\circ} 17' 45''$ altitudinem Barometricam Plantadius deprehendit 28. *poll.*, & 2 *lin.*, siue *lin.* 338. Esset igitur juxta primam Masschenbroeckii proportionem altitudo aëris homogenei *hex.* 4254.

In vertice montis *Mouffet* ad altitudinem 21 *poll.*, & $\frac{2}{3}$ *lin.*,

siue *lin.* 252 $\frac{2}{3}$ subsidebat Mercurius, adeoque erat $\frac{D}{\pi} = \frac{1014}{758}$,

log. $\frac{D}{\pi} = 0.126$, $A \cdot \log. \frac{D}{\pi} = 536$, & 3 $A \cdot \log. \frac{D}{\pi} = 1608$.

Quare cum sinus $43^{\circ} 17' 45''$ sit 0.6856, & quadratum sinus 0.47004736, fiet 3 $bs^2 = 20111$, & $\omega = 1244$. Juxta secundam proportionem prodiret $A = 4381$, & $\omega = 1281$. Juxta proportionem Cotelii A evaderet = 4655, & $\omega = 1360$. Quare cum ex Plantadio altitudo montis sit Parisiensium hexapedarum 1289, in ea latitudine observationes magis accedent primæ, & secundæ quam tertiæ proportioni gravitatum specificarum Mercurii, & aëris.

Pariter si in vertice montis *Canigon* altitudo Mercurii statuatur 20 *poll.*, & *lin.* 2 $\frac{1}{2}$ siue *lin.* 242 $\frac{1}{2}$, erit *log.* $\frac{D}{\pi} =$

log.

$\log \frac{676}{455} = 0.1454881$, $A \cdot \log \frac{D}{\pi} = 619$ circiter, $\omega = 1437$, juxta priorem Musschenbroekii proportionem. Juxta alteram erit $A \cdot \log \frac{D}{\pi} = 637$, & $\omega = 1478$. Plantadius autem Trigonometricæ altitudinem montis determinavit *bex.* 1454. Invenit etiam altitudinem montis *Barthelemi bexap.* 1190, & altitudinem Mercurii in vertice 21 *poll.*, & *lin.* 2 $\frac{1}{3}$, sive

lin. 254 $\frac{1}{3}$: quo dato juxta priorem proportionem illam e-

vadcret $\log \frac{D}{\pi} = 0.1235$, $A \log \frac{D}{\pi} = 525$, & $\omega = 1218$. De-

nique ut recentiore observationem aliquam proferamus, ad pedes montis Pichincha altitudo Mercurii Cl. Bouguerio erat 28 pollicum, & lineæ unius, sive linearum 337, quæ etiam altitudo Barometrica, ut ipse animadvertit, sub zona Torrida, atque in libella maris satis constans censeri potest. In montis vertice altitudo erat 15 pollicum, & linearum 11, sive linearum 191, adeoque $\log \frac{D}{\pi} = 0.2466$, & juxta cam-

dem proportionem $A = 4241$, $A \cdot \log \frac{D}{\pi} = 1046$, 3 A .

$\log \frac{D}{\pi} = 3138$, &

$$\omega = \frac{3305690 \cdot 1046}{1418382 - 3138} = 2445$$

scilicet ex hoc calculo prodibit ω hexapedis fere 15 major, quam Bouguerius Geometricis mensuris definierat.

Si notum esset ad quem usque terminum aer noster expandi potest, eadem methodo Atmosphæræ limites eruenter. Primo autem exploratum hæc in re est, parum admodum ignis vi dilatari aërem. Ut observat Musschenbroekius *cap.* 36., §. 1402, aer in tubo vitreo contentus, eo caloris gradu, quo liquefieri vitrum incipit, non nisi triplo magis expanditur. Utiq; s' Gravefande aëris bullulam 15000 ampliore factam in aqua deprehendit. Cavendum est tamen,

nc

ne hanc tantam dilatationem incluso aeri tribuamus potius quam aquæ, quæ, dum in vapores abit, maxime extenditur, & elasticitatem ingentem concipit. Et plane in hoc ipso casu s' Gravesande elasticitatem aeris tercenties minorem fuisse memorat, adeoque aerem non fuisse, nisi tercenties rariorem. Maïschenbroeckius etiam cum *cap. 36. Phys. §. 1408*, adnotasset calefactæ aquæ bullulam, in recipiente Antliæ Pneumaticæ, in volumen 46656000000 amplius abiisse, priusquam in cxtima superficie aquæ disrumperetur, subdidit: *Je n'oserois pourtant assurer, que cette petite bulle soit de l'Air, & voici ce qui me tient en suspens à cet égard. Lorsqu'on met dans le Vuide de l'Eau bien purgée de l'Air qu'elle contient, & qu'on l'y chauffe à l'aide du Feu jusqu'à ce qu'elle soit sur le point de bouillir, on y apperçoit des Bulles semblables aux précédentes, & qui ne peuvent avoir été formées que par le Feu. Seroit ce donc le Feu qui se dilate ici lui-même, & peut-il se dilater si fort? Je n'ai garde de l'assurer, & la chose reste encore fort incertaine.*

Certum est autem Antliæ Pneumaticæ beneficio non nisi ad certos usque terminos educi ærem, ac dilatari posse. Cl. Smeaton egregia machinâ eo pervenit ut fere ad tertiam lineæ partem depresserit Mercurium in Barometro suspensum, & ærem millies rarefecerit. Vide *Transac. Philos. vol. 47. num. 69*. Quoniam igitur novis emboli agitationibus novus acr non educebatur, censei poterit ærem millies rarefactum per poros machinæ, & emboli interstitia libere penetrare, & nullam amplius densitatem sensibilem habere. Hoc posito Atmosphæræ totius sensibilis lines ultimus ille erit, in quo evadet $\log. \frac{D}{\pi} = 3$, & fiet maxima altitudo aeris

$$\text{sub æquatore} = \frac{3308690 \cdot 4241 \cdot 3}{1418382 - 9 \cdot 4241} = \frac{42096462870}{1380213} = 30500.$$

Hallejus ex duratione crepusculorum paulo magis clevari ærem deduxerat, scilicet ad milliaria usque Britannica 45, Hirius vero ad 51. Hæc tamen crepusculorum supputandorum ratio incerta est ob ignotam naturam curvæ, qua radii
lu-

lucis ad nos perveniunt, & quæ neque ex data lege densitatum æris definiri potest. Vim refractivam æris non esse densitati proportionalem animadvertit optime Bouguerius *par. 2. cap. 1. §. 66.* dissertationis de observandis in mari syderum altitudinibus, quæ anno 1729 ab Academia præmio donata est.

CAPUT SEPTIMUM.

De Atmosphæra Solis.

IN disquisitionibus Physico-Astronomicis, quibus præmium anni 1734 retulit, Daniel Bernoullius, cum radium Solis vocasset r , x distantiam loci dati ab ipsius centro, ι elasticitatem, calorem, densitatemque in superficie Solis, in loco autem assumpto densitatem \mathcal{D} , & elasticitatem E ; eandem densitatem proportionalem statuit ponderibus compressimentibus, sive elasticitati E per calorem $\frac{r^2}{x^2}$ divisæ, sive esse

$\mathcal{D} = \frac{Ex^2}{r^2}$. Tum Atmosphæram cogitatione dividens in infinita strata sibi invicem concentrica, decrementa elasticitatis $= dE$, dum altitudo x quantitate dx augetur, proportionalia esse voluit ponderi totius strati, quod haberet altitudinem minimam dx . At vero hoc pondus æquale est altitudini dx per densitatem \mathcal{D} , & gravitatem $\frac{r^2}{x^2}$ multiplicatæ.

Posita igitur constante aliqua quantitate n , prodibit $-dE = \frac{nr^2 D dx}{x^2} = nE dx$, & facta debita integration, indicatoque per c numero, cujus logarithmus est unitas, eruetur $E = c^{n(r-x)} = \frac{1}{c^{n(x-r)}}$ & $\mathcal{D} = \frac{x^2}{c^{n(x-r)r^2}}$. Ex hac æquatione sequi censuit vir Clarissimus, maximam densitatem in superficie Solis non haberi, sed alio in loco longius a Sole fortasse dissito, ex. gr. in distantia Veneris, aut Martis: cu-

jus rei quidem rationem physicam eam attulit, quod ingente calore prope Solem Atmosphæra admodum rarefiat. At æquationem ipsam differentiando ibi habebitur major densitas ubi sit $2c^{(x-r)} r^2 x dx - n c^{(x-r)} r^2 x^2 dx = 0$, qui locus distabit a centro Solis quantitate $\frac{2}{n}$, adeoque recidet extra Solem, si n sit binario major, incidet vero in superficiem si sit æqualis. Licet autem adhuc ignotus sit idem numerus, patet maximam densitatem in superficie Solis esse oportere. Vidimus Solares maculas altius ascendere, & in altitudinibus $\frac{1}{2}$, 1, 1 $\frac{1}{2}$ terrestrium semidiametrorum pensiles revolvi. Porro aut non ascenderent amplius maculæ, aut si ascendendo in fluidum densius, ac specificè gravius transferrent, magis semper, magisque elevarentur ultra Mercurii, Veneris, & Martis orbitam, si orbita Veneris, aut Martis, quod Bernoullius existimaverat, Atmosphære densissimæ esset locus.

Quid ergo? Non ne in minoribus distantis incallescendo Atmosphæra maxime expanditur? Inprimis expansio corporum incallescentium, atque effectus caloris omnes non magis ex intensione caloris agentis pendent, quam ex dispositione quadam eorundem corporum ad radios caloriferos excipiendos, retinendosque. Calore ferri candentis ex. gr., cum in vapores abeundo aqua plusquam millies rarefiat; aer vix triplo magis dilatatur. Specula etiam maxima ustoria, quæ durissimum quodcumque corpus dissolvunt, fundunt, vitrificant, calcinant, nullum sensibilem calorem in ea parte aëris relinquunt, in qua radiorum collectorum focus diutissime permanferit. Quod si ergo Atmosphæram Solis, quæ fatis languida, & uniformi luce perfunditur, & transeptum aliorum syderum minime impedit, radius Solaribus facile perviam esse intelligamus; calefiet utique, expandeturque in minoribus distantis quoquomodo, & in suis omnibus partibus evadet rarior, quam si calor auferetur: neque tamen caloris vi superincumbentium stratorum pondus sic vinci poterit, ut extra Solis superficiem cadat locus maximæ densi-

Q

ta-

tatis. Satius igitur erit ex dato hoc loco ignotum illum numerum n eruere, quam ex numero adhuc ignoto locum Atmosphæræ densissimæ determinare. Sit radius Solis $AB = r$, fig. 20., $AE = x$, sinus latitudinis puncti $E = s$, cosinus $= t$, gravitas absoluta $= \frac{2pr^3}{3x^2}$, vis centrifuga, quæ gravitati con-

traria est $= \frac{2p\phi s^2 x}{3g}$, posito quod in Æquatore Solis sit gravitas ad vim centrifugam ut $g : \phi$. Si c sit numerus, cujus logarithmus est unitas, & n quantitas constans aliqua, habebitur

$$-n dE = \frac{2pr^3 Ddx}{3x^2} - \frac{2p\phi s^2 Dxdx}{3g} = \frac{2}{3} pr E dx - \frac{2p\phi s^2 E x^3 dx}{3r^3 g}$$

$$-\frac{n dE}{E} = \frac{2}{3} pr dx - \frac{2p\phi s^2 x^3 dx}{3gr^3}$$

$$n \cdot \log. E = C - \frac{2}{3} prx + \frac{p\phi s^2 x^4}{6r^3 g} = \frac{2}{3} pr^3 - \frac{2}{3} prx - \frac{p\phi s^2 r^4}{6r^3 g} + \frac{p\phi s^2 x^4}{6r^3 g}$$

$$n \cdot \log. E = \frac{2}{3} pr(r-x) - \frac{p\phi s^2}{6r^3 g} (r^4 - x^4)$$

$$E = c \left(\frac{2}{3} pr(r-x) - \frac{p\phi s^2}{6r^3 g} (r^4 - x^4) \right) = \frac{1}{c \left(\frac{2}{3} pr(x-r) - \frac{p\phi s^2}{6r^3 g} x^4 - r^4 \right)}$$

$$D = \frac{x^3}{c \left(\frac{2}{3} pr(x-r) - \frac{p\phi s^2}{6r^3 g} (x^4 - r^4) \right)_{r^2}}$$

Sumptis differentialibus in loco maximæ densitatis fiet

$$2c \left(\frac{2pr(x-r) - p\phi s^2 (x^4 - r^4)}{6r^3 g} \right) r^2 x dx - c \left(\frac{2pr(x-r) - p\phi s^2 (x^4 - r^4)}{3g} \right)_{r^2} \left(\frac{2pr dx}{3n} - \frac{2p\phi s^2 x^3 dx}{3r^3 n g} \right) = 0$$

$$2 r^3 x = \frac{2pr^3}{3n} + \frac{2p\phi s^2 x^3}{3ng} = 0$$

$$n = \frac{pr}{3x} - \frac{p\phi s^2 x^3}{3r^3 g},$$

sive, quia locus iste in superficie Solis esse debet, videlicet
ubi

ubi $x=r$, eruetur $n = \frac{p g - p \phi r^2}{3g}$ atque hoc valore in æquatione substituto prodibit

$$\mathcal{D} = \frac{x^2}{c \left(\frac{2 p r g}{p g - p \phi r^2} (x-r) - \frac{p \phi r^2}{2 p g - 2 p \phi r^2} (x^2 - r^2) \right)},$$

$$\mathcal{D} = \frac{x^2}{c \left(\frac{2 r g}{g - \phi r^2} (x-r) - \frac{\phi r^2}{2 g - 2 \phi r^2} (x^2 - r^2) \right)},$$

in axe producto $\mathcal{D} = \frac{x^2}{c \frac{2 r (x-r)}{r^2}},$

in plano Æquatoris $\mathcal{D} = \frac{x^2}{c \left(\frac{2 r g}{g - \phi} (x-r) - \frac{\phi}{2 g - 2 \phi} (x^2 - r^2) \right)},$

Itaque in ipsa Solis superficie cum sit densitas = 1, in distantia \mathcal{S} Solarium semidiametrorum erit =

$$\frac{\frac{2 \mathcal{S}}{c \cdot 42387 - 1} - \frac{624}{2 \cdot 42387 - 2}}, \text{ aut quia } c \text{ est proxime } = 3, \text{ proxi-}$$

me etiam fiet $\mathcal{D} = \frac{2 \mathcal{S}}{3^2} = \frac{2 \mathcal{S}}{6561} = 0.0038$. In distantia semidiametrorum Solarium $3 \mathcal{S}$ evadet $\mathcal{D} =$

$$\frac{\frac{122 \mathcal{S}}{2 \cdot 42387 - 1} - \frac{150062 \mathcal{S} - 1}{2 \cdot 42387 - 2}}{3} = \frac{122 \mathcal{S}}{50} \text{ circiter, adeoque magis At-}$$

mosphæra Solis rarefceret eo in loco, quam ut maxime ratos motus, ac regulares Mercurii, & Veneris perturbet, aut eandem angularem velocitatem ab inferioribus aliis partibus finito tempore recipiat, & diebus simul $2 \mathcal{S} \frac{1}{2}$ circa Solem revolvatur. Ita rarissimæ, ac subtilissimæ illæ particulæ, quæ reflectendis tantum radiis Solaribus, & Zodiacali exhibendo lumini sunt aptæ, quasque ultra orbitas Mercurii, & Veneris extendi vidimus, poterunt etiam altius asurgere ad usque ipsam Telluris, & Martis orbitam, quin idcirco metuendum sit ne toto angulari motu communico

Q 2

dif-

diffipetur Atmosphæra omnis, & denique ad semidiametros Solares 35, aut terrestres semidiametros 3500 reducatur.

Aliquis tamen motus a Sole, & stratis inferioribus continuo afriktu transibit ad superiora. Hoc ipso Atmosphæra magis circa Æquatorem, quam circa Polos sese expandendo, affluendoque sphaeroidicam, sive potius lenticularem figuram referet, quæ in Zodiacali lumine, aut tota saltem Zodiacalis luminis portione, quæ supra Horizontem enitet, deprehendi solet. Deinde Atmosphærae densitas, & luminis ejusdem vis in extrema regione augebitur, quemadmodum anno 1686 Cassinus, ac Fatius observarunt. Ubi demum eam vim centrifugam, quæ gravitatem superet, conceperint partes ultimæ, huc illuc dispergentur, & Atmosphæra apparens Solis coarctabitur, quousque novo incremento motus, ac vis centrifugæ altius sese efflerat. Hæc erit omnium illius lucis vicissitudinum, quæ innotuerunt hætenus, causâ, & ratio. Anno 1683, & 1684, cum primum a Cassino detecta est, longitudinem 60°, aut 50° exhibuit. Anno 1685 pervenit ad 75°. Initio anni 1686 ad 90° fere accessit, tum vere ineunte rediit ad 80°, 75°, 58°, 53°, atque iterum ad 90°, & 93° Mense Majo. Labente anno 1687 non nisi 70° visa est. Mairanus cum aliquando extensionem lucis 90°, 100°, & 103° conspexisset, aliquando etiam reperit 80°, 70°, & 60°.

Quam vero ob causam longitudo omnis, sive axis major Solaris Atmosphærae augeri, ac minui alternis vicibus intelligitur, vario scilicet motu, ac vi centrifuga, attritu, ac densitate particularum altius semper, atque altius assurgentium; etiam minor axis variari poterit, quin tamen proportio aliqua certa, & stabilis utrumque inter haberi oporteat, & maxima, aut minima longitudo maximæ, aut minimæ latitudini necessario debeat respondere. Et plane cum die 4 Februarii anni 1687 longitudo Zodiacalis luminis esset 100°, latitudo nonnisi 13°, aut 14° visa est, & die 5 Septembris anni 1685 latitudo plusquam 20° apparuit, cum longitudo ad 75° dumtaxat protenderetur. Denique fieri poterit, ut plures partes ex locis inferioribus ascendant, licet non adhuc tanta velocitas, ac vis centrifuga extremæ regioni accedat, aut viceversa, atque
ita

ita non semper claritas, atque extensio Solaris Atmosphærae una eademque proportione, ac lege contineantur.

CAPUT OCTAVUM.

*De Atmosphæra Planetarum Inferiorum,
& Cometarum.*

NE Atmosphæras Mercurii, & Veneris quibusdam certis limitibus definiamus, partim ignota vis gravitatis prohibet, & partim etiam diurnus motus, qui quidem nullo artificio hætenus in Mercurio, in Venere autem non nisi dubiis, ac dissentientibus observationibus explorari potuit. Anno 1666, & 1667 Bononiæ Cassinus senior Telescopio Campani pedum $17\frac{1}{2}$ partes nescio quas Veneris obscuriores, lucidioreſque animadvertit, & ex earum consideratione collegit Venerem $23^h\ 20'$ circa suum axem revolvi ab Austro in Septentrionem. Lutetiæ Parisiorum nihil simile amplius detexit, licet egregiis Telescopiis pedum 100, & 130 usus esset. Anno autem 1726, & 1727 Romæ Cl. Blanchinus Telescopiis Campani palmorum Romanorum 88, & 94 in superficie Veneris alias maculas deprehendit a Cassinianis prorsus dissimiles, lentissimoque earumdem progressu cognito statuit Venerem diebus 24, & horis 8 a Septentrione in Austrum volvi circa axem 15° circiter elevatum supra Eclipticæ planum, & in tota sibi periodica revolutione parallellum. Parisiis interim Cassinus Filius, & Maraldus Telescopio Campani palmorum Romanorum 120, seu pedum Parisiensium 82, & altero etiam Hartsoekerii pedum 114, alique alibi diligentissimi Astronomi optimis instrumentis nihil hujusmodi observarunt, licet Blanchini maculæ adeo extenderentur, ut minoribus etiam Telescopiis debuissent cerni. Duo enim maria Regis Emmanuelis, & Infantis Henrici, quæ simul conjungi viderat Blanchinus, longitudine plusquam di-

dimidiam, & latitudine plusquam tertiam disci apparentis partem occupabant : & maria insuper Columbi, Vespucci, ac Galilæi longitudine plusquam duas tertias partes exæquabant, & plusquam unam tertiam latitudine.

In tanta igitur observationum institutarum discordia, & obscuritate, vix potest quidpiam aliud concludi, quam quod superius notatum est: Venerem scilicet, & Mercurium attrahat undique Atmosphæræ Solaris partes circa se rapere, & ad modum Atmosphæræ alterius cohibere. Comprimi vero, & condensari possunt quam maxime eadem partes, quæ in distantia 3500 semidiametrorum terrestrium cum tantam raritatem illam præferant, qua inferiorum Planetarum motum minime afficiunt; prope Solis superficiem vaporibus, atque exhalationibus aliis prægravant, quas ex locis humilioribus avulsas ad altitudinem usque unius, aut unius etiam, ac dimidiæ terrestris semidiametri compellunt, & quæ, cujuscumque indolis, ac texturæ effingantur, satis densæ esse debent, ut cum radios apprime vividos intercipient, aut reflectant, & partem aliquam disci totius abscondant, non tamen solvantur illico, & quandoque duas, aut tres etiam revolutiones integras absolvant. Atmosphæra igitur, quæ alicubi adco rarefcit, atque addensatur, dum circa Venerem, & Mercurium aglomerabitur, majore vi gravitatis circa extimam superficiem, & incumbentium stratorum pondere majorcm densitatem adipiscetur. Id incolarum singularum commodo non parum conferet: quatenus ea strata inter se invicem heterogenea illabentes Solares radios, & radiorum vim, ac calorem obtundent undique.

Cometarum potior est ratio. Dum enim in Ellipsis prælongis, & ad Parabolas proxime accedentibus motus suos prosequuntur, descendendo ad Perihelium subeunt intima, & profundiora Atmosphæræ Solaris loca. Hoc ipso autem vehementius incalcescent: & primo quidem Atmosphæra omnis, quæ in remotissimis Aphelii locis diutissime riguerat, Soli propius accedendo explicabit iterum sese, & in amplissimum capillitium illud abibit, quod interiorem Cometarum nucleum circumdat. Deinde vero hac tanta caloris differen-
tia

tia perculsas rariores partes magis etiam, magisque expandi necesse erit, & specificæ gravitatis defectu avolare altius, & longiorem caudam exhibere. Et cum aliquando ad ea usque intervalla effundatur cauda, in quibus Atmosphæræ Solaris densitas subductis calculis fere infinite parva deprehenditur, subtiliores adhuc moleculas ex universa Cometæ superficie evelli dicendum erit. Ita cum in vacuo Boyliano crassiores omnes exhalationes, quæ ustorio speculo, aut lente aliqua excitari solent, labantur ad imum locum, distillatione adeo attenuantur spiritus, ut in vapores abundo ascendant. Porro tanta illa caudarum raritas ex eo etiam posset colligi, quod licet impuræ undique, & hetherogeneæ caudæ esse debeant, aliorum tamen cælestium corporum transpectum interjectu suo minime impediunt.

Hiscæ principiis Cl. Boscovich., in dissertatione de Cometis numero 79, rationem attulit cur alia sint Planetarum phænomena, qui in orbibus propemodum circularibus, & æque densis Atmosphæræ stratis revoluti non sentiunt tantas inæqualitates frigoris, & caloris, aut saltem partibus volatilibus jam ab initio avolatis in æquilibrio quodam perseverant. Numero etiam 72, & 76 Newtonum reprehendit, quod Cometarum caudas censuerit communem motum projectionis retinere, & pergere moveri cum capitibus usque ad Aphelia in orbibus similibus, & inde etiam fortasse cum iis redire. Cum enim globus eo tempore, quo in vacuo percurrit $\frac{8}{3}$ totius diametri, in medio æque denso amittat dimidium suæ velocitatis, exhalationes illæ tenuissimæ in densiore Atmosphæræ Solis velocitatem, qua cum capite antea projiciebantur, retinere diutius non poterunt, & solo gravitatis defectu ascendent. Quo jam in plano descriptæ orbitæ manebunt, & ad partes Soli oppositas dirigentur, & progrediente capite deflectent ad partes alias, quæ ab ipso interim relinquentur: & quia ob majorem differentiam densitatum Atmosphæræ Solaris, & prodeuntium exhalationum multo celerius exhalationes omnes initio ferri debent, & Atmosphæræ resistentia eliso priore motu, tardius deinde, ac tardius pro-

promoveri, ita defleſcent ad eaſdem partes, ut curvatem plagæ oppoſitæ obvertant, in quam videlicet tendit Cometa. Id numero 73 addidit vir clariffimus. Denique numero 75 animadvertit, quod ſi impulſione radiorum luminis vapores ex interiore nucleo emergentes furſum aſcenderent, potius contrario modo incurvarentur. Cum enim recedendo a Sole inſenſio luminis deficiat in ratione multo minore quam circumfuſi medii reſiſtentia, & gravitas in ipſum Cometæ nucleum; continuis radiorum celerrimorum ictibus accelerari vapores aſcendentes necesse eſſet, & curvatem relictis partibus obverti.

Præclare inſuper a Mairano in ſuis additamentis notatum eſt Cometæ a Sole diſſitos vix aliquam caudæ ſpeciem exhibere. Conſulamus eam tabulam, quam in ſecunda prælectionum Aſtronomicarum editione pag. 254 contexit ſolertiſſimus de la Caille, & qua diſtantiam periheliam exhibuit 43 Cometarum, qui ab anno 1337 ad annum uſque 1748 apparuerunt. Ex ipſis novem, qui in conſpectum prodierunt annis 1533, 1577, 1618, 1665, 1677, 1680, 1686, 1737, 1744, Soli acceſſerunt propius quam Mercurius: Novemdecim inferiores fuerunt Veneri, qui ſcilicet annis 1337, 1472, 1531, 1532, 1556, 1580, 1590, 1596, 1607, 1661, 1672, 1682, 1683, 1698, 1702, 1706, 1739, 1743, 1748 viſi ſunt. Novem alii infra Terræ orbitam deſcenderunt annis 1593, 1652, 1684, 1699, 1707, 1723, 1742, 1743, 1748. Sex tantum, qui annis 1585, 1664, 1678, 1718, 1729, 1747, obſervati ſunt, diſtantiam periheliam majorem a Sole habebant, quam Terra noſtra. Et ex his primum Tycho, & quartum Kirchiuſ ſine ullo caudæ veſtigio deprehenderunt. Quintus Sarabato exiguum capillitium dumtaxat obtulit, quod latitudine Jovis diſco æquale erat. Sextum Maraldus ſine ulla cauda, & D. de Chéſeaux dumtaxat cauda 24' præditum judicavit. Capillitium tertii Hookiuſ quaſi decuplo ampliorem capite exiſtimavit, ſcilicet $4\frac{1}{6}$. Secundus prælongam caudam 14° obſervante Hevelio præſetulit. Ipſe vero trigefima nona parte radii orbis magni a Sole magis quam Terra in Peri-

helio recedebat, & Solari Atmosphæræ immergebatur, quam nudis oculis aliquando longius etiam pertingere animadvertimus. Contra qui anno 1680 Cometa proxime Soli accessit, caudam emisit 40° , 50° , 60° , & 70° .

Tamen pro varia Cometarum textura, & indole fieri poterit ut in minoribus distantis minus, aut magis in majoribus incalescant, & nulla certa, ac rata sit distantiarum, exhalationumque effusarum undique proportio. Ita solis observationibus amplitudo caudæ, & densioris illius atmosphæræ, quæ interiorem Cometarum nucleum circumdat determinari poterit, facta scilicet diametrorum capitis, & capillitii comparatione. Minima diameter capillitii Cometæ anni 1682 Telescopio pedum sexdecim, & Micrometro accuratissime a Flamsteedio observata æquabat $2' 0''$, nucleus vero, seu Stella in medio capitis vix partem decimam occupabat hujus latitudinis, adeoque erat radius Atmosphæræ ad Cometæ radium ut 10:1. Rursus Cometa anni 1665 cum mense Aprilis nitore suo fixas omnes superasset, latitudinem capillitii $6'$ Hevelio exhibuit, nucleus vero minor videbatur Jove, aut etiam intermedio Saturni corpore, minor scilicet $16''$, unde Atmosphæræ radius ad Cometæ radium se habebat in majore ratione quam 360:16, aut 45:2. Newtonus denique in *Prop. 39. lib. 3. Princip.* animadvertit diametrum capillitii raro ultra $8'$, aut $12'$ extendi, & nuclei diametrum quasi esse decimam, aut decimam quintam partem diametri capillitii, unde intelligitur quoutque Atmosphæra Cometarum soleat pertingere. Ampliores tamen aliquando Atmosphæra vitæ sunt. Ita cum nucleum, & capillitium Cometæ anni 1744 ope Micrometri comparasset Bolcovichius deprehendit illum ne partem quidem hujus sexagesimam sub initium exæquallē.

CAPUT NONUM.

De Atmosphæra Lunæ.

Quoniam eam tantam, ac fere immensam raritatem, quam instituto superius calculo definivimus, Solis Atmosphæra in extremis regionibus cum habeat, adhuc tamen tenuissimis lucis radiis reflectendis idonea est; fluidum etiam, quod Lunam ambit, rarissimum, ac subtilissimum esse poterit, licet Eclipseos Solaris tempore, quando e conspectu aufertur Sol, & circa Lunæ discum refracti, reflexique Solares radii simul ad oculum perveniunt, lucidi annuli speciem referat. Invenit autem Cel. Boschovichius §. 90, 96, & 98 dissertationis de Atmosphæra Lunæ, quod si ea dumtaxat fluidi Lunaris densitas statueretur, quam anno 1748 in Monumentis Berolinensibus Eulerus ad modum hypotheseos proposuerat, & qua refractionis horizontalis ad 20^h assurgeret; in immersionibus, emersionibusque syderum post Lunam, Planetarum quidem diametri duplo longiores fierent, stellæ autem fixæ uno minuto minus a se invicem distantes ad suduplam distantiam pervenirent, & sensibiles aliæ haberentur irregularitates motus, & radiorum maxime rubeorum separationes. Insuper §. 104, & sequentibus ostendit, quod juxta Euleri hypotheseim illuminatæ, obscuræque disci Lunaris partes nulla ratione amplius distingui possent; quemadmodum ex verticibus nostrorum montium distingui non possunt partes, quæ directæ, & reflexa luce in plana superficie perfunduntur. Denique ubi Atmosphæra sensibilis esset densitas, alia Lunæ facies, alius color, & locus macularum, sereno, & nubilo tempore appareret. Nullam tamen hujusmodi vicissitudinem in Lunari disco observamus, & eodem modo Lunam conspiciamus, quo ex Luna aut Peruvium, aut quædam Africæ regiones videri possent, in quibus nec pluviae unquam, nec nives cadunt. Syderum prope discum transcurrentium irregularitas vix ulla est. Fontenelle, Maraldus, Male-

lezieu, Cassinus, Mairanus, Hirius in immersionibus; atque emersionibus se nullam deprehendisse testati sunt. Mairanus tamen in Monumentis Parisiensis Scientiarum Academiae anni 1716 stellam fixam a se observatam retulit, quæ cum immersioni esset proxima a Lunari disco recedere videbatur. In Monumentis etiam anni 1706 aliquando fixas ante immersionem oblungari statuit Cassinus. Hirius pariter anno 1718, cum immersionem fixæ observaret, moram duorum circiter minorum existimavit. Cassinus plusquam unius minuti, & secundorum plurium Maraldus eandem censuit Lutetiæ Parisiorum, Bononiæ vero Manfredius, & Londini Poundius omnino nullam. Anno 1737 stellam Aldebaram fere Lunam secando disparuisse dixit Monnierius. Kirchius anno 1729 figuram Veneris Lunæ accedentis mutatam vidit. Illeus anno 1715 uno minuto ante immersionem, & post emersionem Veneris Lunari disco propiorem limbum coloris rubei, violacei alterum conspexit. Nihil autem hujusmodi eodem tempore Lutetiæ Parisiorum deprehenderunt Maraldus, Cassinus, Malezicu, & Monte Pessulano Plantadius, & Clapiès. Insuper Illeus ipse animadvertit fixam quamcumque, dum Telescopii, & lentium centro accederet, propiore parte rubrum colorem, & remotiore violaceum prætulisse.

In occultatione Veneris, quæ a Luna die 15 Aprilis anno 1751 facta est, cum Joannes Bradlejus Grenovicii, aëre maxime sereno, egregio Telescopio Cata-dioptrico pedum sex, observationi accurate incumberet, nullam penitus variationem a se visam fuisse retulit in *Transf. Philos. vol. 47., num. 30.* Londini autem cum aer fumo interspersus, atque obvolutus esset, ita ut duobus etiam post Novilunium diebus Luna nudis oculis non intueretur, figuram Veneris ante immersionem uno minuto Cl. Bevis mutatam censuit. Nihil hujusmodi in emersione contigit, licet *num. 22.* ipsius voluminis testatus sit sese integro minuto a Telescopio non abfuisse. Die 26 Julii, anno 1753, cum Vencrem plusquam dimidia sui portione a Luna jam occultatam Romæ conspiceret Audiffredius, reliquum discum non minus circularem existimavit, quam si a Luna longissime abfuisset. Planetam

tamen pallore insigni suffusum vidit, qui non evanuit nisi 7, aut 8 minutis ante immersionem, & post emersionem: cuius quidem phænomeni causam censuit, aut atrum vaporem aëri offusum, aut proximam, ac vividam Lunarem lucem, quæ lucem Veneris obtunderet. Denique ipse Audiffredius Romæ, & Cl. Ximenius Florentiæ, & alii etiam agnoverunt die 30 Julii anni 1756 minutis aliquot ante immersionem sensibilibiter lumen Martis cæpisse minui.

Aliqua hujusmodi observationum diversis instrumentis, & pluribus in locis institutarum dissensio indicare posset, occultandorum syderum moram figuræ, coloris, motus vicissitudines, quæ aliquando ante, & post immersionem detectæ sunt, aut vitio Telescopiorum tribuendas esse, aut irregularibus refractionibus aëris nostri, aut causis aliis similibus. Idem de observationibus omnibus sine aliqua observatorum celeberrimorum injuria dici nequit. Aliunde vero intelligitur, quod licet adeo rara sit Atmosphæra Lunæ, ut sensibilem radiorum copiam nonnisi Eclipses Solaris tempore ad nos reflectat, quandoque ita alterari aliqua ex causa poterit, ut irregularitatem aliquam motus, coloris, figuræ exhibeat. In atmosphæra etiam nostra interdum refractiones ordinariis longe majores prodeunt, & loca quædam tanto intervallo distita cernuntur, ut sine magnis iis refractionibus distingui nequeant. Ex. gr. *lib. 25.* Pancosmia: Franciscus Patritius retulit se ex viciniis Tolonis Corsicam plusquam 300 milliariis inde remotam conspexisse.

Boscovichius vero cum phænomena hæc omnia aut Atmosphæra Terræ, & Solis tribueret, aut observantium indigentia, & vitio instrumentorum, censuit Lunæ Atmosphæram non esse quidem satis elasticam, variabilem, rarissimamque, sed potius densam, similem aquæ nostræ, & in qua adeo advenientes radii reflectantur, ut illabendo in solidas Lunæ partes transmitti nequeant, & sublata transmissione radiorum omni, immersiones, emersionesque, cælestium corporum habeantur momento temporis, ac si nulla esset Atmosphæra. Hoc etiam posito ostendit umbras singulas, asperitatesque Lunaris disci in exteriore superficie fluidi depictas circuli lim-

limbo completi oportere: eadem prorsus ratione, qua in phiala vitrea, intus utcumque scabra, & colorato liquore imbuta, color protenditur ad partes extimas, & margo politissimus apparet. At quamvis Lunæ margo asperitates plurumque nullas exhibeat, quod in ordinem circumpositorum montium, & ulteriorem transpectum impediendum rejecerat Galilæus; in Pleniluniis tamen maximæ latitudinis asperitates plures se observasse retulit Ricciolus *lib. 4.* Almagesti, & plures in Eclipsibus annorum 1706, 1710, 1715, 1724 deprehenderunt Heinrichius, Cassinus, Hirijs, & Maraldus. Denique plusquam dimidiam Lunæ partem illustrari directe a Sole, & tenuem annulum apparere docuit Boscovichius illius magnæ refractionis ope: in quo rursus authori præclarissimo suffragari nequeo. Scilicet si lux annuli reflexione una, & duplici refractione in ingressu, egressuque Lunaris Atmosphæræ ad nos usque perveniret, eodem modo illustraretur annulus, ac cæteræ Lunæ crescentis, aut decrescantis partes, extremoque Lunari disco, ad quem radii oblique transeunt, esset similis, & in singulis Noviluniis videri posset. Annulum tamen non nisi Eclipses Solaris tempore sub forma Halonis vidit Heinrichius, Wolfius tenuem, & pallidum, Sclæuzerus aureum, Pechius in varios circulos concentricos divisum. Itaque statui potest, quod antea proposuimus, lucidum annulum nonnisi ex fluido aliquo circa Lunam diffuso oriri, hoc vero satis rarum esse, & variabile, ut sensibilem radiorum copiam dumtaxat Eclipses tempore ad nos reflectat, & stellarum prope transeuntium sensibilem alterationem dumtaxat aliquando, & peculiaribus ex causis gignat. Annuli autem latitudinem unius Lunaris digiti, aut trium fere minutorum anno 1715 Londini observavit Louvilleus, & Cassinus. Eandem extensionem Massiliæ, & Monte Pessulano anno 1706 exhibuit annulus, nec nisi in ea parte, ex qua adhuc apparebat Solaris discus unius minuti Lipsiæ vilus est. Hæc autem extensio annuli alio etiam argumento evertit Boscovichii hypothesein. Sequeretur enim, ut ipse eruit §. 65. ejusdem dissertationis, nimis amplam superficiem Lunaris partem illustrari directe a Sole, & quæ circiter parti septimæ

to-

totius diametri latitudine æqualis esset. Id vero. & maximam indicaret Lunaris fluidi densitatem, & annulum in phasibus Lunæ omnibus exhiberet. Annulum coarctare voluit Botcovichius: non sine aliqua, ut mihi quidem videtur, observationum omnium injuria. Neque enim Wolfius, Heinrichius, & reliqui Astronomi celeberrimi adeo tenuem ipsum annulum descripserunt.

Porro alia languidior lux, quæ Monte Pessulano extendi ad 8° visa est, interrupti illi, ac in gyrum effusi radii, quos Londini Atmosphæræ Lunaris fulgura esse censuit Louvilleus, Cassinus vero Iurætiæ Parisiorum ex Sole processisse existimavit, phænomena hujus generis, si quæ sunt, non plane rata, & constantia, cum nec in quolibet Eclipsi, nec ubi vis, nec eodem modo habeantur, ex mutationibus accidentalibus terrestribus, aut Solaris Atmosphæræ deduci poterunt. Eadem causa censenda est earum veluti anarum lucis ex Orientali, & Occidentali parte Solis magis protensæ, quam anno 1715 Valerius Upsalensis Astronomus, & anno 1733 in Schandinavia Tiburtius, & Chenon observarunt.

CAPUT DECIMUM.

De Atmosphæra Planetarum Superiorum.

Atmosphæram Martis amplissimis limitibus definiri ex iis observationibus deduci potest, quas primo capite dissertationis hujus recensuimus. Cum enim Roemerus Stellam in effusione Aquarii positam non antea emergens viderit, quam ejus a disco Martis distantia exæquasset duas tertias partes diametri, Atmosphæræ altitudo ad radium Martis erit ut 4:3. Latiores adhuc ejusdem termini evaderent, si senioris Cassini observationibus standum esset. Nam quoniam ex Cl. Monnierio, *Institut. Astronom.* §. 556, Perigæi Martis diameter censeri potest $22 \frac{1}{2}''$ Cassinus vero in distantia 6' a disco Martis stellam illam distinguere amplius non potuit, Atmosphæ-

sphæra ad 34 circiter radios Martis assurgeret. At vero factis parvo instrumeto pedum 3 Cassinus tunc usus fuerat: unde Roemeris observationes, quæ egregio Telescopio instituebantur, ad definiendam Atmosphæræ amplitudinem potiores videri debent. Maxime cum Stellam quintæ magnitudinis non nisi prope Martis superficiem disparuisse retulerit Cassinus Filius.

Quod si Atmosphæræ illius radius, quæ ulteriorem fixarum transpectum impedit, & propterea iatis densa est, ad radium Martis se habeat ut 7:3, oportebit sane ut gravitas in ea distantia superet vim centrifugam, sive ut gravitas ad vim centrifugam in Æquatore Martis sit in maiore ratione quam 343:27. Universim enim densiora Atmosphæræ alicujus strata ultra eos terminos protendi nequeunt, in quibus sit $cx^3 = gr^3$, quemadmodum capite tertio notatum est. Est autem vis centrifuga in Æquatore Martis ad vim centrifugam in Æquatore Terræ in ratione composita ex simplicibus diametrorum $\frac{3}{5}$; & 1, atque ex reciproca duplicata pe-

riodicorum temporum $24\frac{2}{3}$, & 24, sive ut 1728:3040: & vis centrifuga in Æquatore Terræ ad gravitatem se habet ut 1:289: gravitas igitur in superficie Martis erit ad gravitatem in superficie Terræ in maiore ratione quam 343.1728:27.3040.289, sive quam 592704:23721120, aut 1:40. Et quia densitas est ut pondus applicatum ad sphæræ radium, erit densitas Martis ad densitatem Terræ in maiore ratione quam 5:120, sive 1:24. Quia denique in superficie Martis gravitas se habet ad gravitatem in distantia unius terrestris semidiametri ab ipsius centro in ratione duplicata $\frac{3}{5}$; 1: gravitas in Martem erit ad gravitatem in Terram nostram paribus ab utriusque centro distantis, in maiore ratione quem 9:1000. Si Callini senioris observationibus standum esset, in superficie Martis gravitas ad gravitatem in superficie Terræ se haberet in maiore ratione quam 74088000:696160.

Atmosphæræ densioris, quæ Jovem cingit, radius ad radium Jo-

Jovis majorem rationem habere nequit, quam 9 : 4, sive ultra unam semidiametrum Jovis cum quarta parte Atmosphæra illa nequit assurgere, ut capite eodem tertio dictum est. Ita æquilibrium gravitatis, & vis centrifugæ, quod amplissimas Atmosphæras permetteret Planetis aliis, Atmosphæram Jovis, qui circa centrum celerius volvitur, satis coarctat. Ea porro maxima Atmosphære extensio in Æquatoris plano censeri debet: nam circa Polos, & vis centrifugæ defectu, & ob ipsam figuram Jovis, quæ oblatam sphæroidem exhibet, minore altitudine æquilibrium columnarum omnium tuebitur. Undique etiam perturbari singulorum Satellitum attractionibus eandem Atmosphæram necesse est. Fortasse inde ortum ducunt vicissitudines, quæ in motu macularum Jovialium deprehendi solent, & quas caloris diversitati tribuendas censuit Cassinus. Observatum est enim maculas prope Æquatorem Jovis citius revolvi, quam in aliis circulis parallelis. At non plures observationes hacce in re suppetant, nihil certius proferri poterit.

Ex observationibus, quas initio dissertationis hujus recensuimus, deduxit Cassinus filius in Monumentis Parisiensis Scientiarum Academiae anni 1715 Atmosphæram Saturni ad usque extimam superficiem annuli pertingere. Nam zonæ illæ, quas aliquando longioribus Telescopiis detexit eandem fere curvaturam cum annulo præseferrebant. Et quidem anno 1715, cum annulus rectilineam umbram in Saturni discum projiceret, rectilineæ videbantur. Anno autem 1696 cum in conspectum prodiiisset annulus, minimam curvaturam aliquam exhibebant. Ex quo intulit vir clarissimus non adhæcisse zonas Saturni corpori, nec fuisse aliud quam nubium circumpositarum umbras ex eadem regione annuli projectas. Non potest vero Atmosphæra densior ad primum usque Satellitem extendi: secus perturbaretur ipse in suis motibus, nec una Kepleri lege cum cæteris revolvi posset. Cum igitur Saturni semidiameter ad semidiametrum annuli sit circiter ut 2 : 5, & distantia primi Satellitis sit fere duarum semidiametrorum annuli, Atmosphærae altitudo inter $\frac{3}{2}$, & 4 Saturni semidiametros consistet.

Po-

Ponamus Atmosphaerae semidiametrum complecti tres semidiametros Saturni, & quo modo ex jam data revolutione Martis circa suum axem gravitatis limitem aliquem definivimus, ita nunc ex perspecta gravitate in Saturni superficie diurni motus limitem aliquem eruamus. Vis centrifuga ad gravitatem in Saturni Æquatore se habere debet in minore ratione quam $1 : 27$, ut scilicet in ea trium semidiametrorum distantia gravitatem adhuc non superet. Est vero in superficie Saturni gravitas ad gravitatem in superficie Terræ ut $529 : 435$, & gravitas in superficie Terræ ad vim centrifugam sub Æquatore ut $289 : 1$. Compositis igitur rationibus vires centrifugæ sub Æquatore Saturni, & Terræ in minore ratione erunt quam $152881 : 11745$, sive si radius Terræ dicatur R , tempus diurnæ revolutionis T , radius Saturni r , & revolutionis tempus t , crit $\frac{r}{r^2} : \frac{R}{T^2} < 152881 : 11745$. Porro si diameter Saturni juxta Newtonum statuitur $16''$, parallaxis horizontalis Solis $10''$, distantia mediorum Saturni, & Terræ a Sole 954 , & 100 , prodibit $R : r = 1 : 7.6$, adeoque t^2 fiet majus quam $\frac{51403512^h}{152881}$, sive 336.23^h , & Saturni revolutio circa axem plusquam $18^h 18'$ absolvetur. Si ad extremam regionem annuli dumtaxat pertingat Atmosphaera, revolutionis tempus minus esse poterit $18^h 18'$, dummodo sit majus $13^h 57'$.



S

DE

PAULLI FRISII
DE NATURA, ET MOTU
ÆTHERIS,
AC PHÆNOMENIS INDE PENDENTIBUS
CONIECTURÆ PHYSICÆ
QUARUM SPECIMEN ANNO MDCCLV.
IMPERIALIS PETROPOLITANÆ
SCIENTIARUM ACADEMIÆ JUSSU,
ET SUFFRAGIO EDITUM EST.

DE NATURA ET MOTU
Æ T H E R I S.

CUM multa sint, in quibus veterum Philosophorum, recentiorumque sententiae dissident inter se, tum in id maxime consensisse videntur omnes, ut fluidum aliquod subtilissimum, tenuissimumque crassiori aëri admisceri vellent, permeare terrestria corpora, & per caelestia spatia latissime diffusum esse. Hanc fuisse Thracum, Ægyptiorum, Persarum, hanc veterum Chaldæorum, qui ex Zoroastri schola prodierunt, hanc Serum, Indorumque, quos hodierni Sinenses, & Siameses secuti sunt, hanc sectæ Italicae, Jonicae, Stoicae, Socraticae, Platonicae communem fere opinionem, ex Suida, Diodoro, Vossio, Stanlejo, Budæo, Lactio, & Platone ipso colligimus. Fluidum ipsum Boerhavius elementarem ignem, atomorum effusionem Gasfendus, Cartesius globulosam, subtilemque materiam, Newtonus athereum medium, & spiritum subtilissimum appellavit. Newtonus autem quæstione 18 Opticæ eo potissimum argumento ad fluidum agnoscendum perductus est, quod si in duobus vitreis cylindris amplioribus duo thermometra ita suspensa sint, ut vitrum non contingant, & aër ex altero horum vitrorum exhauriatur, ac postmodum vitra ex frigido in calidum locum deferantur, thermometrum, quod in vacuo est, neque tardius, neque remissius incalescit, quam quod in libero aëre relinquitur: exinde enim consequi animadvertit vir maximus exteriorem calorem illum transire in vacuum non posse nisi medii cuiuspiam vibrationibus, quod aëre subtilius sit, quod vitra aliquo modo penetret, & quod exhausto aëre superfit. Porro ex ejusdem medii tenuissimi

vi-

vibrationibus non effusionem caloris solum, sed etiam lucis inflexionem, reflexionemque, ac refractionem, & vices faciliores reflexionis, transmissionisque, & lucem ipsam, elasticitatem, gravitatemque ortum ducere Newtonus subsequenter aliis quaestionibus Opticis suspicabatur, & in generali, ac postremo scholio principiorum Mathematicorum se pluram excogitasse indicavit circa eam fluidi actionem, qua proximæ corporum particulae attrahuntur, & contiguæ cohærent, & agunt corpora electrica ad majores distantias, & lux emittitur, reflectitur, frangitur, & corpora calefacit. Et quamvis toto Principiorum opere voces attractionis, impulsus, propensionis cujuscumque in centrum promiscue usurpaverit, monuit tamen *def. 8. lib. 1.* se has voces non physice, sed mathematicè accipere, quatenus effectus, & motus denotant, non quatenus principia, & causas: & initio undecimæ sectionis addidit centripetas vires corporum rectius, & castigatius impulsus dici, quam attractiones.

Quæ quidem cum ita sint jure merito mirari subit Desaguillierium, Clarkium, Gravesandium, aliosque, quos Johannes Bernoullius de Cartesii systemate ediscrens appellabat discipulos Magistro suo animosiores, attractionem corporum non quidem impulsu physico, sed ingenua quadam vi fieri voluisse, Keillium vero theorematà, & leges quasdam ipsius vis exhibuisse, quibus nihil deesse videtur præter demonstrationem, & Cotesium ulterius progressum in præfatione Newtonianæ Philosophiæ attractionem, gravitatemque simplicissimis aliis, atque essentialibus corporum proprietatibus impenetrabilitati, extensioni, mobilitati adjecisse, nec minore ratione inquiri posse censuisse qua de causa exiguae corporum particulae sese attrahant, quam cur sint mobiles, & extensæ. In quo quidem perspicacissimo Geometrarum non possumus non retragari. Etenim ex eo quod gravitas, & attractio sint generales caelestium corporum, & terrestrium proprietates, non nisi pessimo vocabulorum abusu, & confusione inferri potest esse etiam proprietates essentielles. Sine idea impenetrabilitatis, extensionisque idea corporis nulla est, & nihil plane corporis concipimus, dum concipimus aliquid aut
pe-

penetrabile, aut inextensum. Contra adhuc nitidam ideam corporis habemus dum aliquid impenetrabile, & extensum concipimus, quod gravitet in terram tantum, & non in Lunam, aut in Lunam, & non in terram, aut quod neque in terram, neque in Lunam, neque ullo prorsus modo grave sit. Itaque cum essentialis corpori sit extensio, & impenetrabilitas; attractio, & gravitas non nisi generalis corporum omnium proprietas esse poterit: cumque nulla amplius extensionis, & impenetrabilitatis quaeratur ratio, quia semel ac corpus est, solidum, extensumque esse debet; jure merito quaeri poterit cur minimae corporum particulae, & quam ob causam sese attrahant: neque enim est qui minus distincte intelligat quomodo cohaereant corpora, quam quomodo habeant ingentiam sese attrahendi vim. Imo fortasse cohaesionis idea conceptus attractionis ingentiae, & ab impulsu non pendentis obscurior est. Qui enim dicunt omnes materiae particulas *A*, *B*, *C* &c. sese invicem attrahere natura sua, intelligunt ne quod vis quaedam in corpusculo *B* resideat, quo ex se tendat versus *A*, an quod vis quaedam in corpusculo *A* habeatur, quae corpusculum *B* agitando ad contactum usque perducatur? Si primum dicant, explicent quomodo idem corpusculum ex se possit habere infinitas vires, quibus ad infinita puncta, etiam ex diametro opposita constanter tendat, quarum directiones mutatis punctorum locis mutantur, vires acceleratrices punctis accedentibus, aut recedentibus crescant, aut imminuantur, & absolutae actiones, licet impediri aliquando corpusculorum oppositione possint, numquam tamen ita extinguere possint, ut sublata oppositione amplius non exerceantur. Si secundum respondeant, explicent quo arcano fit quod corpusculum *A* alia quaevis corpuscula *B*, *C*, etiam ex diametro opposita, etiam infinita numero, & a se dissita agitet, turbet, rapiat, debilius quidem, aut fortius pro majoribus, minoribusve distantis. Quid hisce rebus omnibus obscurius? Cum ergo Physici impulsus ideam nitidam maxime, & distinctam habeamus, attractionis illius conceptus arduus undique, & implicatus est.

Accedit corpora electrica subtilissimum fluidum, ex quo
pro-

profluit electricitas, exhibere ipsis oculis, cohaesioni explicandae Keillianam attractionem illam vix sufficere, cæteris vero explicandis phaenomenis reflexionis, refractionis, inflexionis lucis, suspensionis fluidorum in tubis capillaribus &c. prorsus esse imparem. Quod quidem non ita dictum debet intelligi, quatenus succenseamus argumentis iis omnibus, quæ adversus attractionem a recentioribus scriptoribus allata sunt, sed quatenus nonnulla in medium proferri posse arbitremur, quæ ostendant attractionem ingentem cum naturæ phaenomenis minime conciliari. Explicemus singillatim singula, ut videant adversarii quam candide rem agamus. Nonnulli primum adversus attractionem argumentum desumunt ab exemplis 2. & 3. *propof. 81. lib. 1. Princ. Mathem.* Newtoni, juxta quæ exempla si vis tendens ad singula materiae puncta esset reciproce in triplicata, aut quadruplicata distantiarum ratione, attractiones sphaerarum in contactu ipso augerentur ad infinitum, ut notant Newtoni Interpretes *num. 527.*, & *531* : adeoque si in data aliqua distantia aliquo modo sensibilis esset attractio, se postmodum contingentes sphaerae nulla amplius sensibili vi separari possent a se invicem. Secundum ex eo derivant, quod si laminae planae, & politae sibi invicem superimpositae sola attractionis vi tendente ad puncta singula cohaererent, eadem, aut ferme eadem vi divelli ad invicem deberent, sive perpendiculariter, sive ex latere divellerentur: cum tamen in perpendiculari divisione maxima vis experiatur, in laterali vero, quando una lamina supra alteram gliscit, sit ferme nulla. Tertium desumunt ex cohaesione hemisphaeriorum diversae diametri, ex metallo, & ex vitro comparatorum, in quibus si, compensantibus sese invicem circumferentiis, latitudinibusque, annularium marginum se contingentium superficies aequales fiant, modica cera interposita, extractioque aëre intus contento, longe diversa cohaesio deprehenditur, ut qui annuli ampliorem peripheriam, minoremque habent latitudinem, non nisi multo majoribus ponderibus appensis dissolvi possint. At vero fortasse haec tria attractionum patronis nihil negotii possunt facillere. Primum, enim debet intelligi de eo cor-

pusculo dumtaxat, quod sphaeram tangit, quodque cum in data distantia attractionem non nisi infinite parvam subire possit, aucta in contactu ad infinitum usque attractione non nisi finita vi sphaeræ adhærebit. Secundum infirmum est: nam quando lamina *LN*, *fig. 21.*, ab alia *PQ* divellitur perpendiculariter, juxta attractionum hypothesein, tota duarum laminarum attractio mutua superanda est: at si laterali motu punctum *A* in *a* transeat, non attractiones totæ punctorum *B*, & *D* ex gr. superari debent, sed differentia solum attractionis, qua punctum *D* puncti *A* motum promovet, & punctum *D* retardat: atque ita cum differentia omnis totalibus attractionibus longe sit minor, in laterali laminarum separatione vis longe minor impendi debet. Tertium hypotheses omnes excogitatas hactenus a Philosophis circa coherrentiam corporum æque convelleret: omnibus enim opponi posset æqualium superficialium se contingentium æqualem attractionem esse oportere. Fortasse in hypothesei attractionum facilius argumenti solutio est. Juxta ipsam enim cum totius annuli attractio in corpusculum quodlibet exercita non pendeat solum ex annuli amplitudine, sed ex numero, distantia, & loco attrahentium punctorum, quæ duo postrema dato etiam æquali punctorum numero, & mutata solum annuli latitudine, atque ambitu diversa sunt; præsto est diversam attractionem corpusculi uniuscujusque, & superficiei annuli alterius esse posse. Nihil autem ex illo experimento concludi potest. Quis enim experimentatorem accuratissimum certum fecit aut eodem modo lævigatos fuisse annulos æqualis superficiei, & contactus habuisse æque amplos, aut eadem ratione distributam fuisse utrobique ceram, aut fluidum aliud interpositum, aut ante aeris extractionem æquali penitus vi compressos fuisse annulos ad intermedium aerem excludendum? Patet in hujus generis experimentis disparitates illas, quæ cohesionem longe diversam faciant, declinari nequaquam posse.

Jam vero gravioribus argumentis adversus Keillium, Clavium, Muschenbroekium agendum est. Si particulae primigeniae jam ex se solidæ, & coherentes statuuntur, viribusque

T

que

que attractivis praeditae pro varietate distantiarum variis, compositorum omnium cohaesio aliquo modo explicari poterit. At si cohaesio ex attractivis viribus penderet omnis, aliam esse oporteret, quam vere sit. Si enim cohaesio corporum ex attractione dumtaxat oritur, sine attractivis viribus materies, & materiei partes singulae ad infinitum usque essent fluidae: & attractivis iidem viribus materiei primitus superadditis partes singulae figuram sphaericam induissent, qua sola omnium virium aequilibrium tueri potest. Sese attrahentes partes non nisi aequalibus a communi centro distantis, & stratis sphaericis dumtaxat inter se aequilibrari ipse etiam Musschenbroekius animadvertit in suo Specimine Physicae, num. 588. Primo igitur ex attractione in solidos globulos abiisset materies omnis. Huiusmodi autem globuli contigui, aut sejuncti fuissent inter se. Si dicant attractionis patroni sejunctos fuisse globulos debent assignare causam cur fuerint, & qua ad contactos mutuos pervenire minime potuerint: deinde ex globulis a se distitis non alia coaluissent corpora nisi fluida. Quod si contiguos velint globulos ab ipsis rursus quaerendum erit utrum attractrices globulorum vires insensibiles prorsus fuerint, an potius sensibiles & magnae. Si primum asseratur, minima etiam vi adhibita potuissent globuli a se invicem disjungi, & corpora ex globulis coalita adhuc fuissent fluida. Si alterum, simul conjungi, & ex pluribus unum componi, quinimo unum ex omnibus oportuisset: quippe in sola figura sphaerica, ut dictum est, obtinetur attrahentium virium aequilibrium. Exemplum ex iis ipsis depromi potest, quae ad attractionem stabiliendam in medium afferuntur: ita enim gutta aquae, aut mercurii, aut alterius cujuseumque fluidi siccae superficiei alicujus corporis affusa sphaericam formam induit, & duae guttae libi contiguae uniuntur simul, & tertia, quae admoveatur propius, statim adjungitur, atque ita quarta, quinta &c. omnesque simul figuram sphaericam, quantum nativa gravitas permittit, retinent. Quocumque igitur se vertant attractionis patroni, cum attractionis legibus cohaesio corporum minime componi potest.

Ad

Ad capillares tubos quod pertinet unum dumtaxat, aut alterum argumentum in medium proferamus. Si aquae guttula per superficiem exteriorem deorsum diffluens ad oram infimam capillaris tubi pervenerit, & magnitudinis illius sit ut per totam basim diffundi, & aperturæ internæ opponi possit, ad eandem altitudinem elevatur, ad quam aqua in vase subjecto stagnans rapi solet. Attractio autem quaecumque sit, cum debeat agere per radium, ut vocant, activitatis brevissimum, explicando experimento impar est, juxta quod in distantia etiam linearum plusquam viginti deberet agere, ut in tubo 40 linearum ad altitudinem linearum 18, aut 19 delata gutta a superiore vitro adhuc altius contra nativam gravitatem, & inferioris vitri attractionem evchatur. Observatum insuper a Sturmio, Musschenbroekio, & Fabro est in longioribus tubis fluida altius ascendere, & imminutis tuborum longitudinibus statim deprimi, adeoque supremas etiam vitrorum partes ad fluidorum elevationem aliquid conducere: quod pariter opponi potest Musschenbroekio, Gravesandio, Weitbrechtio, Sigorgnio, Jurino, & Bülsfingero, qui demum in Jurini hypothesein concedens pro explicandis tuborum capillarium phaenomenis attractionem in subsidium advocavit. Denique si oleo terebinthino, aut sacbo interius illiniatur tubus, non amplius ascendere aquam patitur. Hoc adversus attractionis defensores phaenomenon habere locum observavit Gerdilius juxta illud maxime Clairautii theorema, quo statuitur aquam ascendere debere quamdiu quantitas attractionis capillaris tubi duplo minor non sit quantitate attractionis aquae. In quo quidem acu rem tetigit vir clarissimus: Aqua enim non multum densior sacbo est, adeoque numerus attrahentium punctorum, & vis attractrix capillaris tubi, ac sacbi adjecti duplo minor attractione aquae esse non potest, & juxta leges attractionis aqua debet ascendere. Weitbrechtii effugium, quo radium activitatis vitri longae brevioris statuit radio activitatis aquae, ineptum est. Si enim aqua interius tubi parietibus affusa ascensus aliorum fluidorum non impeditur, cur ultra minimam affusi sacbi crassitiei vitri activitas porrigi amplius non potest?

T 2

De-

Demum lucis phænomena ab attractionis legibus adeo dis-
sident, ut radii prope quædam corpora transeuntes, inflexi-
que, ab iisdem corporibus, a quibus deberent attrahi, re-
cedendo, divergentes coloratas simbrias, & iusto latiores um-
bras exhibeant. Cui quidem incomodo ut occurrerent attra-
ctionis patroni ad repulsionem confugerunt, & lucem ipsam
voluerunt a quibusdam corporibus attrahi, a quibusdam au-
tem repelli. Frustra tamen: cum enim experimento comper-
tum sit in confiniis duorum mediorum reflexionem lucis eo
copiosorem fieri, quo major est densitatis mediorum diffe-
rentia, atque ita in transitu lucis ex vitro in vitrum, qua
vitra sese contingunt, reflexio nulla sit, in transitu ex vitro
in aquam sit fortior, & adhuc fortior in transitu ex vitro in
aerem; dici oporteret corpora eo fortius lucem attrahere,
quo sunt densiora, & quo sunt rariora eo fortius lucem re-
pellere. Hoc dato copiosissima reflexio, quæ in prima su-
perficie habetur, in transitu lucis ex. gr. ex aere in vitrum
explicari non poterit: aut si ad hanc reflexionem explican-
dam dicatur lucem ab aëre fortius attrahi quam a vitro, al-
tera ea reflexio in transitu ex vitro in aerem non poterit
amplius explicari. Et ne in subsidium afferantur ultimæ *lib. 1.*
Princip. Mathem. Newtoni propositiones observandum est
reflexionis lucis phænomena æque haberi quicumque sit an-
gulus incidentiæ radiorum, & etiamsi radii incident ad per-
pendicularum: & juxta *Propos. 96.* illius libri lumen tran-
seundo per parallela plana alicujus medii, & versus medium
ipsum impulsus, reflecti in ea tantum lineæ incidentiæ obli-
quitate ad planum primum, in qua sinus incidentiæ se ha-
beat ad radium circuli, cujus est sinus, ut idem sinus inci-
dentiæ ad sinum emergentiæ a plano ultimo. Difficultatem
sensit Newtonus ipse, ut cum reflexionem lucis non ab im-
pactu in partes solidas, sed a vi quadam per superficiem re-
flectentem æqualiter diffusa oriri vellet, alicubi lucem a
vitro atrahi, alicubi vero repelli dixerit. Confer inter se pri-
mam, & octavam propositionem *par. 3. lib. 2. Opticæ.* Idem
ex vicibus facilioris reflexionis, transmissionisque, idem ex
notissimis aliis lucis, colorum, elasticitatis, fermentationum
che-

chemicarum phaenomenis adversus attractionem instaurari argumentum potest. Neque enim dum tenditur chorda elastica, & secundum longitudinem distrahitur, secundum diametrum vero arctior fit, & compactior, si ex particulis sese trahentibus componitur, vim aliquam habere debet, qua, relictis arctioribus contactibus, secundum eandem longitudinem, ubi contactus pauciores, & minus arcti sunt, restitua-
tur. Neque etiam chemicarum fermentationum ratio aliqua reddi potest nisi quibusdam particulis attractionem, quibusdam repulsionem tribuendo, aliis fortio-
rem, debiliorem aliis: quo plane efficeretur quod bonos illos Lesbios fecisse dicitur, qui cum ædes ad regulam accommodare non possent, regulam ad ædes accommodarunt.

Hanc vero repulsionum ideam a Newtono primum exhibitam diligentius excoluerunt nonnulli, ut etiam dixerit Muschenbroekius *cap.* 18. Speciminis *num.* 643., aquam, & ellychnium lampadis, aquam, & distillatum oleum, maxime terebinthinum, hoc mutuum odium, aversionemque objicere ipsis oculis: ut arbitror minus recte. Nam oleum terebinthinum ante distillationem, & olea etiam plantarum aquae cum adjungantur, & aquae uniatur pariter ellychnium frictum sapone aliquo, aurium cerumine &c. insitam nullam, ac naturalem vim repellendi habere debent. Boscovichius insuper in suis dissertationibus de viribus vivis, de lumine, de lege continuitatis, de lege virium in natura existentium &c. cum quamdam contradictionem in saltibus naturæ singulis, & violatione continuitatis deprehendisse sibi visus esset, cumque rejectis corporibus perfecte duris, & dumtaxat elasticis admissis saltui, & violationi continuitatis in totis quidem corporibus sibi occurrentibus, non vero in singulis partibus a Johanne Bernoullio provisum fuisse animadvertisset; statuit singula materiæ puncta repellendi vi esse prædita, qua sibi propius accedendo velocitatem omnem extinguant per gradus singulos, & quæ imminutis in infinitum distantis ad infinitum usque augeatur. Ait enim juxta Aristotelis definitionem quantitates continuas esse, quæ partium terminum communem habent, ut ubi pars una desinit altera incipiat: terminos indivisibiles esse oportere, secus terminarentur ipsi,

si, & non terminarent, &. quia indivisibilia omnia aut distant invicem, aut sublata distantia in unum confluunt, termino contiguum terminum esse non posse. Ex his vir ingeniosissimus collegit, quod si in natura mutationes aliquæ per saltum fierent, & una magnitudo in aliam non continuata serie crescendo, vel decrecendo transire posset, eo temporis momento, quod esset seriei desinentis, & incipientis limes, ac terminus indivisibilis, duo simul termini emergerent, postremus scilicet seriei antecedentis, & primus consequentis, eademque res duplici modo se haberet, quod est absurdum: duo enim momenta temporis sibi invicem contigua esse nequeunt, quarum uno prima series abruptatur, altero incipiat series altera, & duos, diversosque rei status distincte referant.

Hoc fere vetus argumentum est, quo impossibilitatem motus probabat Zeno, & quod Diogenes Laertius deambulando refellebat. Quinimo est illud ipsum, quo nonnulli materialistæ creationem materiæ, & mundi impossibilem pronunciarunt. Is ut occurreret Celeberr. Boscovichius, *num. 9.* de lege contin., animadvertit nihilum nullas reales, & absolutas proprietates præferre, nec constituere seriem aliquam, nec primum, ac postremum seriei terminum complecti: adeoque creationis tempore materiam complecti quidem priorem terminum consequentis seriei, qua est, non vero posteriorem seriei antecedentis, qua non est: in annihilatione vero ultimum terminum antecedentis, non primum consequentis seriei, qua esse desinit: atque ita e nihilo citra ullam metaphysicam contradictionem educi posse, & in nihilum reverti. Porro quietis status est merum nihil respectu motus, & velocitatis. Quid enim refert *statum quemdam realem esse velocitatem nullam puncti existentis, nimirum determinationem perseverandi in eodem loco?* Utique corpora ad nihilum non reducuntur, & proprietates suas adhuc retinent dum quiescunt, extensionem, impenetrabilitatem, figuram &c. velocitatis autem, & motus retinent omnino nihil. Opponuntur plane inter se translatio, & non translatio de loco in locum, & una alteram destruit, ac negat. Cum quies igitur sit
ve-

vera motus negatio, aut nullus motus, & citra ullam intrinsecam contradictionem quantitates reverti in nihilum, & rursus produci possint; poterunt etiam continenter a motu ad quietem, & a quiete ad motum transire corpora, quin antea per intermedias velocitates gradatim transeant. Eadem ratione poterunt per varios gradus velocitatis non contiguos sibi invicem transcurrere, ex. gr. a tribus gradibus ad duos: duo enim communes gradus minime impediunt quo minus tertius destruat. Hoc ipso nulla erit durorum corporum metaphysica impossibilitas, & omnis virium repellentium, & attrahentium theoria, quæ continuitatem motus totius corporis, & quarumcumque partium tueantur, non adeo solidis fundamentis innixa erit. Maxime cum, admissa etiam lege continuitatis, si partes corporum congregientium ad infinitum divisibiles, flexiles, & elasticæ intelligantur, saltus nonnisi in primis superficiebus haberi possit, quæ se contingunt, & quarum nullus motus revera est: sunt enim superficies termini corporum, & non corpora: motus vero appellatur corporum translatio de loco in locum. Quo argumento Cl. Boscovichius, num. 10. dissertationis de natura, est usu infinitorum, divisibilitatem corporum ad infinitum rejicere voluerit, non intelligo. Ait enim: *Si recta linea dividi posset in partes æquales numero infinitas; infinitum per unitatis ablationem posset finitum evadere. Nam inter primam, & ultimam particulam interjacerent partes numero infinitæ, ac pariter inter secundam, vel tertiam, vel decimam, & ipsam ultimam; non vero numero infinitæ inter ultimam, & decem, vel viginti particulis ab ea distantem. Si jam intelligantur auferri eæ omnes, & solæ, inter quas & ultimam sunt partes numero infinitæ; oportebit reliquas dempta ultima esse numero infinitas; aliter postrema ex iis, quæ ablatae sunt, ablata non fuisset: at non computata reliquarum prima, finitus erit earundem numerus; aliter & ipsam auferri oportuisset.* Duo videntur satis perspicua hæce in re: primum, quod concesserat Mac-Laurinus, in quocumque corpore Geometrice assignari posse partes dato numero æquales: alterum, quod ex primo evidenter sequitur, numerum

rum partium cujuscumque corporis dato, & finito quocumque numero majorem esse oportere, sive, ut fert ipsa vocabuli significatio, infinitum.

Cum ergo mutuam repulsionem minimarum materiae partium, attractionemque, quae partibus singulis sit indita, quæque ex Mechanico principio aliquo, & ex impulsu non oriatur, plane arbitrariam, conceptu suo arduam, & phaenomenis electricorum corporum explicandis inutilem, cæteris autem phaenomenis cohaesionis, elasticitatis, lucis, suspensionisque fluidorum in tubis capillaribus parum consonam esse intelligerem, caepi priores illas Newtoni ideas excolere diligenter, explorare naturam, indolem, motum aetheris, effectusque inde ortos perpendere, atque alios ex aliis derivare. Nihil autem omnino assecutus sum, quod satisfaceret ullo modo indicandæ causæ universalis, & mutuae corporum omnium gravitatis, quam *quaest.* 21. Opticae Newtonus suspicabatur oriri ex eo posse, quod in densioribus Solis, Stellarum, Planetarum, Cometarumque corporibus rarius esset aethereum medium, quam in spatiis caelestibus interjectis, quodque majora corpora, & singulae partes corporum a medio densiore in rarius propellerentur. Imo cum aetherem subtilissimum per caelestia, & terrestria spatia diffundi undique, & perturbato, celerrimoque omnium partium motu agitari ex notissimis ignis phaenomenis collegerim, qua ex causâ prodierit, conserveturque motus intestinus aetheris non video. Verum minimas omnes lucidorum corporum Solis, & Stellarum partes eodem motu abripi compertum est, licet rationem, & causam motus ignoremus. Quare nihil ignoto motus illius principio immorari necesse est, & semper progressus aliquis in universa Physica erit factus ubi aetherem diffundi undique, & intestino motu agitari innotescat, & ex motu aetheris probabilis aliqua ratio deduci possit propagationis ignis, effusionis, & colorum lucis, phaenomenorum electricorum, cohaesionis, elasticitatis &c. Id autem mihi video præstitisse. Theoriae totius specimen, quod electricitatem maxime respiciebat, ad Academiam Petropolitanam missum est, cum anno 1755 præmio proposito electricitatis the-

theoriam, & discrimen potissimum ignis, electricitatisque, & corporum ex origine, ac communicatione electricorum Academia postulare. Quod quidem cum benigne Petropoli exceptum fuisse acceperem, atque insuper Cl. Müllerius, qui Academiae a secretis est, humanissimis datis litteris significasset adjudicandum mihi fuisse premium ubi celato auctoris nomine, ut moris est, dissertatio ad Academiam pervenisset; theoriam omnem longius perducere, & in tres partes partiri volui, quarum prima de igne, & luce, altera de electricitate ager, tertia de phaenomenis aliis ab aetheris motu pendentibus. Eam aequo animo accipiat lector optimus, & simplicis conjecturae loco habeat, aut potius physici experimenti phaenomenorum plurium explicandorum, quae aliis hypothesebus difficilius, aut nullo prorsus modo explicarentur. Praestat enim quae demonstrata, ac certa sunt non ab iis solum, quae incerta, & falsa, verum etiam ab iis secernere, quae probabilia, aut vero tantum similia videri possunt.

P A R S P R I M A .

De Igne, & Luce.

DEFINITIO PRIMA.

Æ Theris nomine intelligitur fluidum subtilissimum, rarissimumque, ab aëre prorsus distinctum, & quod sublatum aëre remaneret.

DEFINITIO SECUNDA.

Motus intestinalis aetheris est quo minimae ipsius partes confuse, perturbataeque inter se invicem cientur. Similis est motus, quo aër incalescit, & calefit.

DEFINITIO TERTIA.

Motus vibratorius ætheris est quo ætheris molecule compressæ in locis suis sese expandunt, & molecule alias propiores comprimunt, & hæc rursus alias, & successive. Simili motu in aere excitatur sonus.

DEFINITIO QUARTA.

Vibrationes, quæ ab una ad aliam moleculam successive transeunt, pulsus ætheris dici debent, ut pulsus æris, & pulsus sonori dicuntur illi, quibus in aere sonus effunditur, & propagatur.

DEFINITIO QUINTA.

Motus translationis ætheris est quo plures ætheris molecule de uno in alium locum transferuntur, & illi motui est analogus, quo in aere ventus excitari solet.

EXPERIMENTUM PRIMUM.

Corpora omnia, quæ incalescunt, caloris vi expandi observavit Boerhavius, & secundum dimensiones omnes dilatari, iis tantummodo exceptis, in quibus copiosiore evaporatione avolantibus undique particulis materiae quantitas deficit, ut lutum, ligna, ossa, &c. E contra corpora frigescencia non nisi majore vi divelli a se invicem, & in partes secari possunt, & majorem duritiem, densitatemque adipiscuntur. Aqua etiam ipsa frigescens, ad congelationem usque, ut Mairanus observavit, condensatur, nec nisi congelatione incipiente expanditur, rarefcit, & levior redditur. Probabilem singularis phaenomeni rationem idem Mairanus attulit in sua de glacie dissertatione.

Ex-

EXPERIMENTUM SECUNDUM.

Soni acutiores prae gravioribus citius propagantur. Id primus in Monumentis Parisiensis Scientiarum Academiae anno 1737 Cl. Mairanus certissimo experimento confirmavit, quo cum duae diversi toni campanae pulsarentur eodem tempore, acutior sonus ad diversa intervalla citius effundebatur, quodque cum jam sexagies repetitum fuerit maximam sibi videtur hacce in re fidem conciliare. Itaque flatui potest acutior sonum prodire celerioribus aëris vibrationibus, & musicos omnes tonos, chordae, clavis, & toni, tertiae minoris, quartae, quintae, sextae majoris, septimae, & octavae supra istam clavim celeritate, & numero vibrationum in singulis particulis aëris eodem tempore absolutarum inter se distingui.

EXPERIMENTUM TERTIUM.

Qui colorati lucis radioli de uno in aliud medium transendo fortius reflectuntur, ii etiam a corporibus omnibus ad oculos reflectuntur celerius, ut cum omnium maxime refrangibilis sit violaceus, is etiam primus omnium reflectatur, deinde vero reflectatur indicus, & post indicum caeruleus, tum viridis, ac flavus, & novissime aurantius, & ruber. Haec notissimis experimentis demonstravit Newtonus *par. 1. Opticae cap. 9. & 10.* Inde vero universim deduci potest radios aurantios majore celeritate propagari quam radios rubros, & flavos esse celeriores aurantiis, flavis viridibus, viridibus caeruleos, & caeruleis indicos, ac denique omnium celerrimos esse violaceos.

L E M M A.

Aër spectari potest veluti fluidum ex pluribus aliis fluidis hetherogeneis coalitum.

Id primo in Parisiensi Academia proposuit anno 1719,
V 2 Cl.

Cl. Mairanus, & praeclare ostendit postmodum in Monumentis ejusdem Academiae anno 1737, eo potissimum argumento fretus quod cum in Musicis concentibus septem toni distincte audiantur, juxta antecedens experimentum simul in aëre excitari debent vibrationes septem inter se invicem hetherochronae. Hæ vero aut in iidem aëris particulis excitantur, aut in diversis. In iidem non: neque enim possunt eadem numero acris particulæ celerioribus, tardioribusque vibrationibus abripi eodem tempore. Cum igitur diversæ aëris particulæ vibratoriiis illis celeritatibus abripiantur, quæ sunt tonorum singulorum propriæ, debent etiam speciei, qua ad unam potius quam ad aliam vibratoriam celeritatem determinantur, inter se differre. Idem colligitur ex *Prop. 48. Lib. 2. Princip. Mathem.*, juxta quam pulsum in medio elastico propagatorum velocitates sunt in ratione composita ex subduplicata ratione vis elasticæ directæ, & subduplicata ratione densitatis inversæ.

COROLLARIUM.

Si particulæ minimæ sonori corporis vibrentur illa celeritate, quæ alicui tono respondeat, velocitatem, motumque suum per circuitum analogis dumtaxat particulis aëris communicabunt, cæteris autem alterius speciei particulis nullo modo. Licet enim particulæ omnes aëris impellantur a sonoro corpore, quæ tamen elasticitate, & densitate sua particulæ ad eam vibratoriam celeritatem concipiendam sunt comparatæ, semper simili itu, & reditu motum omnem particularum sonori corporis deferent usque ad aurem. Simili etiam ratione unam chordam pulsando licet tremor aliquis debeat aliis chordis omnibus communicari, sensibilis tamen tremor ad illas dumtaxat transit, quæ ad unisonum tensæ sunt.

PROPOSITIO PRIMA.

Ignis habetur motu celerrimo, perturbatissimoque omnium partium igniti corporis. Id

Id ex phænomenis ignis omnibus manifeste adeo colligitur, ut mirum videri debeat auctores duarum dissertationum, quæ post tres alias anno 1738 a Regia Parisiensi Scientiarum Academia præmio condecoratas impressæ sunt, leviores quasdam ob causas sine motu fieri voluisse ignem. In primis enim ex quo amplissimis etiam ustoriis speculis collecta Lunaris lux nullum sensibilem calorem pariat, & ex quo aquæ ebullientis calor certo dumtaxat gradu augeri possit, nihil plane aliud consequitur, nisi & modicam esse lucem ab aspera superficie Lunæ reflexam, & intestinum motum aquæ ebullientis certis limitibus definiri. Deinde quod aer vento agitatus, & vehementer excussa aqua frigida adhuc manere possit nihil plane aliud indicat nisi ignem, caloremque confurgere ex motu non communi quidem totius corporis, sed celeri, ac perturbato partium minimarum. Quo jam quatuor simul prioribus authorum eorundem argumentis responsum erit. Quod postremo loco dictum est valet etiam in fermentationibus chemicis. Possunt enim minimæ omnes partes perturbate agitari sensibilibus partibus, & crassioribus suo semper loco quiescentibus: possunt crassiores partes varie moveri nullo penes minimas partes, aut saltem modico suborto motu. In primo dumtaxat casu calor habebitur. Obtinet casus ipse in pluribus fluidorum mixtionibus, ut ea est, qua sali ammoniaco, & oleo vitriolico aliquot spiritus vini guttis injectis; cessata partium sensibilibus effervescencia insensibiles partes tali adhuc motu agitantur, ut major calor Thermometro experiatur. Ad casum alterum reducuntur fermentationes, quæ in memoratis dissertationibus obijciuntur, & quas describere Amontonium, Musschenbroekius &c. Porro non aliam esse ignis naturam quam antea diximus ex primo experimento colligitur: neque enim incallescendo corpora expandi possunt, nisi eum motum habeant partium minimarum, quo partes a se recedant, confusum scilicet, ac perturbatum. Deinde igne corpora fluida ebulliunt, effervescent, in vapores abeunt: solida vero franguntur, fundunturque, in calcem, fumum, & pulverem convertuntur. Denique in fluidis calefcentibus motus ipse

ipse exhibetur oculis: qui enim fluidis injiciuntur pulveres tenuissimi cernuntur versus quamcumque partem perturbatissime agitari.

COROLLARIUM PRIMUM.

Inde primo colligitur motum illum, quo ignis, calorque habetur, nec circularem, nec vorticosum esse, nec fluidorum omnium particulas circulari, & vorticoso motu abripi, ut Lozeranus censuerat in dissertatione quæ eodem anno ab eadem Academia præmium obtinuit: neque enim ullam motus hujus speciem præferunt qui ebullienti aquæ injiciuntur pulveres. Porro quod ait Lozeranus in minoribus tormentis laxata rota non nisi circularem motum imprimi falsum est: cum rectilineus dumtaxat motus a corpore in gyrum acto aliis corporibus secundum tangentem orbitæ imprimatur, & in tormenti relaxatione ex diverso ferri, & chalybis loco, contactu, affricu irregulares alii motus oriantur, quo particulae agitantur undique, & lucent. Falsum est etiam quod si irregularis undique sit motus ignis, qui in crassiore materia, & aëre ardet, disperdi illico, & dissipari penitus debeat.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Colligitur etiam quod licet sal, sulphur, volatiles omnes, elasticaque particulae concipiendo ignis motui in primis idoneæ sint, & licet aër excitando, conservandoque igni conducatur maxime, omnia tamen cujuscumque indolis corpora motu celerrimo, perturbatissimoque minimarum partium concepto in ignem abire possunt, nec necessario ignis substantia est mixtum aliquod ex æthere, aëre, sulphure, & salibus volatilibus, quorum minimæ partes solutæ sint, invicem mixtæ, & ab aliis substantiis hetherogencis separatæ. Ex quo enim in mixtionibus quibusdam ex limatura ferri, ex sulphure, ex spiritu nitri, aliisque hujusmodi, quibus artificialis ignis parari solet, singillatim illa principia exhibeantur, minime in-

inferre poterat Lozeranus hanc generalem esse ignis naturam, & id ubique, ac semper habere locum in metallis etiam, lapidibusque ignescentibus, in Solaribus radiis speculo ustorio collectis, in flammis aliis ex sublimato sulphure, & salibus volatilibus coalitæ, quæ in vacuo etiam Boyliano conservantur.

PROPOSITIO SECUNDA.

Motus, quo habetur ignis, in productione ignis totus, & integer non producitur.

Leges enim omnes Dynamicæ in collisione corporum elasticoꝝ, durorum, mollium nullum excitari motum permittunt sine aliquo motus, quo gignitur, detrimento, & motum ad infinitum multiplicari, & augeri vetant. In productione, & communicatione ignis res secus est: cum ex unica candelæ flamma adhuc superstitæ centum, & mille aliæ consimiles in motum agi, magnumque incendium parva scintilla excitari possit. Quod Eulerus excogitaverat in alia dissertatione, quæ ab eadem Academia præmium obtinuit, bullulas quasdam materia ignea repletas corporibus omnibus admisceri, & nullo negotio in communicatione ignis disrumpi, & ignem abditum explicare, atque effundere, præterquam quod arbitrariæ hypotheseos speciem præfert, minus etiam nodo solvendo idoneum est. Nam quæ in bullulis latent igneæ particulæ, aut vehementissimum motum, celerrimumque suapte natura conceptum habent, & bullulas omnes disrumpent, quæ ex parte concava minore vi quam ex convexa, ut disrumpantur, opus habere debent, & nullo etiam igne admotus ignis undique excitabitur: aut motum celerrimum concipiunt igneæ particulæ disruptis primum bullulis, & eadem redibit quæstio unde tantum concepti motus incrementum profisciscatur. Nihil etiam in phænomena explicando proficitur si dicatur, quod jam olim Becherus existimaverat, & nuper etiam in alia dissertatione a Parisiensi Academia præmio condecorata Comes Creguy, & alii authores alibi proposuerunt, materiam igneam ubique diffusam esse, & mensui

strui partes agere, & ignis productionem nihil esse aliud quam corporum inflammabilium fermentationem. Cum enim corpora in menstribus posita fermentari illico incipiant, cur non omnia corpora in ignem simul, flammamque abeunt si menstruum igneum ubique diffusum est, atque ignis communicatio ad classem fermentationum reducitur? Id statim aliam corporum ignescentium, & aliam fermentationum classem constituet. Quod si dicatur sal utique in aqua positum cito solvi, inflammabilia autem corpora præparari aliquo modo, & aptari oportere ut in menstruo, ubi jacent, effervescent, quærendum crit quomodo aptari, & præparari possint. Plane texturam eorum corporum solvendo, dissociando a se invicem particulas, impellendo, agitandoque, quod ad habendum novum ignem semper requiritur, & quod nec sine motu, nec nisi motu ignis alterius fieri potest. Ita vero non resolvitur questio, sed ad terminos alios prorsus consimiles reducitur. Quare cum ignis substantia vehementer undique, perturbateque agitetur ut in *Prop.* 1. dictum est, cum in communicatione ignis augeatur motus idem fere in immensum sine ullo aliorum motuum detrimento, quod familiaria indicant phænomena, cum tanta hæc motuum multiplicatio adversetur legibus omnibus Mechanicis, concludendum est plane novo igne excitato non excitari novum motum, & motum quo habetur ignis; in ignis productione totum, & integrum non produci.

COROLLARIUM.

Quia igitur dum flamma admota aliquod corpus in flammam pariter, & ignem abit, non quidem a flamma ad flammam motus transit, nec novus motus est, qui communicatione ignis producat, jam ante communicationem haberi debet motus ipse: & quia motus sine moto corpore esse non potest, aliquod jam debet esse corpus perturbatissimo, celerrimoque motu illo præditum, quod aliis postmodum corporibus in ignem, flammamque abeuntibus se prodatur. Secus si hujusmodi corpus, & perturbatissimus motus corporis

ris non ante communicationem cujuscumque ignis extaret, ignis communicatio esset novi motus productio, quod legibus motus omnibus, & phænomenis ignis adversatur.

PROPOSITIO TERTIA.

Datis hisce omnibus dico per omnia mundi spatia ætherem undique effusum esse.

Quemadmodum ex præcipuis phænomenis ignis sequitur novo igne excitato non produci novum motum, ita ex quo in communicatione ignis novus motus non producat, consequitur manifestissime aliquod jam esse corpus eo minimarum partium motu præditum, quæ alia in flammam, ignemque abeuntia corpora participant, ut in superiore Corollario dictum est. Porro hoc corpus non nisi fluidum rarissimum, ac subtilissimum sit oportet, ut alia etiam densiora corpora secundum dimensiones omnes pervadat, & ut nulla ratione prohiberi possit ne penetret vasa quæcumque clausa, & ignem præbeat. Fluidum autem hujusmodi *def. 1.* ætherem appellavimus. Jam vero momentum maximum, quantitatemque intestini motus hic æther habere debet, ut accedentibus minimis partibus cujuspiam corporis eam vim, actionemque adipiscatur, qua ebullire vehementer fluida, & metalla solvi deprehendimus, & moleculas quasvis firmiores seungi ad invicem, & ne ad mutuos contactus redeant, impediri. Denique loca omnia, in quibus habetur ignis, sive omnia terrestria spatia permeare debet hoc fluidum: aut, quia circa terram contineri amplius non posset tanta cum vi, & intestino motu, nisi alterius fluidi æquilibrio coerceretur, & hoc alterius rursus, & successive, per omnia Mundi spatia undique effundi debet.

COROLLARIUM PRIMUM.

Cum data quælibet ætheris portio tam magnam intestini motus quantitatem præferat, non nisi æquilibrio ætheris circumpositi sub dato spatio continebitur, sublatoque ipso

X

æqui-

æquilibrio effundet sese undique, ac explicabit. Pariter si exteriorem aliquam ob causam redigatur ad minus spatium, comprimaturque tanto majorem sese expandendi aquiret vim: hoc est ratione intestini motus maxime elasticus debet esse æther, & vim elasticam præferre spatio, quod occupat, reciproce proportionalem.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Cum insuper sit rarissimum, ac subtilissimum, ut poros omnium vasorum permeet, a quibus excluduntur spiritus chemici, & aer, nullam sensibilem resistantiam corporibus cælestibus objiciet, neque in æthereo medio cursum suum Planetæ prosequendo magis retardari poterunt, quam ob lucem undique effusam retardentur. Ex analogia etiam aliorum corporum gravitas ætheris posset colligi. Sed hisce, & similibus quæstionibus, quæ experimento definiri nequeunt, neque ipsa ætheris natura dirimi, minime diutius vacandum est.

PROPOSITIO QUARTA.

Iisdem positis explicare communicationem ignis.

Æther cum intestino motu vehementer præditus, undique effusus, ac subtilissimus, rarissimusque sit, naturaliter libi relictus crassiores alias, innatantesque aliorum corporum particulas debet comprimere si sibi invicem contiguæ sint, si poros intermedios habeant transcurrere, nec nisi ratos quosdam effectus præstare, minus cum cæteris nexa ramenta abraderè, effluvia in gyrum spargere, constantem motus, & caloris gradum in corporibus omnibus fervare. Sicuti vero injecta ebullienti aquæ corpuscula perturbatissimum aquæ motum versus quamcumque partem videntur sequi, licet aqueis particulis densiora sint, & sublata ebullitione ad fundum decendant; sic omnia corpora percussione, frictione, aut alia simili ratione aliqua in minores partes soluta abducentur cito citius ab æthere, & unum simul agitatissimum fluidum component: cumque apertos aliorum corporum poros

ROS

ros pervadere, & libere moveri nequeant, impellent undique, ac vim facient, flammamque, & ignem exhibebunt. Ita non aliud erit ignis quam aggregatum ex æthere subtilissimo, & crassioribus aliis aliorum corporum particulis intestinum ætheris motum aliquo modo participantibus: & idem erit excitare ignem, ac corpus in eas minimas partes resolvere, quæ motum ætheris participant, & huc, atque illuc agitentur. Hoc ipso ignis communicatio intelligitur: cum jam solutæ unius corporis particulæ impetu, ac mole sua texturam aliorum corporum laxare possint, & in similes partes resolvere, nisi fibrarum convolutus plexus, quem in amianto, & quibusdam fluidis deprehendimus, impediât. Ab illis vero ad has partes transeunte motu, effusioque, ac multiplicato igne, nullum prioris ignis detrimentum sensibile haberi poterit. Quia enim motus æqualitatem in locis singulis æther ita tueri debet, ut neque illic deficiat, neque hic redundet, idem erit earumdem minimarum partium impetus, ac vis, sive seorsim agitari pergant, sive alias quotcumque partes a corporibus aliis abradant, & circumfuso ætheri agitandas similiter relinquant. Ignis ergo excitabitur sine ullo alterius ignis, quo gignitur, detrimento.

COROLLARIUM PRIMUM.

Si particulæ hujusmodi eodem ætheris motu abreptæ alicubi permaneant, prohibeaturque ne disperdantur, permanebit ignis. Id Atmosphæra Solaris in Sole præstat, in ignibus nostris aer, & ea etiam rarefacti aeris portio, quæ in vacuo semper Boyliano superest. Si disperdantur undique particulæ, neque aliquo pabulo aliunde reficiantur quæ avolant, & deficiunt, nullos amplius sensibiles effectus alicubi edere poterunt. En ignis conservationem, extinctionemque.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Ignis intensitas proportionalis erit quantitati motus particularum motui ætheris obsequentium, & data etiam minore

X 2

ea-

earumdem velocitate, aucto dumtaxat numero, & densitate augeri poterit. Ideo qui in solidiore materia ardet ignis intensior est, & ferrum nondum candens, & ignitioni proxime accedens eum jam minimarum partium impetum, ac vim habet, ut tactum ossa usque possit comburere, & sibilum comburendo excitare. Contra quæ ex spiritu vini accenditur flamma, & ignes fatui vix ullum sensibilem calorem exhibent.

PROPOSITIO QUINTA.

Explicare propagationem, & naturam lucis.

Positis omnibus, quæ antea statuta sunt fieri poterit ut jam solutæ alicujus corporis, & ab æthere abreptæ particulæ mutuis incursum in se invicem, reflexionibusque, aut crassioris medii, quo ambiuntur, vi, & reactione, aut immixtione aliarum particularum, velocitatem magis magisque auctam habeant, & ipsis ætheris particulis velociore sint. Hoc dato ætherem circumpositum impellere, & in motum agere debent. Jam vero æthereum medium juxta *Cor. 1. Prop. 4.* maxime elasticum est, atque insuper per *Prop. 43. lib. 2. Princip. Mathem.* Newtoni corpus quodcumque tremulum in medio elastico undique motum tremulum in directum propagare debet, quo medii propiores partes comprimantur, relaxenturque, & se expandendo alias propiores comprimant, & hæc alias, atque alias rursus quoadusque omnes condensentur, ac rarefiant, & eant, ac redeant alternis vicibus. Rursus tantum illud augmentum velocitatis in minimis partibus lucidorum corporum deprehenditur: nam quæ ignita sunt corpora, & non lucida aucto intestino motu lucem effundunt, quæ vero lucent aucto adhuc motu effundunt clariorem lucem, vividiorumque. Itaque qua ratione ex tremitu sonori corporis concisæ, & reciprocae vibrationes excitari solent in aëre, quæ ad aurem usque sonorum sensationem deferant, eadem minimæ lucidorum corporum particulæ filamenta ætheris circumquaque in directum jacentia compriment, & hæc sese expandendo, restituendoque impel-

pellent alia, atque alia rursus, & motum tremulum, ac vibratorium excitabunt, quo ad oculos usque nostros, & nervos opticos delato impressiones illæ, sensationesque exoriantur, quas lucis, & coloris appellamus.

• COROLLARIUM PRIMUM.

Quia vero quælibet data, & sensibilis lucidi corporis portio ex corpusculis aliis componitur versus quamcumque plagam velocissime abreptis, & agitat, singula ad plagas suorum motuum directionibus obversas vibratorium motum traudent, & ad loca quælibet portioni eidem in directum jacentia filamentum, & radius aliquis lucis transibit. Quare sicuti undique in gyrum excitatus sonus percipitur, ita corpus quodcumque lucidum, aut pars corporis ex omnibus iis locis videri poterit, quæ parti ipsi in directum obversa sunt. Mox ostendemus non nisi ex iisdem locis per rectam lineam corpus lucidum videri posse.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Nec qui ex diversis plagis radii lucidi advenient subtilissimi, tenuissimique confundent sese invicem, impediuntque quo minus singuli corporum, a quibus effunduntur, speciem, & imaginem referant. Exemplum in crassiore aëre habemus, in quo radii sonori a diversis sonoris corporibus effusi minime sese impediunt, quo minus proprium motum singuli, & omnes simul varios distinctos sonos ad aurem deferant.

COROLLARIUM TERTIUM.

Sicuti etiam quæ ad majores vibrationes concipiendas comparata sunt corpora intensiores sonos edunt, ita quæ velociores sunt lucidorum corporum particulae, majoresque vibrationes in circumfuso æthere excitare possunt, eæ quoque clariorem lucem, & vividiorum exhibebunt, & omnis lucis intensitas pendebit ex numero vibrantium filamentorum, &
mo-

tus vibratorii celeritate. Inde ad normam *Cor. 2. Prop. 4.* explicabitur quod Boerhavio paradoxum videbatur, ignem sine luce, & sine igne lucem haberi posse.

PROPOSITIO SEXTA.

Æther spectari poterit veluti fluidum ex aliis fluidis heterogeneis coalitum.

Pulsus omnes in eodem elastico medio excitatos isochronos esse oportere constat ex *Prop. 48. lib. 2. Princ. Mathem. Newtoni.* Ex secundo etiam, & tertio experimento constat in aëre septem muscos tonos, septemque in æthere coloratos lucis radiolos diversa celeritate propagari, ut rubei tardiores sint, violacei maxime omnium celeres, refrangibilesque, ac reflexibiles. Itaque si ulterius ex soni, & lucis analogia liceret progredi, qua ratione Cl. Mairanus aërem nostrum ex septem fluidis heterogeneis componi dixit, eadem ostendi posset ætherem quoque ex septem diversis fluidis coalescere, quæ cum in æquilibrio sint undique, & elasticitate differre nequeant, differant densitate inter se. Quia vero, data elasticitate vibrantis medii, pulsuum celeritas est in ratione subduplicata densitatis reciproce, rariores omnium erunt particulae, quæ majoris refrangibilitatis, & reflexibilitatis radios, celerioresque vibrationes referent: scilicet minus densæ erunt particulae, a quibus imprimetur sensus coloris violacei, quam quæ colorem indicum præferent, & coloris indicii particulae præ cæruleis adhuc rariores erunt, atque ita cum proportionem usque ad densiores coloris rubei particulas. Hæ cum excessu suæ densitatis, & magnitudinis compensent satis defectum vibratoriae celeritatis, neque ita libere possint vacua interstitiola corporum permeare, copiosius retinam oculi, ac fortius ferient, quam aliæ coloris indicii, aut violacei particulae: quod experientiae pariter est consonum, & quo etiam colorum natura, & indoles intelligitur.

COROLLARIUM.

Ita rursus cum luce sonus & cum æthere aër conveniet.
Dis-

Dissentiet tamen qua parte fluidi maxime elastici, & subtilissimi vibrationes a vibrationibus densioris medii dissentire necesse est. Aër crassior non nisi pluribus sibi succedentibus ictibus sensibiles vibrationes potest concipere, ut in corollario lemmatis dictum est, & pluribus sonoris corporibus opus habet ad plures diversos tonos exhibendos. Contra uno ictu puncti alicujus lucidi singulæ ætheris subtilissimi, & maxime elastici particulæ vibrationes suæ densitatis proprias concipient, continuatisque puncti tremoribus, quamvis non omnis motus transeat in omnes hetherogeneas ætheris particulas, aliquis tamen semper transibit, & primigenii lucis colores quocumque ex loco lucidi corporis semper habebuntur.

PROPOSITIO SEPTIMA.

Lux in eodem medio per lineam rectam diffundi debet.

Hoc aliud soni, & lucis discrimen erit, quod cum sonus obliquo, & curvilineo quocumque tramite propagetur, lux diffundatur solum per lineam rectam. Dum enim vibrationibus sonori corporis crassiores aëris particulæ per totam longitudinem sonoræ fibræ comprimuntur, dilatantur eodem tempore in latum, sonumque effundunt secundum lineas quascumque rectas, & obliquas. At particulæ æthereæ aut nullam prorsus, aut eo minorem compressionem singulæ pati debent, quo aëris particulis sunt tenuiores, nimirum infinite parvam, atque insensibilem. Sit filamentum ætheris *AH*, *fig. 22.*, cujus stratum unum *AB* lucidæ particulæ impulsu in locum *ab* transferatur, atque ætherem ad *CD* usque comprimatur, ut quod antea in spatio *ACDB* & *AMNB* erat ad *aCdb*, & *amnb* reducat. Quia in tota hac translatione secundum longitudinem propius sibi invicem accedunt strata, & secundum latitudinem *AB*, *ab*, *MN*, *mn* eadem manent, secundum solam longitudinem dilatarı poterunt, & vibrationes, lucemque inde ortam in longum semper per lineam rectam propagare.

Co-

COROLLARIUM PRIMUM.

Radii a puncto quocumque lucido juxta *Coroll. 1. Prop. 5.* in gyrum undique effusi cum per lineas dumtaxat rectas moveri pergant, in diversis distantis effundentur per similes superficies sphaericas, & erunt densitate superficiebus ipsis proportionales. Sunt vero superficies reciproce ut semidiametrorum, sive distantiarum quadrata. Itaque intensitas lucis ex puncto quocumque effusæ erit reciproce in ratione duplicata distantiarum.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Si lucidi corporis semidiameter præ distantia possit negligi, & totum lucidum ad instar puncti considerari, tota lux erit reciproce ut quadratum distantia. Ideo si in dato a candela accensa intervallo scriptura aliqua legi adhuc possit, in dupla distantia non distinguetur nisi tribus luminibus priori additis, nec nisi quinque aliis additis in tripla distantia &c. quod indicat in distantia 1, 2, 3 &c. intensitatem ejusdem luminis esse 1, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{9}$ &c. Non una tamen omnium distantiarum lex erit, ut mox videbimus.

PROPOSITIO OCTAVA.

Data semidiametro sphaeræ lucidæ, & quolibet extra ipsam loco determinare lucis intensitatem.

Locus datus sit *D*, *fig. 23.*, semidiameter sphaeræ lucidæ *HG*, *Cc* elementum peripheriæ plano per locum datum, & sphaeræ centrum transeunte sectæ. Quia per *Cor. 1. Prop. 5.* a puncto quolibet lucidi corporis ad loca alia in directum jacentia radius aliquis lucis traducitur, & per *Cor. 1. Prop. 7.* intensitas lucis a puncto quocumque effusæ decrescit in ratione duplicata auctarum distantiarum, erit in loco *D* inten-

intensitas lucis ex Cc effusæ ut $\frac{Cc}{CD^2}$, & lux zonæ circularis,

quæ ipsius Cc revolutione gignitur, ut $\frac{FC \cdot Cc}{CD^2}$, sive ut

$\frac{HC \cdot Ff}{CD^2}$. Est vero $CD^2 = FD^2 + FC^2 = GD^2 + 2GD \cdot$

$GF + GF^2 + 2GH \cdot GF - GF^2 = GD^2 + 2HD \cdot GF$.

Erit itaque lux indeterminatæ superficiei ut summa omnium

$\frac{HC \cdot Ff}{GD^2 + 2HD \cdot GF}$, sive ut $\frac{HC}{2HD} \cdot l. (GD^2 + 2HD \cdot GF)$

$- \frac{HC}{2HD} \cdot l. CD^2$; quia scilicet evanescente FG lux etiam

evanescit. Quod si DC statuatur tangens fiet $HF : HC =$

$HC : HD$, & dividendo $FG : HC = GD : HD$, & pro-

ducat $GD^2 + 2HD \cdot GF = GD^2 + 2HC \cdot GD = HD^2 -$

HG^2 , & tota lux evadet ut $\frac{HC}{2HD} \cdot l. \left(\frac{HD^2 - HG^2}{GD^2} \right) =$

$\frac{HC}{2HD} \cdot l. \left(\frac{AG \cdot GD + GD^2}{GD^2} \right) = \frac{HC}{2HD} \cdot l. \left(\frac{AD}{GD} \right)$. Q. E. I.

COROLLARIUM.

Si fiat $HC = r$, $HD = x$, $l. (x + r) = lx + \frac{r}{x} - \frac{r^2}{2x^2} + \frac{r^3}{3x^3}$

$- \frac{r^4}{4x^4}$ &c., $l. (x - r) = lx - \frac{r}{x} - \frac{r^2}{2x^2} - \frac{r^3}{3x^3} - \frac{r^4}{4x^4}$ &c. erit

tota lux ut $\frac{r^2}{x^2} + \frac{r^4}{3x^4} + \frac{r^6}{5x^6}$ &c., adeoque non nisi in maximis

distantiis censeretur poterit quadratis distantiarum reciproce pro-

portionalis. Eadem erit caloris lex: quoniam puncta omnia,

quæ loco dato in directum non obiacent, nihil ibi ad augen-

dum calorem conferunt.

PROPOSITIO NONA.

Si lux in aliquod corpus motui suo resistens incidat ita refle-

cti debet, ut angulus reflexionis æqualis sit angulo incidentiæ;

Y

Esto

Esto $ABCD$, *fig. 24.*, pulsus ætheris jam compressi, & ex parte DC ad EF usque expandere sese nitentis. Objectu plani ML , quod motui ætheris resistat, sistetur penitus punctum D , puncta vero alia eo majus spatium percurrent, quo a puncto D , & a resistente plano magis distabunt. Cum igitur compressa omnia ætheris strata, ut dictum est, per lineas perpendiculares nitantur semper se expandere, stratum DC sectorem circulem DCC describet, & usque ad Dc perveniet. Hoc ipso æther omnis DCH ad spatium DcH reducetur, & quodcumque ætheris stratum DO comprimitur primo, tum dilatabitur. Exhibeat recta NO , *fig. 25.*, vim omnem, qua secundum longitudinem BC stratum DO ex strati alterius DC motu impulsus est, atque ea in duos oO , No resolvatur, quarum sola posterior No eidem strato perpendiculis in compressione impenditur, & cui deinde relaxatione habita vis alia aequalis oritur. Ducatur etiam planum POQ plano ML parallelum, & ex N in POQ demittatur perpendiculum Nn . In toto ætheris strato DO binæ expansionis vires erunt Oo , & No , seu tres Nm , mo , & Oo . Jam vero una Nm æquivaleret duabus Nn , nm , & duæ mo , Oo æquivalent uni mo . Si fiat igitur $Or = On$, $rR = nN$, pars O prosequetur motum suum per lineam rectam OR , & angulum reflexionis ROr æqualem constituet angulo NOn . Quod cum de strato integro, ac singulis stratis valeat, eadem lege expandentur, reflectenturque omnia, ut in alium ætherem impigendo, vibrationesque alias excitando filamentum lucis $VTHX$ gignant plano HL æqualiter inclinatum.

COROLLARIUM PRIMUM.

Ad regularem luminis reflexionem perinde erit quod reflectens planum MN , *fig. 26.*, perfecte lævigatum sit, aut non: quippe æther in minimis superficiei inæqualitatibus B , & b contentus, ac clausus undique propagationi radii AB æque resistet, ac aliud quodlibet solidum punctum D . Hæc causa est, propterquam regulari lucis reflexione a metallicis,

&c

& vitreis speculis objectorum imagines habentur: nam licet vitrum arena, aut stanno usto, aut pulveribus aliis expolitum inæqualitates aliquas semper fritione contrahat, quibus fit ut particulæ omnes nec plane læves, nec eodem spectantes sint, nec æquabilem superficiem componant; ob parvitatem tamen inæqualitatum, atque ætherem intus clausum, lucem eodem ordine debet reflectere, ac si æquabiliter undique lævigatum esset.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Cum meatuum dissimilitudo, & intimæ constructionis diversitas in mediis densitate magis differentibus sit major, in confiniis duorum mediorum pro majore densitatis diversitate fortior erit reflexio: & cum lux ex vitro in aërem transiens interruptos magis meatus, per quos transire debet, inveniat, quam in transitu ex vitro in aquam, fortior in primo casu quam in secundo erit reflexio, & in transitu ex vitro in vitrum, ubi vitra sese contingunt erit nulla.

COROLLARIUM TERTIUM.

Servantur ergo juxta nostra principia regularium reflexionum, reflexionumque aliarum leges, quæ per diversa media transeundo habentur, ex quibus *Lib. 2. Opt. Par. 3. Prop. 8.* collegerat Newtonus reflexionem lucis non ab impactu in partes solidas, sed a vi quadam pendere per superficiem reflectentem æquabiliter diffusa, & radios lucis a contactu prohibente. Quod adjecerat lucem transeuntem ex vitro in aërem sub angulo 40° majore transmitti maxima ex parte, reflecti vero si incidat sub minore angulo, denotat tantum posteriore inclinatione illabentem lucem nullos amplius meatus, quos sensibili copia permeet, invenire. Quod denique tenuissimæ corporum lamellæ unius coloris radios reflectant transmissis aliis intelligetur facile ubi quædam circa facilioris transmissionis, ac reflexionis vices statuta erunt.

PROPOSITIO DECIMA.

Lux de uno in aliud medium diversæ densitatis transeundo ita refrangi debet, ut angulus incidentiæ ad angulum refractionis constantem rationem habeat.

In superficiem PQ , *fig. 27.* quæ duo media diversæ densitatis dividit, incidat radius $ABDC$, & transeat a medio rariore in densius. Obliqua radii incidentia punctum C ad superficiem eandem citius perveniet, & in densiore medio progredietur interim dum alia strati CD puncta in rariore medio adhuc moveri pergent. Celerius autem punctum D in rariore medio esse debet, & medium densius majore interstitiorum angustia, & scabritie laterum vibrationibus oclusi ætheris majora impedimenta, & resistentias debet obijcere. Interim ergo dum punctum C spatium Ca in densiore medio percurret, *fig. 28.*, punctum D majus spatium Db percurret in medio rariore, atque ita particulæ omnes CD in locum ab priori non parallelum transferentur: Inde moveri adhuc, & dilatari pergent secundum lineas lineæ ab perpendiculares, ut antea dictum est, atque ita quidem ut spatium bn a puncto b percursum semper sit majus spatio am . Itaque eadem particulæ ex ab in mn , ex mn in cd transferentur, ut lineæ CD , cd productæ simul concurrant in puncto L , & anguli omnes C , a , m &c. recti sint, sive ut Dd , & Cc sint duo arcus circulares similes, & centro L descripti: atque ita ex nostris principiis consequetur quod pro explicanda refractionis causa statuerant Isaac Barowius, Millietius, & Maignanus, nec tamen demonstraverant, ut notat Cl. Aembertius *num. 366. de fluidis.* Hoc autem posito si strato ætheris cd in densiore medio ducantur perpendicularia dH , cF , *fig. 27.*, vibratio omnis transcurreret per spatium $dHFc$. Ducantur rectæ dM , cN superficiem PQ normales. Quia angulus BdM cum angulo DdC efficit unum rectum, & ob rectum angulum D unum rectum pariter efficit angulus Dcd cum angulo DdC , erit angulus Dcd angulo incidentiæ BdM æqualis. Similiter ob rectum angulum

ce-

c erit angulus $c d C$ æqualis angulo refractionis $F c N$: atque ob rectos insuper angulos C , & d , erit angulus $D C d$ ad angulum $c d C$ ut $D d$: $C c$, sive erunt anguli incidentiæ, refractionisque inter se ut spatia eodem tempore in rariore, & densiore medio absoluta, aut demum, quod eodem recidit, ut facilitates, quibus in mediis singulis propagantur luminis vibrationes, & quæ data mediorum densitate datæ, & constantes esse debent.

COROLLARIUM PRIMUM.

Major facilitas pulsuum, & vibrationum ætheris propagandarum non ex minore tantum densitate medii oriri debet, ut senserat Maignanus: neque semper quo rariora sunt corpora minus lucem debent refringere. Aër noster, qui 3500 partibus rarior est pseudo-topazio, & 4400 rarior vitro antimonii, & 2000 rarior Selenite, vitro communi, & chrystallo montana, tanto densitatis discrimine vim refringentem proxime æqualem habet. Vide tabulam refractionum a Newtono exhibitam *Lib. 2. Opticæ Par. 3. Prop. 10.* Orietur eadem facilitas, ut dictum est, ex meatuum amplitudine, & lævigatione laterum meatus ipsos, atque intus vibrantem ætherem circumscribentium: difficultas vero ex meatuum angustia, & laterum asperitate, & scabritie.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Quoniam autem tot modis materiæ particulæ disponi sub dato spatio, & inter se combinari possunt, asperitas laterum, & meatuum rectilineorum, per quos vibrationes ætheris transcurrunt, eadem esse poterit in corporibus densitate etiam differentibus, atque alia plane in corporibus æque densis. Hæc generatim omnia dicta sint, ut pateat nihil jam memoratam Newtoni tabulam objicere, quod principiis superioribus adversetur. Singillatim omnia determinari, & decerni possent si in quocumque corpore singillatim peculiaris meatuum constitutio innotesceret.

PRO-

PROPOSITIO UNDECIMA.

Radius lucis prope aliquod corpus transiens ad corpus ipsum inflecti debet.

Ut enim experimento compertum est, corpora omnia suam habent Atmosphæram, ex effusis undique esluviis conflatam, densioremque qua parte ipsis corporibus est propior. Hoc posito sit opacum corpus *MC*, *fig. 29.*, & radius luminis *AabB*. Is plane cum ex *b* difficilius, quam ex *B* propagari possit, inflectetur versus corpus *MC*, & per semitam *Bb dD* feretur. Hoc est quod diu a se observatum scripsit Newtonus *Lib. 3. Opticæ Observ. 5.*, & sequentibus. Nam cum in cubiculum tenebricosum, per foramen quarta uncie parte latum, tenuissimum Solis radium intromisisset, effecissetque ut per duos cultros transiret, quorum binæ acies proximæ, sibi obversæ, & parallelæ essent, deprehendit radium ad cultrorum latera inflecti, atque ita fimbrias coloratas exhibere, ut data acierum distantia $\frac{1}{400}$ uncie partis radius per acies illas transmissus disperteret se medium in binas partes, umbramque partibus interjacentem relinqueret, & cultris propius admotis umbra latior evaderet, & memoratæ radiationes contraherent sese, donec cultris se contingentibus lumen totum in umbram penitus desineret. Similia circa inflexionem luminis uno tantum cultro adhibito invenit, & duobus cultris assumptis, quorum acies inter se minime parallelæ essent. Omnia ex iisdem principiis pendent.

COROLLARIUM.

Si etiam Atmosphæræ uniuscujusque constitutio innotesceret, peculiare casus omnes definiri possent. Fieri potest ex. gr. ut alicujus corporis Atmosphæra unum aut alterum coloratum lucis radiolum facilius transmittat reflexis aliis: atque ita fimbriæ inflexione exhibitæ unum, aut alterum colorem referent. Fieri etiam potest ut radioli omnes prope opa-

opacum corpus summa cum obliquitate in densiora Atmosphæræ strata impingentes reflectantur: atque ita licet qui ad distantiam paulo majorem transeunt suam inflexionem fubeant, poterit umbra opaci corporis videri latior, & totum id, quod umbræ corporis inflexione demitur, eo compensari, ac refici, quod reflexionibus aliis lucis adjicitur. Id in capillis quibusdam deprehendit Grimaldus, & Newtonus in aliis corporibus compertum habuit, metallis, vitris, lapidibus, lignis, glaciæ, cornu &c., a quibus omnibus inflexa lux reccedere videtur.

PROPOSITIO DUODECIMA.

Radius lucis in transitu per medium quodlibet dispositionem quamdam nancisci debet, qua per æqualia intervalla alternis vicibus transmittatur facilius, & facilius reflectatur.

Ut idem etiam ex nostris principiis colligatur, observandum est lucem in eodem medio homogeneo, atque asperis meatuum rectilineorum, per quos transit, lateribus plures particulas motui suo obsistentes invenire. Ita si medium in plura strata, & superficies parallellas dividatur, non ab extrema, & prima tantum, sed a secunda etiam, & tertia, & aliis omnibus aliquo modo lumen reflecti debet. Ut igitur videatur quæ superficies intermediæ debeant fortius lumen reflectere, aut transmittere, esto radius luminis TO , *fig. 30.* a superficie PQ ad RS in medio quocumque transiens, & inde genitus quod ex spatio AD æther ad spatium BD reducat, & dilatetur postmodum utrimque, & ex parte D feratur ad E usque, & rursus compresso æthere DG in spatium EG particula G in H transcat, & successive. Erunt in singulis his vibrationibus centra immobilia T, C, F &c., & particulae A, D, G per spatia AB, DE, GH excurrent, & maxima vibrationis velocitas habebitur in punctis intermediis a, c, e &c. Itaque si latus omne TO tali ratione intelligatur dispositum ut partem luminis incidentis aliquam reflectat, transmittat aliquam, reflexio maxima, & transmissio minima habebitur ubi erit maxima vibrantium particularum æthe-

ris celeritas, nimirum in punctis a, c, e &c., & contra habebitur minima reflexio, & transmissio maxima in T, C, F &c.: & quoniam est $Ta = aC = Cc = cF$ &c., si Ta sumatur pro unitate, transmittetur radius validissime in crassitudinibus 0, 2, 4, 6 &c. & in crassitudinibus 1, 3, 5, 7 &c. validissime reflectetur: atque ita, ut fert *Prop. 12. Par. 3. Lib. 2. Opticæ*, *omnis radius luminis in transmissu suo per quamlibet superficiem refringentem, nanciscetur constitutionem quamdam, seu dispositionem transitoriam, quæ in radii progressu equalibus revertetur intervallis, efficietque ut is in singulis dispositionis istius accessibus, transmittatur facilius per superficiem refringentem proxime deinceps objectam; in singulis autem ejusdem intermissibus, sive intervallis, reflectatur facilius ab ejusmodi superficie.*

COROLLARIUM.

Data inclinatione radii, & distantia duarum superficierum eundem radium transmittentium, aut reflectentium definiri poterit longitudo æthereæ fibræ TC . In libero aëre radiis ad perpendicularum incidentibus juxta Newtoni experimenta assumi poterit $\frac{2}{178000}$ uncia, atque erit ad longitudinem fibræ similis, & similiter in aquæ meatibus excitatæ ut 4 : 3, ad longitudinem vero fibræ excitatæ in vitri meatibus, quod aqua est densius ut 31 : 20. Aliquod tamen inter fibras versicolores discrimen haberi debet, & fieri potest ut ibi initium sit fibræ viridis ex. gr. ubi violaceæ medium est, atque ut viridis color fortissime ab ea superficie resiliat, per quam transmittitur maxime color violaceus &c.

SCHOLIUM.

Quod si jam demum hanc nostram propagationis lucis hypotheseum cum alijs conferre licet, omnium fortasse verisimilior videri poterit. Qui cum Cartesio simplici pressione substantiæ æthereæ lucem haberi volunt, manifesti erroris redar-

darguuntur ex successiva lucis propagatione, quæ in hypothesi medii pleni, & compressi instantanea esse oporteret, & ex maximo lucis calore, qui sola pressione, & sine motu percipi nequit. Qui cum Malebranchio ad atheræ substantiæ undulationes quasdam confugiunt, cum in primis scopulum offendunt, quod undarum motus in medio non elastico locum dumtaxat habeat, & non per lineam rectam dumtaxat, sed per semitas quascumque curvas, & obliquas propagetur. Qui denique cum Gassendo statuunt haberi lucem perenni effluvio corpusculorum tenuissimorum, ut suam hypotheseos cum colorum theoria, & phænomenis concilient, statuere debent lucidum corpus ex septem diversi generis particulis coalescere, tali dose inter se mixtis, distributisque, ut nunquam aliquis emergat radius, qui sex dumtaxat, aut quinque colores præbeat, rubris ex. gr. aut viridibus evanescentibus: aut qui diversam coloris alicujus quantitatem ferat, auctam ex. gr. cærulei coloris copiam: aut qui plures radiolos quam septem, & novam coloris speciem aliquando præbeat. Insuper lucida omnia, & cælestia, & terrestria inter se motu, densitate, intensione quam dissimillima ex iisdem septem particularum generibus eadem proportionem inter se mixtis composita fateri debent, ut idem corpus, quod luce solari viride, alia luce cæruleum non videatur. Denique omnia corpora inflammabilia, quæcumque sint, solida, & fluida, dura, & mollia, densa, & rara eodem modo coalita debent dicere, ut omnia quando in iguem, flammamque abeunt data, & invariabilia colorum phænomena exhibeant. Juxta nostram hypotheseos facilius natura lucis, & omnium colorum genesis intelligitur, ætherem solum ex pluribus heterogeneis fluidis coalitum statuendo, sicuti ex fluidis heterogeneis coalescere aerem compertum est. Ad alia vero lucis phænomena quod pertinet, Chrystalli Islandicæ refractiones cæ sunt, quarum sicuti in nostra, ita in quacumque alia hypothese nulla ratio probabilis reddi possit. Nos etiam reflexionem, refractionem, inflexionemque lucis, & vices facilioris reflexionis, & transmissionis facile admodum ex nostris principiis derivavimus. Qui vero lucem effluviū esse cœnant,

Z

cum

cum implicatas undique refractionis, inflexionisque explicationes exhibeant, vices facilioris reflexionis, & transmissionis explicare nullo modo possunt. Nam, ut aiebat optime Bernoullius *num.* 103. dissertationis de propagatione lucis, quæ a Parisiensi Academia præmium obtinuit, effluvia subtilissima per idem medium transeundo aut nullam resistentiam invenient, & eadem semper celeritate moveri pergent, aut invenient aliquam resistentiam, & paulatim motum amittent, quin possint deinde recuperare, & vices ullas reciprocas subire facilioris reflexionis, transmissionisque. Sed neque ipse Bernoullius ex ætherearum vibrationum indole, ac lege vicium earundem causam satis nitide derivavit. Rectilineam quoque propagationem lucis non attigit, & toto ætheri cum alia solida adjecisset corpuscula, intestinum motum ademit, cujus tot sunt vestigia, & qui explicandis cæteris phænomenis naturæ conducit maxime.

P A R S A L T E R A.

De Electricitate.

DEFINITIO PRIMA.

Electricitas est ea vis, qua corpora attrahunt, aut repellunt minima quædam corpuscula, aliis corporibus admota lucent, tacta scintillas edunt, crepitant, pungunt &c. Ab electro vocabulum derivatum est.

DEFINITIO SECUNDA.

Corpora electrica ex origine dicuntur illa, quæ confricata, aut percussa electricitatem possunt acquirere, ut vitrum, gemmæ quamplures, mastix, pix, sulphur, resina duræ &c.

D E-

DEFINITIO TERTIA.

Corpora electrica per communicationem dicuntur illa, quæ electricitatem concipiunt ubi propius admoveantur aliis corporibus ex origine electricis, atque electricificatis, ut metalla, semimetalla, vegetabilia, animantia, liquores omnes, exceptis pinguibus, & oleosis.

DEFINITIO QUARTA.

Globus electricus ille dicitur, qui duos inter clavos firmatus, ope manubrii, & funis ductarii circumagitur, & vola siccoris manus, aut panno aliquo attritus, insignem, & continuatam electricitatem concipit, aliisque corporibus communicat.

DEFINITIO QUINTA.

Catenæ electricæ nomine intelligitur series corporum quorumcumque communicatione globi electrici electricitate imbutorum. Ita tubus metallicus, qui globo adjungi solet, tubo adhaerentes homines &c. universim catenæ nomine designantur.

DEFINITIO SEXTA.

Machina electrica est series corporum communicatione electricificabilium, quæ globo, dum electricatur, adnexa sunt. Homo ex. gr., qui globum manu atterit, ad machinam refertur. Nomen machinæ electricæ vulgo aliter solet accipi, ut ad catenam etiam extendatur. Nos ad vitandam nominum confusionem hunc illi sensum adjudicavimus.

DEFINITIO SEPTIMA.

Corpora illa positive, & excessu electrica dici solent, in

bus materia electrica, quacumque sit, redundat respective: Illa vero defectu, & negative electrica, in quibus materia eadem respective deficit. Hoc positivae, & negativae electricitatis discrimen primus detexit Cl. Franklinus.

EXPERIMENTUM PRIMUM.

Tres hactenus excitandi electricitatem in corporibus origine electricis modi innotuerunt: percussione videlicet, frictione, & fusione. Percussione in primis, ut in lacrymis vitreis calefactis, cylindris comparatis ex cera obsignatoria, sulphure &c. expertus est Kratzelein. At etiam fusione: nam si liquefactum sulphur, aut pars colophonii una, & duae gummae laccae &c. in cochlear terrae infixum, aut in vas vitreum, & conicum versentur, frige factae postmodum massae deprehenduntur electricae. Maxime demum frictione: quo modo electricantur vitra, mallix, pix, sulphur, resinae durae, adamas, saphirus, smaragdus, topatium, iris, opalum, ametistus, berillus, chrysellus, arsenicum, alumen, talcum, cera obsignatoria, aliaque plura corpora, quae ante perfrictionem calefacienda sunt ut pili animalium omnium, pennae avium, dentes, ungulae, cornua, serica &c. Frictionis ea commodissima ratio est, quam primi Hausen, & Bose in Germania, & Hauksbejus in Anglia adhibuerunt, & qua globus, aut cylindrus vitreus probe exsiccatus fune ductario circumagitur, & manu appressa, aut alio corpore atteritur.

EXPERIMENTUM SECUNDUM.

Corpora omnia communicatione electricabilia electricitate imbui nequeunt nisi aliis corporibus origine electricis cingantur. Homo ex. gr. prope globum confricatum positus electricitatem in se non recipit, nisi incumbat fulcris ex vitro, mastice, pice, &c. Aer etiam circumambiens ad intendendam electricitatem purior esse debet: ne scilicet interspersae maiore copia, & invicem communicantes aquae particulae electricam materiam undique disperdant. Aliter sibi

sibi cessasse experimenta Clariss. Bose testatus est quarto de electricitate commentario. Mihi vero, & aliis omnibus nunquam sereno cælo, & maxime humido, ac nimbofo eadem vis electricitatis se prodidit. In vacuo non solum lucem electricam. verum etiam attractionem, repulsionemque majorem esse quam in pleno aëre scripserunt Kratzeſſcin *cap. 4. Theor. Elect.*, pluresque alii. Beccaria vero cum ex recipiente Antliæ ita extraxisset aërem ut Mercurius usque ad quinque lineas descenderet, instituto accuratissime experimento deprehendit vividiorē lucem electrificatione, & satis languidam attractionem, repulsionemque, ac vix sensibilem excitari. Vide tertiam ad Beccarium epistolam *num. 81. & 82.*

EXPERIMENTUM TERTIUM.

Si machina, & catena cingantur undique aliis corporibus ex origine electricis, electrificato globo vitreo catena, & machina edunt signa omnia electrica. Oppositionem quamdam signorum invenit celeberrimus Francklinius. Cl. Beccaria *cap. 1. de artificiali electricismo* hoc potissimum discriminis esse observavit: quod catenæ electrificatæ, qua parte amplior, & plana est, admoto exterius acuto corpore exigua, & debilis quædam lux, quam electricam stellulam vocavit, in apice appareat: & plano corpore admoto alicui catenæ acuminis, vividior, & copiosior lux obtineatur, figura sua conum referens, eidem parti acutæ obversum, quam lucem ideo appellavit conum electricum, & conum lucidum. In machina res secus est: cum planis machinæ partibus acuto corpore exterius admoto conus, planoque admoto acutis stellula habeatur. Quarta ad Beccarium data epistola eundem signorum ordinem, oppositionemque deprehendit ipse cum globum lana, sericis, pelle animalium circumvestisset. Cum vero globo vitreo sulphureum substituisset, aut globos ligneos incrustasset sulphure, pice, colophonio, resinis, phænomena contrario ordine obtinuit, ut quæ antea ex catena habebantur, haberentur postmodum ex machina, & vice versa:

fa: quod est elegans Kinnerslæi theorema, globo sulphureo confricato ex catena machinam, atque ex machina catenam electricam emergere.

EXPERIMENTUM QUARTUM.

Si phiala vitrea exterius probe sicca, & quæ interius affusam aquam, & electricatam habeat, tangatur eodem tempore interius, exteriusque, scintilla rubei coloris, & major crepitus, atque excussio totius corporis habebitur. Quod si etiam plures homines se tangant, aut cum alio corpore electricitati pervio communicent, & primus convexitatem phialæ manu teneat, ultimus scintillam edat; omnes quotcumque sint concussionem eandem eodem momento temporis percipient. Concussio fortior est, ac validior in singulis juncturis corporis, & per viam illam brevissimam, quæ a loco scintillæ educatæ adusque vitri convexitatem intercedit, & simul per partes transit, quibus homines sese contingunt: ut si homines manibus se teneant a manu ad manum, si unus unum manu alterum pede tangat a manu ad pedem ictus transcant. Aquæ globuli plumbei, aut limatura ferri substitui potest. Si adhibeatur in experimento Mercurius, aut ex phiala extrahatur aër crassior, longe violentior fit ictus. Phialæ subrogavit Franklinius vitrum planum, & ex utraque parte bractæolis aureis inter se invicem non communicantibus obductum: quod propterea quadratum magicum, & quadratum Franklinii dicitur.

EXPERIMENTUM QUINTUM.

Experimentum eodem exitu habetur sive ex machina, sive ex catena quadratum magicum electricitatem participet. In utroque casu utraque quadrati superficies eo discrimine signa omnia electrica exhibere solet, quod in machina, & catena deprehenditur. Ubi ex catena quadrati magici electricitas derivetur, quæ planis superficiei inferioris partibus admoventur acuta corpora, globo vitreo confricato, lucidum

dum conum videndum præbent: quæ vero acutis partibus admoventur plana corpora electricam stellulam exhibent. Contra quæ acutis corporibus, electricabilibus, adnexisque superiori superficiei, in quam primo ex catena transit electricitas, accedunt plana conum lucidum, quæ acuta planis stellulam referunt. Omnia inverso ordine contingunt ubi ex machina quadrati magici electricitas derivetur. Hæc *cap.* 4. de artificiali electricismo fufius exposuit Beccaria: secunda vero ad Beccarium epistola adjecit quod uniformiter moto globo, quam ex catena suspensum quadratum magicum dato revolutionum numero electricitatem, & excutiendi vim adipiscitur, eandem amittit totam aequali numero revolutionum si machinæ postmodum admoveatur.

L E M M A.

Materia electrica nihil est aliud nisi ipse æther.

Primo enim electricitatem non ullis inditis viribus attrahendi, repellendique, sed alicujus materiae actione, & motu haberi evidens est. Tangimus hanc materiam electricam, olfacimus, videmus. Subtilitas hujus materiae ex eo colligitur quod corpora etiam densissima, ferrum, aurum, metalla omnia liberrime pervadat, & ad intervalla etiam maxima citissime diffundatur. Denique materiam eandem agitari perturbatissimo intestino motu sexcentis fere argumentis constat, & expansione in primis, quam Cl. Bose deprehendit in electricatis herbis, ramis plantarum omnium, floribus quibuscumque &c. Itaque materia electrica est ipse æther.

C O R O L L A R I U M.

Ex iis, quæ jam circa ignis, atque ætheris naturam diximus, satis constat ignem, & calorem sensibilem electricitate non posse haberi, nisi electricentur volatilia corpora, accumulatio materiae æthericæ fiat major, ipsique crassiora alia admisceantur corpuscula, quæ latera pororum urgeant,

geant, atque impellant. In hisce casibus calorem, ignemque haberi attingemus suo loco.

PROPOSITIO PRIMA.

Pori omnium corporum origine electricorum minus communicant inter se, quam in aliis corporibus communicatione electrificabilibus communicent.

Id primo constat ex binis electricitatis legibus, quas *num. 459. Transact. Philos.* protulit Desaguillierius: quod scilicet corpora omnia secundi generis, admoto exterius simili corpore, electricitatem maxima ex parte, aut etiam ex toto amittant: primi vero generis corpora utcumque tacta electricitatis detrimentum dumtaxat ubi fit contactus patiantur. Haec duo plane indicant dumtaxat corpora communicatione electrificabilia aetheri undique ad locum, ubi scintilla contactu educitur, liberum aditum permittere. Intimae ejusdem texturae indicia plura alia sunt. Animantia communicatione electrificabilia cum sint absorbentibus poris searent, aliisque innumeris inter se invicem communicantibus, ut Anatomicis observationibus innotuit. Similem pororum dispositionem in plantis esse ex nutritione, & respiratione singularum deducitur, atque ex eo confirmatur quod ubi deficiente vegetatione respiratio, succi nutritii accessio, & communicatio interior deficiat, plantae electrificari amplius non possint. Vegetabilium omnium liquida, & fluida quaelibet minus partibus singulis connexa sunt, & cum facile adeo aliis corporibus adhaereant ex partibus ramosis componi debent. Metalla cum pluribus spiritibus undique aditum permittant, & facile adeo solvantur, fundanturque, caloremque ab una ad aliam partem communicent, malleo etiam ductilia sunt; quod sine ramositate partium nequit intelligi, qua fiat ut partis unius tractio cum alterius proximioris tractione conjuncta sit. Nequit etiam intelligi fluida, & metalla, ac semimetalla, quae maximam metallicarum partium copiam continent, ramosis partibus coalescere, nisi poros communicantes undique intercipient. Contrariam constitutionem
cum

cum habeat vitrum, cum nullis spiritibus solvi possit, maxime rigidum, & minime ductile cum sit, neque componi ex ramosis partibus, neque tot poros communicantes poterit intercipere, quamvis communicantes aliquo modo in directum habere debeat ut sit pellucidum. Valet id ipsum de resinis duris, atque opacis, & sulphure. Sericum si probe exsiccatum sit, quamvis naturae regno a resinis, & vitris dissitum, textura internarum partium simile esse ex eo colligo, quod idem fere sonus habeatur sericum digitis perstringendo, ac si stringatur flos sulphuris, aut excutiantur resinae fluidae, ut resina abietis, balsamum mechae &c. Ex maxima sulphurcarum partium, & resinarum copia, quam continent pingua, & oleosa fluida, oriri debet ut communicatione electricari nequeant. Et plane olci depositiones substantiae resinosae sunt, & ex distillatis oleis oleum aliud densius educitur, quod resinis fluidis respondet.

COROLLARIUM PRIMUM.

Quoniam tot modis eadem materiae portio sub dato aliquo spatio, & volumine disponi potest, manifestum est in rarioribus etiam corporibus minus communicantes inter se poros aliquando esse posse, & adveniendi aetheri minus pervios, quam in densioribus. Et quemadmodum suber ex. gr., quo dolii orificium clauditur, evaporationem liquorum impedit, quam aut plumbum, aut stannum impedire nequeunt; ita sericum, vitrum, & aer quoque progressum aetheris metallorum densissimorum poros liberrime permeantis poterunt sistere: minus enim materiae electricae pervius est aer ipse, nec nisi tardius electricitatem aliquam ab electricato corpore mutuari potest, ut ex *Epist. 7. Cl. Beccariae* colligitur.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Quoniam autem vibrationes aetheris reciprocae, ex quibus diximus oriri lucem, propagari possunt per aetherem in retilineis corporum poros contentum, & interclusum, fieri potest.

A a

te-

terit ut quædam corpora pervadat electricitas, & non lux, quædam lux, & non electricitas, quædam & electricitas, & lux. Poterit enim in primis fieri, ut quædam corpora electrificabilia liberos, patentisque adveniendi ætheri poros in directum sitos non habeant, nec vibratorii motus propagationi locum relinquunt: secundo ut quædam corpora diaphana, poros in directum sitos cum habeant, ætherem tamen in iisdem sic clausum teneant, ut alteri exterius adveniendi non ita facile aditum præbeant: tertio ut quædam alia rectilineos meatus liberos, & adveniendi ætheri pervios habeant.

PROPOSITIO SECUNDA.

Corpora origine electrica motui tremulo, & vibratorio minimarum, & insensibilium partium concipiendo maxime idonea sunt.

Quæ percussione electricari possunt corpora, eæ obliquatoria, vitrum &c. maxime elastica, & sonora sunt, concipiendisque propterea iis vibrationibus aptiora. Idem de aliis valet sola fusione electrificabilibus corporibus. Ut enim *Propos. 8.* Theoriæ Electricæ observavit Kratzeſtein, facile agnosci potest levem coherentiā partium sulphuris, & resinarum cum insigni elasticitate conjunctam esse. Nam si bacillus ex sulphure, aut resina fusā efformatus calida manu apprehendatur fissuras statim cum aliquo fragore ager, qui fragor cum ortum ducat ex motu tremulo, & vibratorio singularum partium, manifestum est vim ignearum partium eidem motui excitando in corporibus hujus generis sufficere. Valet etiam de reliquis perfricatione electrificabilibus, quæ omnia, ut animadvertit Nolletus in Monumentis Regiæ Parisiensis Scientiarum Academiæ anno 1745, eo citius, vividiusque imbuuntur electricitate, quo rigidiores partes, rudioreſque habent, & ad reagendum aptiores. Hanc etiam ob causam observavit vir clarissimus in corporibus ex origine electricis, confricatisque ad intendendam electricitatem frigus, calorem vero ad remittendam conducere, ubi calore
mol-

mollescant partes, & minorem elasticitatem participant, quemadmodum in cera obsignatoria videre est. Contra qui caloris gradus augendae elasticitati, & solvendis, dissipandisque humidis particulis conducit aliquando, is etiam electricitati augendae conducit maxime. Pariter vitrum, succinum, sulphur, quae diutius confricari possunt corpora quin mollescant, & elasticitatis detrimentum aliquod subeant, ad concipiendam electricitatem magis comparata sunt. Denique corpora haec omnia sunt etiam friabilia: quod plane indicat partes singulas percussione compressas, dissociatasque elasticitate sua resilire, & motu tremulo, ac vibratorio vehementius concepto dissociari etiam magis a se invicem, & in pulverem comminui.

COROLLARIUM PRIMUM.

Quia vibratorium motum concipiunt percussione, & minimis partibus dissiliunt quae possunt friari corpora; promptioribus vibrationibus concipiendis magis idonea esse debent sulphurea, & resinosa corpora, quae magis friabilia sunt quam vitrea. Quia vero magis sonorum est vitrum, & sonus successivis vibrationibus sonori corporis intenditur, ut parte prima dictum est, diuturniores vibrationes in vitro excitari poterunt. Minime omittenda erat haec conjectura, quae statim vitream, & resinosam electricitatem specie disferre indicat, ut primus in Gallis detexerat Cl. Du Fay.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Neque tamen ad electricitatem originariam hæc sola tremuli motus, & vibratorii in minimis partibus concipiendi dispositio potest sufficere: cum metalla etiam, & alia corpora, quae communicatione electricitatem imbibunt vibrationibus excipiendis, prosequendisque satis sint apta. Duo simul ad electricitatem illam requiruntur: ut minimæ partes tremere, citissimeque vibrari possint, atque insuper ut intersper-

sa interstiola minus communicent, advenientique exterius ætheri difficiliorem aditum præbeant.

PROPOSITIO TERTIA.

Corpora origine electrica eundem motum tremulum, ac vibratorium concipiunt quando electricantur.

Confricando celeriter, aut percutiendo corpora electrica, aut fusiones in vas subjectum versando, cum sono aliquo motum tremulum, & vibratorium minimarum partium excitari manifestum est. Percussio, quæ inæqualiter diversis, & diversimode dispositis superficiæ percussæ punctis distribuitur, debet minimas partes deprimere diversimode, & hæc, elasticæ cum sint, pro quantitate depressionis habitæ elevari debent, & percussione celeriter repetita itus, & reditus brevissimos continuare. Quod fustum est sulphur, aut gumma, aut colophonium, in vas vitreum, aut ferreum ex data altitudine decidendo eundem motum in se recipere, & vasis etiam particulis communicare debent, qui proprio augendo, conservandoque conducet maxime. Demum quæ corpora confricantur celeriter, violenterque, ita extremis suis, & asperis superficiebus apprimuntur, ut altiores unius partes humilia alterius loca subeant, tum superincedendo emergant, deprimanturque aliquo modo, & restituantur postmodum elasticitate sua, & continuata frictione motum vibratorium, ac tremulum concipiant. Poterit etiam diutissime tueri hic motus licet successu temporis languidior fiat, quam ut in ærem crassiorē sensibilibiter agere possit, & impressionem soni continuare.

COROLLARIUM.

Quia electricare corpora nihil est aliud quam motum tremulum, & vibratorium in minimis singulorum partibus excitare, intendetur electricitas aucta tremuli motus, & vibrationis quantitate. Ideo crassiora vitra in re electrica subtilioribus antecellent, quorum æque validæ, ac fortes vibrationes

nes esse non possunt. Et quo modo intendendæ electricitati conducit major vitri alicujus crassities, ær etiam interius clausus conducet, ut si rare scat, extrahaturque, vibratorius vitri motus, & electricitas fiat debilior. Id ferunt plura Nolleti experimenta.

PROPOSITIO QUARTA.

In iisdem corporibus ut supra electricitatis perpetuus effluxus ætheris habetur secundum lineas superficiei electricitate perpendiculares.

Quoniam enim per superiorem propositionem minimæ corporum electricitatorum particulae motum tremulum, ac vibratorium habent, quo eunt, & redeunt, assurgunt, & deprimuntur; exhibeat *AOCED*, *fig. 31.*, sectionem electricitati alicujus corporis, quae in ea vibrationum singularum parte, qua fit depressio ad *aocED* redigatur. Patet in singulis iis depressionibus aetherem quoque intus contentum undique coarctari, & ex crassitie *BO* ad *Bo* redactum, cum dilatari ad latera non possit, in quibus pori magis quam antea contracti sunt, ex poris ipsis, qui secundum longitudinem *AC*, *DE* fere ut prius aperti remanent debere erumpere, & perpendiculariter ad superficiem corporis impelli. Quoniam vero juxta antecedentem propositionem vibrationes singulae summa celeritate se consequuntur, & ex legibus Mechanicae impulsus aether semel conceptum motum, ac directionem retinet quantum in se est; juxta lineas vibranti, & electricitatis superficiei perpendiculares continuus crit interioris aetheris effluxus in exteriorem, quo exterior aether, & ær crassior circumambiens, qui aliquo modo propagationi aetheris resistit, impelletur, lenisque ille ventus excitabitur, qui obversa etiam manu percipitur, & primum fere conceptae electricitatis indicium est.

COROLLARIUM PRIMUM.

Data ratione velocitatum, qua revolvitur globus, & qua
æ-

aether pellitur, directio ipsius aetheris determinari poterit. Quod si statuamus rotationis velocitatem prae altera posse negligi, centeri poterit aetherem ab aequatore sphaerae secundum radios effluere, & electricitatem recedendo directe a centro decrescere in ratione reciproca distantiarum. Id in distantibus non ita magnis expertus est Kratzeſtein: cum enim proportio inversa distantiarum esset 38, 32, 22 $\frac{1}{2}$, 19, 14 $\frac{1}{3}$, 9 $\frac{1}{4}$, 6, erat proportio electricarum, & attrahentium virium 38, 32, 23, 18, 12 $\frac{1}{2}$, 6, 2.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Posita eadem celeritate angulari, & quantitate confractionis, ab aequatore ad polos progrediendo intensitas electricitatis erit ut absoluta confractionis, & rotationis velocitas, hoc est ut cosinus latitudinis. Universim itaque erit intensitas reciproce ut distantia, & directe ut cosinus illius arcus, qui in superficie sphaerica rectae a loco dato ad centrum ductae, aequatorique interjicitur. Si diversae adhibeantur sphaerae, utcumque ex vitro ejusdem indolis conflatae, manente eadem celeritate augebitur, minueturque electricitas in ratione diametrorum. Adjicienda etiam erit ratio aliqua crassitiei vitri, & caloris, ut ex jam dictis colligitur, & ferunt plura experimenta quae in Commentario epistolari Bosius retulit.

PROPOSITIO QUINTA.

Iisdem positis dico quod alia corpora communicatione electricificabilia, ut moris est propriis adnotata aethere omnia debent imbibi.

Si proprius sphaerae vitreae, ut supra electricatae, admoveantur corpora hujusmodi communicatione electricificabilia, metalla, animantia, fluida &c. aliis corporibus ex origine electric-

lectricis circumdata pice, mastice, vitro &c. interim vero ær circumambiens sit siccior, quam ut humidæ ipsius, particulae corporis communicatione electricabilis vices subire possint; maxima æther, qua a globo pellitur velocitate in superficies eorundem corporum proxime objectas illabatur. Et quia pori omnes corporum communicatione electricabilium, per primam propositionem, communicant inter se invicem, ac patent; non per extimas superficies dumtaxat, quod finxerunt nonnulli, sed per intimam etiam substantiam effundetur. Quia denique circumambientia corpora origine electrica nequit pervadere, & per ærem disperdi ut dictum est, in intima eadem substantia diu, & copiose accumulabitur. Id etiam ferunt notissima Jallebertii, Bosii, aliorumque experimenta, ex quibus constat accelerari electricatione sanguinis motum, vegetationem augeri, jactus aquæ celeriores, altioresque effici, & aquam salientem in plures tenuiores guttulas dividi; expandi flores cujuscumque generis, herbas, & ramos, promoveri operationes chemicas, solutiones, præcipitationes, fusiones, distillationes.

COROLLARIUM PRIMUM.

Si massa corporis communicatione electricabilis augeatur, amplior etiam locus præstabitur accumulando, colligendoque ætheri, & electricitatis vis, & intensitas fiet major. Id pluribus experimentis confirmavit Nolletus sermone quarto. In qua potissimum massæ ratione electricitas intendatur incertum est. Omnino autem in eadem massa, pro figuræ diversitate, accelerari, aut retardari poterit progressus ætheris, & electricitas aut intendi, aut remitti. Huc alia redeunt Monnierii, & Nolleti experimenta, quibus complicatas laminas, & irregularis superficiei corpora minus electricari deprehenderunt. Radiis autem Solaribus ustorio speculo, aut lente aliqua collectis cum ætheris accumulatio non habeatur, sed conspiratio tantum vibrationum ætheris in focum, electricitas non augebitur. Observavit id secunda epistola Franklinius.

Co-

COROLLARIUM SECUNDUM.

In eodem corpore inæqualiter electricitas distribui debet. Illabens enim successe æther debet alium supersitem vehementer ad extremas usque partes propellere, atque ibi, cum difficilior in ærem circumambientem effusio sit, magis accumulare. Ideo in confiniis longioris alicujus catenæ fortior, ut Cl. Krugers deprehendit, est electricitas, & medias extremasque inter longioris catenæ partes signa electrica haberi aliqua possunt: quod electricitatis diversitatem aliquam indicat, ut ex sequentibus patebit.

COROLLARIUM TERTIUM.

Vis, qua particulæ ætheræ electricato globo erumpunt undique, cum sit maxima, maxima etiam erit celeritas, qua interiorum corporum substantiam pervadendo ad quamlibet distantiam effundentur. Eandem celeritatem in longioribus catenis certo metiri hætenus non licuit. Experimentatores ferme omnes nullam se invenisse fassi sunt differentiam sensibilem temporum, quibus primæ, extremæque catenæ partes electricantur. Aliquam tamen deprehendit Beccaria, & ante ipsum Kratzestein in Scholio Problematis quinti Theoriæ Electricæ.

COROLLARIUM QUARTUM.

Ætheris motus a superiore, & confricata globi superficie aut ad confricantem manum, & machinam, aut ad propiores catenæ partes dirigitur. In machinam autem, aut in catenam æther primo illabi poterit pro majore, aut minore, qua expellitur, velocitate. Nam si velocitas vibrationum ea sit ut ipso confricationis tempore æther effluat, in manum confricantem, & machinam proxime objectam illabetur, in catenam vero transibit si confricationis tempore non adhuc vibratorius motus, atque ætheris expulsio sensibilis facta sit.

Co-

COROLLARIUM QUINTUM.

Juxta conjecturas illas, quas *Coroll. 1. Prop. 2.* circa vitreæ, & resinosæ electricitatis differentiam proposuimus, videri posset ætherem a globo vitreo in catenam, a globo autem sulphureo, & resinoso in confriantem manum, ac machinam debere expelli. Ideo in priore casu filis metallicis catenam inter, & manum superius positis intercipitur tota electricitas, & ne in catenam transeat impeditur. Contra si ex inferiore parte eadem fila globo vitreo admoveantur, & globus catenam versus ex superiore parte circumvolvatur, a catena absorbetur tota electricitas, & fila eadem nulla amplius dant signa electrica.

PROPOSITIO SEXTA.

Quod si insuper catena, & machina aliis corporibus origine electricis cingantur undique, perpetua, & absoluta circulatio ætheris habebitur ab extraneis corporibus ad machinam, a machina ad globum vitreum, a vitreo globo ad catenam, & a catena ad corpora alia extranea. Globo sulphureo, aut resinoso adhibito ætheris circulatio contrario sensu absolvetur.

Primo enim si adhibito vitreo globo, juxta antecedentia corollaria, æther a globo ad catenam transit, minui paulatim debet copia ætheris in globo residui, ac superfluitis, atque ad tuendum, conservandumque æquilibrium aliae, atque aliae portiones ætheris ex circumstantibus corporibus, & ex machina ad illas globi partes advenire debent, in quibus æther residuus deficit, & quae licet per primam propositionem liberè adeo non pateant, communicant tamen aliquo modo inter se invicem. Itaque si statuamus, quod primus in Anglia praestitit Gulielmus Watson, machinam omnem corporibus origine electricis, & catenam simul circumdari, integram, & absolutam circulatio ætheris habebitur ab extraneis corporibus ad machinam, a machina ad globum, a globo ad

Bb

ca-

catenam, & corpora alia extranea: atque ita machina defectu, & negative erit electrica, catena vero excessu, & positive. Scilicet cum in globo deficiat aether, & concepto motu in catena accumulatur, nec nisi ex proximioribus machinae partibus ad elabentem resarciendum novus aether advenire possit; pari gradu in machina deficiet. En Franklinii theorema ex nostris principiis erutum. At contra si globo vitreo globus sulphureus, aut resinofus substituitur, aether a globo ad machinam, & a catena ad globum transibit, & tota circulatio absolvetur contrario sensu: quod aliud Kinneslaei theorema est. Idem citra intimae texturae, & compositionis in vitreis, & resinosis corporibus diversitatem, quam conjecturae loco dumtaxat antea proposuimus, rectius fortasse ex phaenomenis, & tertio experimento colligeretur, juxta quod cum signa electricitatis in machina, & catena, vitreo, & sulphureo globo adhibito contraria prodeant, manifestum est statim in duobus casibus aetheris directionem contrariam esse oportere, & a globo ad catenam progrediente electricitate vitrea, resinofam manu absorberi, & ne primo ad catenam transeat, impediri.

COROLLARIUM PRIMUM.

Falsum ergo erit, quod Nolletus, & Watsonus statuerunt electricam materiam non a catena solum ad alia corpora transire, sed ab aliis etiam corporibus ad catenam, & in promiscuo, ac jugi hoc materiae effluxu, affluxuque electricitatem consistere. Nam si in catena accumulatus undique est aether, quomodo ab extraneis corporibus, in quibus respective deficit, ad catenam affluere poterit? Aut si continuo effluxu in aliqua catenae parte languescit electricitas, quare a corporibus circumpositis, & non a reliquis potius materia eadem adhuc redundantibus catenae partibus debet refici? Quibus vero rationibus materiae electricae ad catenam affluxus rejicitur, satis etiam ostenditur effluxum ex machina ad extranea alia corpora non posse haberi.

Co-

COROLLARIUM SECUNDUM.

Porro in hac omni circulatione vapor electricus ex machina ad eam vitri partem feretur, in qua respective deficit, sive ex qua vibrationibus conceptis pellitur, & jaculatur. At vero ex ipsa vibrationum indole satis constat non alium successive jaculari ætherem, ac foras expelli posse, quam qui a centro motus est magis dislitus, & circa ipsas vibrantes superficies reperitur. Non ergo est cur ex machina superveniens ultra superficies eandem feratur æther, interiorque vitri substantiam penetret. Ita intelligitur quod longa experimentorum serie Franklinius, & Beccaria assecuti sunt, vaporem electricum ab extraneis corporibus delatum vitra intime non pervadere. Quae in oppositum afferri solent, & deduci maxime ex modo, quo celebri Musschenbroekii experimento aptantur phialae vitreae, omnia citra ullam vitri permeabilitatem singulari ea proprietate explicantur, de qua inferius conjiciemus nonnulla, & qua fit ut electrico vapore in una vitri superficie communicationis ope accumulato, in superficie altera deficiat.

COROLLARIUM TERTIUM.

Si nulla alia corpora catenæ accedant propius nisi aër, in aërem ipsum accumulatus catenæ æther debet effluere. Quia vero juxta *Coroll. 1. Propos. 1.* ætheris particulis aëreae difficiliorem aditum permittunt, non nisi modica in copia, & ad minora intervalla eandem particulæ æthereæ effluere poterunt, & circa electricatæ catenæ partes, a quibus exeunt, resistentia medii cohibita, Atmosphæram electricam component. Atmosphæra in minoribus distantis erit densior, in majoribus rarior, ac debilior, ut ex œconomia effluxus sequitur, & supra etiam notatum est.

PROPOSITIO SEPTIMA.

In tota hac æther circulatione minores alias, subtilioresque particulas a machina, & catena debet abradere, & secum ferre, & copiosius traducere in alia corpora communicatione electrificabilia, quæ propius catenæ admota sint.

Primum colligitur ex ipsa natura ætheris in suis omnibus partibus agitatislimi, qui licet sit tenuissimus, rarissimusque, ubi tamen majore in copia electrificationis ope aliquod corpus subeat minora quædam ramenta debet abripere, & secum ferre. Colligitur etiam ex pluribus experimentis, atque iis potissimum, quibus compertum est animantia, & fluida omnia, densissimo Mercurio excepto, & viscoso olivarum oleo, aliquid sui ponderis, electrificatione habita, amittere: ut apud Nolletum sermone quarto videre est. Colligitur denique ex odoribus, quos electrificata corpora effundunt undique, ut observarunt Hauksbee, Du Fay, & Schilling, quique, ut Nolletus censet, in causâ sunt cur canes, avesque acuti odoratus electrificationem pati non possint. Jam vero æther in catena undique accumulatus, ne libere effluat, textura, & dispositione circumpositorum corporum origine electricorum fatis cohibetur. Admoto igitur aliquo corpore, cui communicari electricitas, & in quo per *Propos. 1.* æther facillime possit recipi, ex propinquioribus catenæ locis, ac remotioribus, quæ omnia communicare debent inter se invicem, æther undique adveniet, abrasasque illas electrificatorum corporum particulas copiosius deferet. Ideo est quod corpore electrificabili electrificatæ catenæ admoto intensior odor spargitur, flores, qui expansi erant, contrahuntur, & catenæ electricitas remittitur.

COROLLARIUM PRIMUM.

Flammæ cum undequaque obfistentem aërem dilatent, pelant, & ad certam usque distantiam cohibeant, admotæ propius effluxum ætheris promptiorem, ac copiosorem facient.

Ideo

Ideo salienti, & electrificatæ aquæ admota flamma aquæ divisio, quæ ex electricitate catenæ oritur, deficit, ampliorefque transflammam, & ad majorem distantiam scintillæ e catena educuntur. Pariter si duorum corporum majus sit intervallum, quam ut ab uno ad alterum electricitas per aërem traduci possit, candelæ flamma interposita trajicitur: quemadmodum ferunt nota Cl. Du Fay, Waitz, Jallebert, aliorumque experimenta.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Particulæ eadem simul cum æthere a catena electrificata ad flammam copiosius affluentes, ætherem alium, admixtasque particulas, in quas impingent, scilicet flammam ipsam impellent juxta sui motus directionem: ut si catenæ extremo illi, quod magis a globo distat, flamma admoveatur, æthereo vento cedat, & sicuti in aëreo accidit ad partem oppositam deflectatur. Crassiorum corpusculorum, quæ catenæ admoveantur propius, alia erit ratio ut videbimus.

COROLLARIUM TERTIUM.

In aërem etiam circumpositum cum difficilior, sed tamen aliquo modo æther effluat, deferet minimas illas, abrafasque electrificatorum corporum particulas eo copiosius, quo concepta electricitas erit fortior. Circa angulosas pariter, atque acutas catenæ partes copiosior erit affluxus: colligitur enim iisdem partibus electricitas, atque ex ampliori loco in arctiorem pertransiens æther celerius, ac vehementius ferri debet.

PROPOSITIO OCTAVA.

Iisdem positis explicare lucem, ignem, & crepitum electricum.

In primis solutæ illæ, abreptæque electrificatorum corporum particulæ cum motum perturbatissimum, ac celerrimum
flui-

fluidi, cui innatant, concipiant, si majore in copia confertæ sint, & vehementius agitentur, debent in alium ætherem circumambientem agere aliquo modo, & breves illas, reciprocasque vibrationes excitare undique, quæ lucis sensationem imprimant. Inde juxta ultimum corollarium intelligitur, quod Cl. Bose observavit, fortissime electrificatos homines, & potissimum infantes in tenebris circumsplescenscere. Deinde etiam intelligitur unde ortum suum ducant irradiationes, quas circa acutas, & angulosas catenæ partes nisi electricitas sit minima, semper conspiciamus. Intelligitur denique juxta ultimam propositionem cur propius catenæ admoto corpore aliquo communicatione electrificabili scintilla, & lux electrica emergat.

Quod si vero hujusmodi corpus communicatione electrificabile, & propius catenæ admotum maxime inflammabile natura sua sit, ob eandem rationem incendi debet: ut in spiritu vini contingit passim, & calescente adhuc extinctæ lampadis ellychnio. Hoc modo Cl. Ludolfus accendit liquorem æthereum Frobenii: Reinhard, & Winkler quintam essentiam vegetabilem: Grelate, & Hanov alcohol vini purum. Consule circa inflammabilitatem liquorum Watsoni epistolas ad Societatem Regiam Londinensem datas.

Sicuti autem minima corpora, quæ subito incenduntur, impellunt aërem, & crepitant, ita imminuta electrificabilis corporis, & catenæ admoti distantia, auctoque effluxu ætheris, eoque augeri poterit ipsius vis, ut innatantes, agitataeque minimæ particulæ non solum ætherem circumambientem, sed etiam aërem impellant, ac sonum edant. Eadem phaenomena in machina adveniente undique per *Prop. 6.* ab extraneis corporibus æthere haberi debent.

COROLLARIUM PRIMUM.

Qua ratione accensione, & inflammationi aptiores particulæ electrica scintilla accendi possunt, eadem etiam fundentur fusioni aptiores particulæ, metallicæ ex. gr., subtilissimæque bracteolæ scintilla electrica percussæ. Et quia electrificatione accumulatus æther, & ætheri innatantia tenuissima

sima ramenta corporum bracteolas ipsas intime pervadunt, electricitate melius fundi poterunt bracteolæ, quam communi igne. Id etiam experientiæ consonum apprime est.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Pariter, qua ratione filo metallico catenæ admoto scintilla educitur, eadem in disruptione electrificatorum corporum lux aliqua haberi debet: tum enim plura separari debent ramenta, quæ motum ætheris sequantur, & vibratorium motum circumambienti ætheri communicent. Hinc est quod vehementiore electrificatione confracti globi ipso fractionis momento lucent: quodque cum ex cylindro vesicæ suilla, & madida cooperto, atque electrificatæ machinæ imposito paulatim aërem extraxisset Bosius usque ad vesicæ disruptionem, ter, aut quater igneum lumen conspexit vesicam magnitudine exæquans, ac deinde fere duodecies lucem aliam debiliorem.

COROLLARIUM TERTIUM.

In vacuo liberior erit effluxus ætheris, & lux omnis electrica vividior: quod cum secundo experimento conforme sit, & ex theoria nostra facile deducatur, evertit prorsus Mangini, Bammacarii, Watlonii, Boullangeri, Faurii, aliorumque hypothesen, qui aut elasticitate, aut vibrationibus conceptis, aut alio quocumque modo electricitati excitandæ, propagandæque conducere aërem existimarunt. Quoniam enim elasticitate, & densitate aëris imminuta potius lux electrica augetur, manifestum est electricorum phænomenorum causam non esse aërem.

COROLLARIUM QUARTUM.

Hinc ratio redditur phosphori Mercurialis, & Bernoulliani. Mercurio enim de more excusso, & confricata interna superficie tremor ille, ac vibratio partium oriatur, ex qua æther, & cum ipso æthere subtiliores aliæ particule in vacuum tubi partem deferantur, & circa medium affluentes co-

copiosius tenuem lucem illam exhibeant, quam Johannes Bernoullius adnotavit nullo modo ab iis explicari, qui in jugi effluvio corpusculorum tenuissimorum lucem consistere voluerunt. Totius phaenomeni enodatio ex nostris principiis tam certo fluit, ut etiam intelligatur, quod Cl. Ludolfus expertus est, Barometrum aucta frictione electricificari.

COROLLARIUM QUINTUM.

Idem de subtilissimis iis vitreis bullulis dici debet, quae in aërem projectae disrumpuntur. Etenim frictione aeris, projectae, & in frustra jam dissilientes bullulae vibratorium illum, ac tremulum motum concipiunt, quo electricantur, & in tenebris lucem aliquam effundunt. Vide ut acute hanc lucem non nisi ad electricitatem pertinere; nec nisi confricatione aeris, & vitri haberi evicerit Beccaria in descriptione novi phosphori.

PROPOSITIO NONA.

Si planum corpus acutae alicui catenae parti admoveatur conus lucidus, si planae acutum stellula electrica habebitur. Eadem phaenomena in machina inverso ordine prodibunt.

Nam primo adversus Waitzium ostendi potest effluxum materiae electricae copiosiore futurum fore plano aliquo corpore admoto acutae parti catenae electricatae, quam si parti planae admoveretur. Plano enim corpore catenae admoto, qua parte plana est, ad puncta singula non nisi ab objectis punctis illabatur aether. Contra si acutae, & conicae parti *MFN*, *fig. 32.*, idem corpus admotum sit, ad punctum extremum *F* accurrent undique, ex jam dictis, particulae omnes in poris, ac lineis singulis *FA*, *FB* &c. ad eandem distantiam dispositae, ac juxta concepti motus directionem delatae ulterius obversum conum, ac lucidum exhibebunt.

Deinde si acutum corpus *HL P*, *fig. 33.*, parti alicui planae *AD* fiat propius, illico ex puncto *N*, quod cuspidi respon-

spondet, affluet materia electrica. Ex punctis circumpositis M , & R materiae affluxus tanto fiet minor, quanto major evadet distantia a puncto P . Itaque conus MPR , qui eodem affluxu gignitur, non nisi circa axem NP erit lucidus, & prae illo, qui ex acutis, angulosisque catenae partibus educitur, fatis exiguus. Idcirco stellulae electricae vocabulo a priore secernitur.

Omnia inverso ordine in machina, & contraria ratione fieri consequitur ex sexta propositione: quae cum tertio experimento sint consentanea idem Franklinianum theorema positivae, & negativae electricitatis catenae, & machinae confirmant maxime.

C O R O L L A R I U M.

Coni prioris lucidi basis coarctabitur acuto aliquo, aut convexo corpore communicatione electricabili catenae cuspidibus admoto, atque æther in proximiores ipsius corporis partes illabens obversus, & truncati coni figuram referet. Stellula etiam electrica in majoribus distantis circa apicem acuti corporis propius admoti, ubi radii omnes convergunt, sensibilis fieri incipiet. Id, quod consequitur ex principiis superioribus, Nolletus cum observasset, putavit lucem non a catena electricata, sed ab admoto corpore profluere. At patet quod antea diximus vaporem electricum a locis, in quibus deficit, ad alia, in quibus redundat, affluere non posse.

P R O P O S I T I O D E C I M A.

Si filum, aut corpusculum aliquod communicatione electricabile cum aliis ejusdem generis corporibus conjunctum sit, & electricatae catenae, aut machinae propius admoveatur, constanter attrahi debet.

Observandum est enim affluxu ætheris impelli aëreas particulas, & undequaque dilatari. Id primum ex eo infertur quod aër materiae electricae propagationi resistat aliquo modo, ut dictum fuit, quodque actioni contraria semper, & a-

Cc

qua-

qualis reactio esse debeat. Colligitur etiam ex crepitu, qui educatione flammæ electricæ percipitur, & qui impulsu, agitatione aëris manifestum indicium est. Confirmatur etiam experimentis aliis non paucis, quæ *Epist.* 6. ad Beccarium singillatim exposuit Beccaria. Hoc autem posito si duo sint fila humida, quorum unum ex electrificata catena pendeat, alterum manu propius, & parallele admoveatur, dum a primo ad secundum transibit materia electrica, impelletur undique, ac rarefiet intermedius aër, adeoque alterius circumpositi aëris actione a verticali directione abducentur fila, & versus sese invicem inflectentur. Quia vero electrificatum filum novam semper electricam materiam e catena elabentem admoto filo communicat, quæ ad manum pertransseat, & disperdatur; utrumque filum in eodem semper manebit electrificationis statu, neque ulla erit ratio, qua alterutrum recedat, nisi aut catenæ electricitas non sit constans, aut tertium e latere filum consimile, vel corpus aliud accedat communicatione electrificabile, cui similiter accedendo secundum filum a priore dividatur. Eadem phænomena ex machina eodem modo haberi poterunt dum a filo, quod manu appenditur ad filum, quod machinæ adnexum est, transibit æther, & intermedius aër urgebitur, & rarefiet.

COROLLARIUM PRIMUM.

Inde intelligitur quod Hauksbejus expertus est, quod scilicet cum ex centro globi vitrei plura ipse alligasset fila libere omnino pendentia, & alia extra globum rursus hic illic ingyrum suspendisset, globo electrificato animadvertit, & quæ interius, & quæ exterius erant fila erigi singula ad confriatam vitri superficiem perpendiculariter. Valet id ipsum de corpusculis omnibus communicatione electrificabilibus, & cum aliis ejusdem generis communicantibus, quorum data semper, & constans esse debet attractio.

Co-

COROLLARIUM SECUNDUM.

Idem est casus aureæ, & quadratæ bracteolæ, quæ infra catenam electricatam a Cl. Le Cat suspensa est verticaliter, supposita ad datam distantiam tabula metallica, in quam redundans æther transfundebatur. Refelluntur eodem experimento Hausenius, Waitz, Kratzestein, aliique, qui materiam electricam in vortices, ac spiras agi censuerunt. Plane enim si is esset motus materiæ electricæ, bracteolam auream lateraliter impelli, & a quiete sua deturbari necesse esset. Simili experimento Wilson bracteam argenteam duas inter tabulas metallicas, quarum una electricata erat, suspendit. Unde non video cur Watson inde deduxerit theoriam materiæ affluents, effluentisque.

COROLLARIUM TERTIUM.

Si filum unum ex machina, alterum vero ex catena pendeat, unum videlicet defectu, & excessu alterum sit electricum, majorque habeatur utrobique conceptæ electricitatis differentia, major etiam ab uno ad alterum, si prope sit, fiet excursus ætheris, magis aër pelletur, ac dilatabitur, omnifque attractio evadet major. Universim quia pro majore differentia electricitatis copiosior ætheris affluxus, & fortior aëris rarefactio haberi debet, patebit aliud Franklinii, & Beccariae theoremata: scilicet corpora omnia versus se invicem tendere viribus proportionalibus differentia electricitatis.

PROPOSITIO UNDECIMA.

Si vero minimum, & catenæ, aut machinæ propius admotum corpusculum cum corporibus aliis communicatione electricabilibus non communicet, attrahetur primum, tum repelletur.

Id locum habet in bracteola metallica, & globulo ex subere, qui filo serico, & probe sicco suspensus sit, & parum

Cc 2

ab

ab electrificata catena distet. Primo enim attrahetur globulus, ut in antecedente propositione dictum est. Tum quia non poterit in filum sericum successively illabentem ætherem refundere, replebitur cito citius, & novi semper a catena advenientis, & in intermediis locis accumulati vi, & actione superata vi, & reactione aëris circumpositi, repellitur a catena, & lente oscillari incipiet. Quod si interim, dum repellitur, aliud corpus communicatione electrificabile propius inveniatur, cui intus suscepti ætheris portionem aliquam impertiatur; alteri rursus præbere locum, & ad catenam reverti poterit. Sublato corpore electrificabili non nisi tardius ad catenam redibit globulus, postquam scilicet ambienti aëri, & progressum electricitatis, ut dictum fuit, retardanti communicata portione ætheris antea imbibiti a catena novum excipiet. Vide epistolam septimam Beccariæ. Si globulus suberis propius machinæ admoveatur, & portionem aliquam intus contenti ætheris communicet ipsi machinæ, perinde erit. Similis est casus bracteolarum infra catenam ascendentium, aut descendentium superius, quousque demum qui inter bracteolas materia electrica refertas, & electrificatam catenam accumulatur successively æther gravitatem superet, & vim ad recessum imprimat. Consule hacce in re Musschenbroekium *cap. 17. Physicæ*, & Hauksbejum in Monumentis Parisiensis Academiæ anni 1733.

COROLLARIUM PRIMUM.

Ex his colligitur quare corpuscula catenæ leviter adhærentia, furfur, farina &c., concepta jam electricitate repellantur undique, recedant fila a se invicem, aqua saliens in plures, subtilioresque guttulas dividatur, & spiritus vini, aut aqua catenæ astusa dissipetur deinde in pluviam imperceptibilem, ac tenuissimam. Hæc vero, quæ certissimis experimentis detecta sunt, & ex theoria nostra manifeste consequuntur phænomena, satis refellunt Keillium, Hambergerum, aliosque qui ex attractione effluviis electricorum oriri electricitatem arbitrabantur. Cum enim, juxta trigesimum
Keil-

Keillii theorema, *multo magis conferta sint effluvia in minoribus ab emittente corpore distantis, quam in majoribus; corpus leve versus densiora effluvia semper urgebitur donec tandem corpori emittenti effluvia adhæreat*, hoc est constanter attrahetur, nec attractionem unquam repulsio excipiet.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Eandem ob causam si limatura ferri, aliisque hujusmodi pulveribus catena conspergatur, post electrificationem pulveres avolare omnes debent, saltem qui sunt crassiores. Neque enim expectandum est, quod volebat Nolletus, ut disperdantur singuli, & usque ad ultimum, cum neque ex punctis omnibus electrificatæ catenæ effluere possit æther, neque ex unoquoque poro ea vi effluat, qua sensibilibus pulvisculum impellendo finitum motum, ac repulsionem gignat. Id adeo verum est, ut si superstites huc illuc pulveres colligantur, ad ultimum usque avolent. Minime igitur nos ferit, quod affluenti, effluentique materiæ patrocinandæ addiderat Nolletus.

COROLLARIUM TERTIUM.

Si eidem corpori electrificato ad eandem distantiam diversa alia admoveantur corpuscula, quæ diversimode concipiendæ electricitati idonea sint, ea trahentur, repellenturque citius, ac validius, quæ validiorem electricitatem imbibent. Id experientiæ esse consonum animadvertit Cl. Du Tour. Ego etiam cum in eadem a catena distantia, duobus filis sericis, ac probe siccis, chartæ inauratæ frustulum, & rectangulam talci bracteolam suspendissem, observavi citissime attrahi chartam, & tacta vix catena repelli longius. At vero talci bracteola nonnisi tardius accedebat catenæ, nec nisi elapsis aliquot post contactum secundis lente repellebatur.

Co-

COROLLARIUM QUARTUM.

Oscillationes fortiores erunt catenæ, & machinæ interposito pendulo, aut si duo hinc illinc constituta sint corpora, quorum unum a vitro, & a resinis alterum electricitatem participet, unum scilicet positive, & alterum negative electricum sit, juxta sextam propositionem. Inde eruetur vicissitudinum illarum ratio, quæ resinofam, & vitream electricitatem distinguunt: nimirum corpus electricitate vitrea imbibitum a vitro cum repellatur accedere debet corpori resinofæ electricitatis: & vice versa corpus resinosa electricitate præditum ab aliis sui generis repelli, & attrahi ab eo debet, quod electricitatem vitream participat.

COROLLARIUM QUINTUM.

In recipiente Antliæ Pneumaticæ una fere, eademque proportionem aëris residui quantitas, & attractionis, repulsionisque electricæ vis deficiet. Id *Epist.* 3. expertus est Beccaria: cum enim Mercurio ad quinque lineas depresso chartæ inauratæ frustulum filo serico duos inter globos metallicos suspensum vix sensibilibiter agitaretur, Mercurio postmodum ad duos pollices elevato pendulum oscillando ad contactum usque globorum perveniebat, & fortius semper, ac celerius majore immissa quantitate aëris impellebatur.

PROPOSITIO DUODECIMA.

Determinare vires electricitatis in humano corpore exercitas.

Si electricitatæ catenæ, aut machinæ pars aliqua humani corporis propius admota sit, intelligitur facile ex jam dictis extensas nervi papillulas abduci florum more, impelli, distrahi debere, & punitionis sensum imprimere, cum nihil aliud sit punctio, quam sensibilis nervearum expansionum distractio. Quod si totum humanum corpus imbuatur electrici-

ci-

citate, æther rarissimus, tenuissimusque, & aliæ ætheri innatantes aliorum corporum particulæ delicatiores fibras aliquo modo impellere, & commovere poterunt, augere transpirationem, accelerare sanguinis, ac fluidorum reliquorum motum: quod adeo verum est ut ego aliquos electrificatione diutius continuata febricitare etiam deprehenderim. Quod si denique toto corpore electrificato scintillæ ex parte aliqua repetitis vicibus educantur, major ad partem ipsam materiæ electricæ affluxus, impetus, ac vis fiet. Itaque si qui erunt morbi ex levi aliqua vasorum obstructione, densitate humorum, & tardo motu progeniti, ex electricitate subsidium aliquod capient: accumulato enim æthere,eductisque scintillis ex læsa parte excuti obstruentes particulæ, dissipari vitiosi humores, aut agitari poterunt. Gravioribus etiam morbis repetita electrificatione satis mederi innotuit celeberrimis experimentis Clar. Jallebert, Sauvages, Nollet, Monnier, Boucot &c. Novi ego hominem, qui cum ischiade laborasset Placentiæ, repetitis electrificationibus sic convaluit, ut pedes Mediolanum usque decerneret.

COROLLARIUM PRIMUM.

Ad primum quod pertinet patet ratio, propter quam e longinquo catenæ electricatæ admota manu ea sensatio experitur, quæ incidendo in araneorum telas haberetur. Imminuta distantia, & aucta intensitate electricitatis posse per totum digitum, qui admovetur, & maxime in juncturis singulis, in quibus major periositii, & nervorum delicatissimorum est copia, punctionem percipi, & accurrente undique sanguine intumescere, & rubicundas maculas relinqui, rei medicæ, & anatomicæ periti facile intelligent.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Augebitur adhuc eadem sensatio si quæ catenæ, aut machinæ accedit corporis humani pars læsis fibris, & jam habitum vulnere cicatricibus sit debilior: ut mirum videri
am-

amplius non debeat juvenem illum a D. Teske electrificatum, eduſta ſcintilla ex eo brachio, quo antea annis duodecim laboraverat, tantum dolorem percipiſſe. In volucris, atque aliis delicatioribus animalculis electricitas ſenſibilioris effectus præſtat: eduſtis enim ſcintillis diſrumpi ſanguinea vaſa, & interire animalcula compertum eſt.

COROLLARIUM TERTIUM.

Quemadmodum vtro noxia aliquando poteſt eſſe electricitas ubi major impulſus, ac motus nocet, ita e contrario ubi majore motu, atque impulſu opus eſt, utilis, ac ſalutaris electricitas eſſe poteſt. Non igitur contemnendus eſt ipſius uſus in animali œconomia, atque initio potiſſimum morborum, qui ex vaſis obſtructis profluunt: licet enim citiſſimus ſit motus materiæ electricæ, eſt tamen materia omnis rariſſima, ac ſubtiliſſima, nec niſi datos obices ſuperare poteſt.

PROPOSITIO DECIMATERTIA.

Si interior phialæ vitreæ ſuperficies filo metallico, & electrificatæ catenæ, ut moris eſt, admoveatur, exceſſu, & poſitive electrificabitur. Exterior interim ſuperficies negative, & defectu electrica evadet.

Dum phiala vitrea, quæ Mercurio, aqua, aut globulis plumbeis ſit reſerta, unco ferreo de more appenditur, & catenæ electrificatæ admoveatur, æther ex unco in globulos, aquam, Mercurium illabens in interna ſuperficie phialæ accumulari debet. Id etiam ex eo eruitur, quod aqua, quæ phialam replet, aliquando, ubi validior ſit electricitas, lucida in tenebris conſpicitur: quodque ſi aut filo ferreo, aut aqua utcumque adhærente interior eadem ſuperficies communicet cum exteriore, unde æther aliunde effundi, & diſperdi poſſit, experimentum omne evadit nullum. Superſt igitur ut probemus, quod licet intus accumulatus æther cum ſuperficie externa non communicet, agit tamen tali ratione
in

in vitrum, ut ab externa superficie repellatur tantumdem ætheris, quantum intus accumulatur, adeoque interior superficies excessu, & positive, exterior vero negative, & defectu electrica evadet. Id quinto experimento a nobis præmissio ostenditur: etenim si quæ planis superficiei exterioris partibus admoveantur acuta corpora lucidum conum videntum præbent, & si quæ corpora acuta, & communicatione electrificabilia externæ superficiei adnexa sint, admota iisdem plana stellulam electricam exhibent: & contra si quæ acutis, electrificabilibus, adnexisque superficiei internæ corporibus admoveantur plana conum lucidum, si quæ acuta planis stellulam reddunt. Hæc in interna superficie sicuti in catena positivam electricitatem produunt, negativam vero in externa sicuti in machina.

COROLLARIUM.

Si ex analogia, & similitudine effectuum liceret aliquid de causæ similitudine conjicere, ex his omnibus deduci posset accumulatum interius ætherem ita in vitrum, quod interius minime permeat ut dictum est, agere ut vibratorios motus excitet. Plane vibrationibus tremulis, ac brevissimis vitri, & aliorum origine electricorum corporum ætherem pelli undique propositione tertia demonstratum a nobis est. Cum itaque accumulato in concava superficie vitri æthere a superficie convexa alius pellatur, vibratorios in vitro motus ille æther excitare debet, quibus cum æther in vitro contentus projici nequaquam possit a concava superficie, in qua accumulatus, & successive a catena adveniens superest, ab exteriori, & convexa, cui nullum impedimentum imminet, projiciatur.

PROPOSITIO DECIMAQUARTA.

Iisdem positis dico quod si qui homines se tangerent, & dum primus scintillam ex electrificata catena educit, ultimus convexitatem phialæ manu teneat; eo ipso tempore excussio ha-

Dd

be-

bebitur per viam brevissimam, quæ a loco scintillæeductæ ad vitri convexitatem intercedit.

Cum enim æther in exteriore superficie phialæ deficiat ea proportionē, quæ in interiore accumulatur,educta scintilla, late per digitum, ac primum hominem, & quoscumque alios contiguos a catena debet excurrere usque ad ultimum, & convexam phialæ superficiem, in qua quantitas ætheris est minima. Hoc suo excursu delicatissimas nervorum partes impellat, distrahat, ac concutiat materia electrica necesse est. Quia vero licet per totum humanum corpus communicatione electricificabile materies eadem diffundi possit, ad superficiem tamen convexam, & exteriorem phialæ, in qua respective deficit, excursus fortior multo, ac copiosior haberi debet; sensibilibus etiam concussio per viam brevissimam debet esse, quæ a loco scintillæeductæ ad vitri convexitatem intercedit, ac transit per partes singulas, quibus homines sese contingunt, ut si homines manibus se teneant a manu ad manum, si unus unum manu alterum pede tangat, ictus a manu ad pedem transeat. Si phialæ Magica Franklinii tabula substituatur, superficies una positive, & negative altera electricificabitur, & omne experimentum eodem modo ob eamdem rationem cedit.

COROLLARIUM PRIMUM.

Hinc si amplior tubus ferreus, ut præstitit Musschenbroekius, catenæ loco accipiat, aut alio quocumque modo magis in phiala accumuletur æther, ut factum Nolletto est, qui progressui materiae electricae obstitentem aërem e phiala eduxerat; non per rectam illam brevissimam dumtaxat, sed etiam per totum corpus concussio validissima habebitur. Ubi impetus, ac vis ætheris sit minor, non nisi per viam brevissimam fiet sensibilis, & potissimum iis in locis, in quibus major periositii, & nervorum delicatissimorum est copia, juncturis scilicet manus, pedis, aut brachii. Quia vero momento temporis contingunt omnia, perinde erit, ac vix intererit quod corporibus origine electricis incumbant homines, aut non.

Co-

COROLLARIUM SECUNDUM.

Eadem phaenomena ex machina, & contraria ratione obtineri poterunt. Si enim filum metallicum, cui phiala vitrea admoveatur, pendeat ex machina, & negative electrificetur; in interiore superficie deficiet aether, in exteriori vero accumulabitur. Idcirco lucis phaenomena in interiore superficie ea habentur, quae suspenso ex catena filo habebantur in exteriori, & vicissim. In hoc igitur casu materia electrica a convexitate vitri, & humanis corporibus excurret ad partes machinae, ex quibus scintilla educitur, & ad concavam phialae superficiem, in qua respective deficit. Si phiala admoveatur machinae, & scintilla ex catena educatur, aut aequali tempore catenae, & machinae admoveatur Franklinii tabula, nulli sensibiles ictus haberi poterunt, uti liquet experimento, & ex nostra etiam theoria satis colligitur.

S C H O L I O N.

His ergo omnibus non solum aliorum hypotheses refutavimus, qui aut materiam affluentem, effluentemque ex eodem loco confixerunt, aut vaporem electricum vorticoso, & spirali motu censuerunt abripi, aut attractionem partium, aut aërem crassorem pro explicandis electricitatis phaenomenis in subsidium advocarunt; verum etiam totam, & integram theoriam electricam ex natura, & motu aetheris deduximus, discrimen corporum ex origine, & communicatione electricorum, excitationem, propagationem, accumulationemque, ac defectum electricitatis, lucem electricam, crepitem, attractionem, repulsionem, punctiorem, concussionemque. Quae aut ipsi experiundo deprehendimus, aut observarunt alii phaenomena ita explicavimus, ut si quae adhuc supersint satis rata, & constantia, ea lector optimus, & ingeniosus facili admodum negotio possit ex iisdem principiis derivare. In assignando corporum communicatione, & origine electricorum discrimine, atque exponendis aliis theoriae electricae capitibus satis con-

Dd 2

ve-

venimus cum Johanne Alberto Eulero, & Vincentio Beraudio, ac in plura theoremata incidimus, quae ipsi etiam viri perspicacissimi attigerant in duabus dissertationibus, quae eodem fere tempore cum priore nostro de causa electricitatis opusculo ad Petropolitanam Scientiarum Academiam missae sunt. Utrique vero, cum negativae, & positivae electricitatis discrimen minime agnoscerent, electricitatem machinae, & signorum electricorum in machina, & in catena, atque in utraque superficie quadrati Frankliniani oppositionem, & quae independent phaenomena non attigerunt. Beraudius etiam in sua dissertatione, quae post nostrum opusculum Academiae jussu impressa est, materiam electricam in vortices distribui censuit, & circulari motu abripi. Eulerus in ea dissertatione, quae anno 1755 praemium retulit, *num. 21., & seq.*, statuit materiam electricam a tubo, & catena ad sphaeram vitream transire: cum potius a sphaera vitrea ad tubum transire debeat, ut catena omnis excessu, & positive electricetur.

P A R S T E R T I A.

De phaenomenis aliis ab aetheris motu pendentibus.

DEFINITIO PRIMA.

Solidum corpus est quod cuicumque ictui non cedit: Elastikum quod ita cedit, ut sublata vi percutiente figuram suam ictu amissam recuperet: Fluidum vero quod vi cuicumque extrinsecus illatae cedit, & cedendo facillime movetur.

DEFINITIO SECUNDA.

Fermentationum Chemicarum nomine motus illi omnes
in-

intelliguntur, qui solidis corporibus in fluido aliquo immerfis, aut fluidis inter se mixtis solent contingere: sunt autem dissolutio, effervescentia, ebullitio, sublimatio, præcipitatio, coagulum, chrySTALLISATIO.

DEFINITIO TERTIA.

Tubus capillaris vitreus est cylindrus vitreus intus cavus, & adeo angustus, ut aperturæ diameter una parte decima pollicis non sit major.

DEFINITIO QUARTA.

Si globulus vitri fusi in aquam versetur, inferior pars, cum sit densior descendet, cumque sit etiam tenax non dividetur a superiore, atque obdurefcens protrahetur in formam lacrymæ, quæ Batavica dici solet.

DEFINITIO QUINTA.

Matratium Bononiense habebitur si major vitreæ materiæ globus, dum in aqua descendit, flatu intromisso sic dilatur, ut in oblongam, & intus cavam ampullam abeat.

EXPERIMENTUM PRIMUM.

Desaguillierius cum duos globos chrySTALLINOS sumpisset circulari superficie se contingentes, cujus diameter erat $\frac{1}{10}$ pollicis, deprehendit eos leviter compressos unciarum novemdecim vi coherere. Musschenbroekius etiam cum ex duabus pilis plumbeis exiguum segmentum abrafisset, ut major contactus fieret, & manu compressisset pilas, coherentiam ponderi 40, aut 50 librarum æqualem expertus est. Id ipsum in pilis integris compressis, speculis vitreis planis, laminis, aut cylindris argenteis, cupreis, ferreis &c. contingit, ut sine data vi a contactu divelli ne in vacuo quidem possint. Porro

CO-

cohæſio ſuperficierum ſe contingentium fit major ſi fluidum aliquod, aut ſemiſfluidum interponatur. Cylindros marmoreos diametri circiter duorum pollicum modico ſæbo interpoſito vi librarum 1150 cohæſiſſe obſervavit Muſſchenbroekius, auſta ſæbi quantitate vi librarum 800, & 300 quantitate ipſa adhuc auſta.

EXPERIMENTUM SECUNDUM.

Fermentationes chemicae hujusmodi ſunt. Stannum, plumbumque Mercurio diſſolvitur, aqua forti argentum, aqua regia aurum, aqua communi ſal marinum, ſal ſoſtile &c. Si ſpiritus nitri Mercurio immiſceatur, aut aqua olco vitrioli &c. efferveſcentia oritur: & ſi poſtremæ huic mixturæ injiciatur limatura chalybis maxima cietur ebullitio. Quod ſi auro in aqua regia ſoluto nova aqua regiâ aſſundatur, tota ſimul unitur relicto auro, quod præceps decidit. Oleum olivæ aquæ forti immixtum abit in corpus friabile: obdureſcit pariter oleum tartari per deliquium adjectum olco vitrioli, & contuſum albumen ovi cum ſpiritu ſalis mixtum &c. Denique ſoluto in aqua ſale Ebfomenſi, affuſoque ſpiritu vini reſtificato, ſeparatur ſal, & ad fundum vaſis dilapſum vertitur in chryſtallos. Ad chryſtalliſationes reduci ſolent chemicae vegetationes, arbor Dianæ, arbor Martis, pampini Philoſophici &c.

EXPERIMENTUM TERTIUM.

Altitudines fluidorum in tubis capillaribus nullam ſequuntur datam, & conſtantem rationem tenacitatis, & ſpecifici ponderis. Muſſchenbroekius cum capillarem tubum ſumpſiſſet, recens conſtatum, 43 lineas longum, diametri minoris $\frac{1}{3}$ lin., deprehendit altitudinem perpendicularem aquæ lin. 26, alcoholis 19, olei tartari per deliquium 25, ſpiritus ſalis ammoniaci 30, vel 33 &c. Illud autem conſtanter obſervavit data longitudine tubi capillaris minorem fieri aquæ alti-

altitudinem imminuendo diametrum tubi, & data diametro aquae altitudinem minorem fieri imminuta tubi longitudine. Ita cum tubi diameter esset 0.06, 0.04, 0.02, erat altitudo aquae 0.61, 0.93, 1.85 unius pollicis, & cum esset longitudo pollicum 2, 1, altitudo erat linearum 18, 10. Vide secundum de tubis capillaribus experimentum.

L E M M A.

Data velocitate lucis determinare elasticitatem aetheris.

Lucem a Sole ad Terram octo minutis circiter propagari constat, quo tempore sonus posset per spatium 480000 pedum propagari. Est igitur lucis celeritas sexcenties fere millies major celeritate soni. Jam vero celeritates pulsuum in diversis mediis sunt in ratione subduplicata elasticitatis directe, & densitatis inverse. Itaque vis elastica ætherei medii pro ratione suæ densitatis erit ad vim elasticam aëris ut 36000000000:1.

C O R O L L A R I U M.

Tanta cum sit vis ætheris mirum videri amplius non debet quod ubi radii per totam ustorii speculi, aut lentis aliqujus superficiem distributi in unicum foci punctum convergant, colliganturque, æther, qui in foco est, omnium simul acceptorum lucis filamentorum vibrationes in se recipiens, intestinum motum sic auctum habeat, ut corpora objecta impellat violentissime, agitet, dividat, notissimosque alios effectus præstet.

P R O P O S I T I O P R I M A.

Si duæ utcumque exiguæ materiæ partes se tangant, cujuscumque figuræ sint, non nisi data vi a se invicem divelli poterunt: & si particulæ ita compositiæ sibi propius admoveantur coalescent in ampliorem moleculam pro contactuum varietate cohærentem diversimode: atque ita porro majores
sem-

semper, ac majores moleculæ ex minoribus aliis componi poterunt.

Dictum est modo vim elasticam ætheris pro ratione suæ densitatis ad elasticitatem aëris se habere ut 36000000000 ad 1, sive æquipollere ponderi Mercurii 1008000000000 circiter pollices alti. Si data igitur materiæ portio ex minoribus partibus utcumque inter se solutis, & se invicem tangentibus componatur, resolvi in partes, & dividi non poterit, nisi vim ætheris superando, quæ contactum tuetur, & quæ pro contactus amplitudine æqualis est ponderi columnæ Mercurii tantæ altitudinis: & quia quocumque modo partes uniantur inter se, non nisi superata pressione ætheris divelluntur, sub qualibet figura coherere poterunt, & inde ortæ moleculæ crassiores, quas usitato vocabulo moleculas primæ compositionis appellabimus, poterunt esse indifferenter cylindricæ, cubicæ, poliedricæ, vel utcumque irregulares: quia denique quocumque modo dividantur moleculæ, & sive horizontaliter, sive perpendiculariter, sive sub alia qualibet directione resolvantur in partes componentes, dividi, & disjungi nequeunt, nisi aliquo modo æther pellatur e locis suis, sub qualibet directione cohesio habebitur. Eandem ob causam primæ compositionis moleculæ diversimode sese tangere, & uniri invicem poterunt, & coherendo moleculas secundæ compositionis exhibere: quod valebit etiam de reliquis simili modo coalitis tertiæ, quartæ, quintæ &c. compositionis moleculis.

COROLLARIUM PRIMUM.

Quia contactuum quantitates in eadem quantitate materiæ, & sub eodem etiam volumine variæ esse possunt, cohesio, quæ ex quantitibus contactuum omnium pendet, neque volumini, neque materiæ quantitati proportionalis erit. Possunt enim ex. gr. tertiæ compositionis moleculæ majoris densitatis esse, & figuræ propemodum sphaericæ, possunt esse densitatis minoris, & cubicæ figuræ. In primo casu minime inter se cohaerebunt ob punctuales tantum conta-

ta-

tactus singulorum elementorum, & ob majorem quantitatem materiae, quae in singulis intelligitur, etiam si vacua hinc illinc spatiola relinquantur, corpus maxime densum haberi poterit. In casu altero augebitur cohaesio ob multo plures contactus, qui in duobus cubis etiam rarioribus locum habent, minor tamen, ob minorem cuborum densitatem, evadet gravitas, & pondus.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Tota igitur duorum casuum disparitas ea erit, quod in primo quidem ex maxime solidis elementis minus cohaerens corpus componetur, & corpus magis cohaerens componetur ex minus solidis elementis in casu altero: cohaesio tamen integrorum corporum, quae ex pressione aetheris profluit, aequae ac si ex attractione aliqua singularum partium proflueret, generatim major esse non debet ubicumque est major materiae quantitas. Etenim, juxta undecimum Keillii theorema, attractio partium proportionem contactuum sequeretur. Ita ad solvendam difficultatem omnem, quam in introductione dissertationis de cohaerentia corporum firmiorum adversus pressionem aetheris proposuit Musschenbroekius, satis crit casui huic nostro applicare quæ ad calcem theorematum suorum de attractionis legibus scripserat Keillius.

COROLLARIUM TERTIUM.

Si primæ compositionis moleculæ, quæ omnino solidæ intelliguntur, essent figuræ sphaericæ, alia, quæ ex ipsis corpora confurgerent, cohaerent minus, & datam materiae quantitatem, sub dato spatio complecterentur: cumque sphaerae cujuslibet soliditas ad soliditatem cubi circumscripti se habeat ut 157: 300, esset etiam volumen corporum ad volumen materiae solidæ ut 300: 157, & medietas fere extensionis vacuæ in singulis haberetur. Quia vero prima cemen-

Ee

ta

ta corporum figuram quamlibet nancisci possunt, infinita varietas prodibit molecularum primae, secundae &c. compositionis, & ea omnis dissimilitudo explicabitur, quam in partibus suberis, spongiae, sanguinis &c. oculis etiam exhibuit Musschenbroekius *cap. 2. Phys. num. 42.*

PROPOSITIO SECUNDA.

Iisdem positis explicare causam cohaesionis corporum.

Cartesius *par. 2. Princip. Philos. num. 54.*, & Boyleus *sect. 4.* de firmitate, dum ex sola quiete partium censuerunt oriri posse cohaerentiam, nec cohaerentiae phaenomena explicarunt, nec indicarunt plane unde nam ob solam partium quietem, quae mera motus privatio est, tanta exoritur vis, quanta in corporum divulsione experiri solet. Qui cum Fabricio *traët. 2. Phys. lib. 5.* ex plexu particularum se complectentium, aut ex hamatis atomis sese irretientibus cum Galendo *sect. 1. Phys. lib. 6. cap. 7.*, aut cum aliis authoribus ex uligine, viscositate, attractione partium proficisci voluerunt firmitatem, in firmitate ipsa explicanda parum progressi sunt: cum ignota aequae sit attractio, uligo, cohaesio duorum laterum atomi, quae unci formam praeferebant, ac sit cohaesio totius corporis. Qui denique cum Verulamio mixtionem partium diversi generis in subsidium advocarunt, minime considerarunt, quod obvium, & notum est, non heterogenea dumtaxat corpora, ut lateres caemento interposito, sed etiam quae ejusdem sunt generis, & duo specula plana, & siccissima sibi superimposita, & gemmarum, atque adamantis particulas cohaerere. His igitur rejectis nimium errantibus opinionibus, si consideremus duriorum corporum particulas amplioribus superficiebus se mutuo tangere, & premi undique ab aethere, atque aetheris pressione acquam esse ponderi columnae Mercurii 1008000000000 pollices alti, imminuta etiam immaniter contactuum quantitate, ex sola elasticitate aetheris intelligemus tantam cohaesionis vim proficisci posse, quantam experimento deprehendimus. Ampliorum autem contactuum illorum evidens indicium est, quod ob-

observavit Musschenbroekius, diffracta duriora corpora exhibere superficiem aequabilem, & splendentem, cactera vero asperam, & inaequalem.

COROLLARIUM PRIMUM.

Hinc iis modis omnibus augebitur cohaesio, quibus contactus partium singularum augeri potest. Quo unico principio eorum omnium ratio habebitur, quae primo experimento congesta sunt: scilicet fiet major cohaesio, si aut laminae metallicae, & planae cylindrorum bases magis perpolitae sint, aut majore externa vi comprimantur, qua contactus evadant ampliores, aut fluidum aliquod interponatur, quod poris singulis aptetur, & intermedium ætherem excludat. Ad augendam vero cohaesionem quantitas interpositi fluidi, aut semi-fluidi minima sit oportet, ne scilicet majore numero particularum non oppletis dumtaxat poris, verum etiam planis superficiebus a se disjunctis, interjecti ætheris copia rursus fiat major.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Perpendiculari cylindrorum, planorumque aliorum corporum divulsione majorem resistantiam experiri debere manifestum est: sola enim frictio asperarum partium, non vero ætheris pressio, quo nullum spatium vacuum relinquatur, superanda est dum superficies una horizontaliter supra alteram gliscit. Id etiam locum habebit in solidis quibusdam, quorum particulae ferme omnes in tot stratis parallelis dispositae possunt intelligi, & quae non eandem secundum quaslibet dimensionones firmitatem praefereant. Quod si particulae omnes ita complicatae sint ut pertineant ad plura diversa strata, cohaesio ex omni parte maxima habebitur.

COROLLARIUM TERTIUM,

Univerſim quia preſſio ætheris, non minus ac attractio ſingularum partium, proportionalis eſt quantitati contactuum, ut ſupra jam adnotavimus, eodem modo cohaeſio, & cohaeſionis phaenomena attractrice vi, & preſſione ætheris explicari poterunt, ut qua ratione attractionis patroni intelligunt cohaerere corpora ſecundum diſenſiones omnes, & juxta leges alias, quas inſtitutis experimentis deprehendimus, eadem poſſit intelligi cohaerere ob ſolam preſſionem ætheris. Ex ætheris autem preſſione minime illud conſequetur incomodum, quod conſequi ex attractione antea diximus: cum particulae omnes, quae ſeſe tangunt, & comprimuntur undique ab æthere, contactum ſuum, & quamlibet etiam figuram tueri poſſint, ſicuti in aëre.

PROPOSITIO TERTIA.

Explicare fluiditatis cauſſam.

Quoniam magis cohaerere corpora dictum eſt ob majorem contactuum amplitudinem, oportebit plane fluidorum corporum particulas, quae vi cuiſcumque extrinſecus illatae cedunt, atque adeo facile diſſociantur a ſe invicem, pauciores contactus habere, & figura potius ad ſphaericam, quam cubicam accedere. Nam ſi & fluidae, & ſolidae partes aequae magnae eodem modo ſe tangerent, cohaerent eodem modo, ſive demum ex attractione, ſive ex preſſione ætheris cohaeſio omnis proflueret. Nescio autem cur Muſſchenbroekius adverſus hypotheſim prementis ætheris id objecerit, curque eadem diſſicultas Jacobo Bernoullio gravis adeo viſa ſit, ut finxerit propterea partes fluidas ſeſe invicem nunquam tangere, & libere rotari in aethere partibus firmi corporis ſe contingentibus, & quieſcentibus. In utraque hypotheſi cum cohaeſio ſit proportionalis contactibus fluidae particulae ad formam ſphaericam propius debent accedere, ut in punctis paucioribus ſe tangant. In fluidis craſſioribus mer-

cu-

curio, lacte, sanguine, sero, oleis figuram eandem Microscopii opeprehendimus. Eandem in fumo carbonis Muschenbroekius, & in vaporibus Derhamus observavit. Neque tamen accuratae sphaericae in fluidis esse possunt ultimae compositionis particulae: impedit enim ne sint sphaericae ramolitas illa partium, de qua antea dictum est, & qua solidis fere omnibus adhaerent.

COROLLARIUM PRIMUM.

Hinc primo intelligitur fluida omnia ad superficiem horizonti parallellam sese componere. Nam si binis corpusculis *B*, & *C*, fig. 34., incumbat corpusculum aliud *A*, atque hujus gravitas *AD* in duas portiones *AF*, *AE* resolvatur, quae perpendiculariter illa urgeant; manebunt in locis suis, aut expellentur corpuscula, prout vires perpendiculares minores, aut majores erunt ambientis medii resistentia. Primum in asperis, affusisque pulveribus locum habet. Alterum vero haberi debet, ubi adeo parvi contactus corpusculorum intelligantur, quemadmodum in fluidis moleculis esse diximus.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Ipsae autem moleculae utrum magis, aut minus in se sint solidae parum ad naturam fluidi intererit, & discrimen constituet dumtaxat flexibilitatis, & compressibilitatis. Scilicet si omnino solidae sint moleculae nulla exteriori vi disici poterunt in minores partes, quae poros relictos occupent, & minus volumen fluidi component: secus dividi poterunt moleculae, & fluidum comprimi. Secundum in aëre obtinet potissimum, primumque in aqua, quae cum in minus spatium nulla vi adhibita reducatur, & potius per auri, & aliorum metallorum partes se insinuet, videtur ex partibus perfecte inlexibilibus constare.

Co-

COROLLARIUM TERTIUM.

Ignis si accedat coherenti corpori, aut particulas omnes a se invicem disjunget, aut aliquas tantum auferet, quæ ampliorem contactum reliquarum, & majorem coherentiam totius corporis impediunt. Corpus in primo casu fieri poterit molle, aut fluidum: in casu altero adhuc durius evadet. Obtinet primus casus in metallis, semimetallis, resinis, sulphuribus, cera, adipe, vitro &c.: secundus in creta molli, luto, corio, succino &c. quæ igni, aut calido aëri exposita obdurescunt. Majorem etiam coherentiam cum fluidis quibusdam permixta quædam acida, & salina corpuscula impertiantur, censerī poterunt ita aptari singulis interstiolis, ut ampliores contactus relinquant.

PROPOSITIO QUARTA.

Conjicere quæ sit causa elasticitatis.

Si comprimatur corpus pori omnes coarctari debent: si vero inflectatur, cum dilatentur pori ex parte convexa, ex parte concava simili modo debent coarctari: si denique distrahatur corpus pori quidem secundum longitudinem dilatari debent aliquantulum, at multo magis coarctari secundum altitudinem, ut etiam quo distractio est major eo propius ad mutuū contactum obversæ pororum parietes accedant. Ita vero compressione, inflexione, aut distractione coarctatis poris, quid demum fieri oportebit? Non equidem, quod confixerat Cartesius, ad arctiora pororum ostia copiosior undique exterius materia subtilis affluet, ut ea dilatando restituat in statum pristinum: cum neque ulla ratio sit cur affluat copiosius, neque etiam si affluat directiones omnes habeat, quibus comprimi corpora, & pori coarctari possunt. Neque insuper, ut senserunt, Malebranchius, Mazierius, & Bernoullius, vis centrifuga ætheris in poris clausi ulla est. Quis enim aut materiam ætheream in vortices distribui novit, aut majores vortices ex minoribus componi, & hos ex minimis aliis? Quæ
cau-

caussa singulis circulem motum adiecit primitus, & usque adeo conservat invariabiliter, ut nec minores sese invicem, nec omnes simul maximum deordinent? Quod fiet igitur? In primis si corpora origine sint electrica, & per *Prop. 1. par. 2.* impeditam pororum communicationem habeant, æther in singulis contentus, & compressione, inflexione, aut distractione corporis redactus ad minus spatium, sublata exteriori vi, per *Coroll. 1. Prop. 3. par. 1.* in æquilibrio rursus cum æthere ambiente sese componet, & corpori figuram pristinam restituet. Hoc pacto elastica esse poterunt alia etiam corpora, quæ licet communicatione electrificari possint, ita tamen contexta sunt, ut adhuc supersint pori inter se invicem minime communicantes, aut compressione exterioris habita minor fiat pororum communicatio, aut penitus auferatur. Hujusmodi esse debent metalla, semimetalla, mineralia, & partes animantium plures, membranæ, muscoli, tendines &c.

COROLLARIUM PRIMUM.

Cæteris paribus quo densius fiet idem corpus, eo etiam melius intercludetur meatuum communicatio, & compressione habita minor aditus materiæ æthereæ relinquetur, ut hinc, atque illinc diffucendo ad æquilibrium alia ratione redeat, quam poros singulos, & totum corpus restituendo in figuram, ac statum pristinum. Idcirco magis elastica sunt metalla diutius, ac fortius percussa, & chalybs temperatus magis elasticus est chalybe adhuc molli. Eandem ob causam frigus minuendo volumen corporum aliquando elasticitatem auget: atque ideo instrumenta musica, ut observavit Muffchenbroekius *cap. 15. Phys. num. 448.*, hyberno tempore dulcius resonant quam æstivo. Quamvis laxata etiam textura caloris ope fieri poterit aliquando ut partes singulæ perturbatissimo concepto motu se se expandendi vim majorem habeant: quod in aëre, & vaporibus potissimum contingit.

Co-

COROLLARIUM SECUNDUM.

Quæ ita contexta crunt corpora ut mutato quomodocumque pororum ordine, figura, & magnitudine communicent adhuc inter se, & liberum effluenti ætheri aditum præbeant, neque æquilibrium interioris, exteriorisque turbari sinant, ea minime omnium crunt elastica, ut creta humida, butyrum &c. contra vero elasticitatem fortius, & diutius retinebunt, quæ diutius inflexa, compressa, aut distracta, nec pervios undique habebunt meatus, nec efformari novos permittent. Postremum continget potissimum in corporibus origine electricis, atque ideo pilæ ex vitro post compressionem quamlibet eadem ferè vi restituuntur. Aër etiam cum ad genus eorumdem corporum accedat propius, & maximam ætheris copiam in se contineat, licet sit tenuissimus, rarissimusque elasticitatem retinet diutissime. Neque tamen elasticitatis aliorum corporum causa est: cum in vacuo aliorum elasticitas eadem maneat, ut constat pluribus Boylei, Hauksbei, Derhami, Musschenbroekii experimentis.

PROPOSITIO QUINTA.

Si duo corpuscula a se invicem distent quam minime ita ab æthere premi debent, ut etiam propius sibi accedant, ac demum in unum confluant.

Ubi enim minime a se invicem distent corpuscula intellinus, perturbatusque interjecti ætheris motus, & vis, atque elasticitas, quæ ex motu oritur, imminuetur. Quippe etiam si tenuissimus, ac subtilissimus sit æther, non permeat tamen omnino libere poros aliorum corporum, sed latera undique urgendo, impellendoque retardationem, & resistantiam aliquam pati debet: atque ideo, ut monuimus, datum caloris, & motus gradum in partibus omnium corporum tuetur, minus cum aliis nexa ramenta abradit, effluvia in gyrum spargit, & poros corporum communicatione electricabilium copiosius permeando, ea corpuscula avellit, & tecum deferit,
qui-

quibus pondus electricorum corporum minuitur, & quæ odoris, lucis, & soni sensationem in nobis excitant. Cum igitur universim in alia corpora agat æther, & agatur vicissim, duobus corpusculis sibi invicem propius admotis, qui utrique medius supererit, retardato intestino motu minus æther agitatibitur, & minorem propterea vim, atque elasticitatem præseferet. Ita vero corpuscula undique ætheri innatantia, qua parte se se respiciunt minorem, eandemque ex partibus aliis circumfusi ætheris vim elasticam dum sentient, cedent majori vi, & propius semper, ac propius sibi accedendo ad contactum mutuum pervenient.

COROLLARIUM PRIMUM.

Pro varia textura corpusculorum, & componentium partium forma, densitate, ordine magis, aut minus obtundi poterit interjecti ætheris elasticitas, & motus accessionis major, aut minor fieri, aut etiam penitus insensibilis. Ignota vero textura eadem non nisi experimento defectus elasticarum virium ætheris, & inde orta attractio corpusculorum determinari poterit. Experimento autem agnovimus similes fluidorum particulas similia utrimque latera obijciendo ætheri, duas aquæ, olci, aut Mercurii guttulas ex. gr., ipsius motum magis impedire, & ad se accedere, & in unam majorem guttam coalescere. Id in pluribus etiam corporibus heterogeneis locum habet: oleum vitrioli ex. gr. aeri expositum volitantes humidæ particulas attrahit, & volumen, ac pondus auget. Vide de his Newtonum in ultima quæstione Opticæ. Aliæ fluidorum dissimilium particule, ut aquæ, & olci propius sibi admotæ, obtinent quidem ampliores contactus, nec tamen in unum confluunt.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Aliæ omnes attractionum species eodem modo explicari poterunt. Singularis ea est, quæ sublimatio Philosophica, & vegetatio salium dicitur, quæque habetur potissimum vitrio-

Ff

li,

li, & marini salis particulis in aqua dissolutis, & positis cum aqua simul in vase aliquo modicæ profunditatis: quippe circa latera vasis elevari incipiunt sales ad superius usque labrum, & circa extimam superficiem paulatim sese diffundunt. Necesse est in hoc casu atherem vasis lateribus, salinisque particulis interjectum quidpiam intestini motus remittere, & particulas ad accessum determinare. Idem de similibus casibus attractionum similium dici debet. Cæteris paribus fortiores erunt attractiones corpusculorum origine electricorum, quæ cum ætheri minus sint pervia, ut dictum est, majorem etiam resistentiam obijciunt. Ideo cum in contactu tantum se trahant laminæ metallicæ, specula vitrea plana, & siccissima interposito etiam filo bombycino notabili vi se trahunt, quæ duplicato, aut triplicato filo evadit minor.

PROPOSITIO SEXTA.

Iisdem positis asserre rationem aliquam chemicarum fermentationum.

Quoniam ex iis, quæ modo diximus, intelligitur fluidi corporis particulas versus particulas corporis solidi impelli posse, si tantæ magnitudinis illæ sint ut exiguos poros subeant, nec tamen subeant omnino libere, intelligitur etiam qua de causa impetum faciant undique, texturam laxent, & totum corpus non in frustra dumtaxat dividant, verum etiam in componentes partes, atque hetherogeneas resolvant. Ita saltem rationem aliquam dissolutionis hujus assequemur dum nihil omnino explicant qui dicunt attrahi particulas omnes dum solvuntur, & deinde repelli dum effervescent, ebulliuntque, & attrahi rursus dum in chrystallos convertuntur. Prioribus autem principiis inhærendo citra ullam versatilem hujusmodi, & omnino arbitrariam vim, si alterutrius, aut utriusque permixti corporis particulæ sint elasticæ, & ejus insuper magnitudinis, ac figuræ, ut impactu in particulas aliquas resilire, & in alias rursus incidere, & undique reflecti possint, augebitur reciprocis reflexionibus natus calor,

lor, & dissolutum corpus effervescet, aut etiam ebulliet. Pro diversa mixtarum, & sibi invicem occurrentium particularum figura, & indole, pressione incumbentis ætheris augeri poterit aliquando attritus singularum, & cum affricu conceptus motus: poterit etiam aliquando impediri motus ut in vacuo fiat vehementior, quam in pleno aëre. Duos hosce casus distinxit optime Musschenbroekius *cap. 18. Phys. num. 600. & 601*: & primus quidem locum habet Mercurio cum spiritu nitri mixto: alter vero supra ferrum affuso spiritu salis marini. Quod si insuper dissolutis corporibus corpus aliud accedat, quod uni eorum facilius adjungi possit, ipsi admiscebitur, & alterum si sit gravius ad fundum decidet, si vero levius superinnatabit. Denique si subortis vicissitudinibus aliis mœstrui particulae alicubi majores contactus adipiscantur, & minores alicubi, abibunt in corpora datas figuras præferentia, & habebitur chrysellisatio. Ita soluto in aqua sale, ubi evaporare aqua incipit, propius ad se invicem accedentibus salium particulis stratum quodam exurgit in extima superficiei, quod aucta evaporatione fit densius, & pondere suo dispescitur in plures partes, quae ad fundum vasis dilapsae crassiores adhuc evadunt.

COROLLARIUM.

Si partium singularum indoles innotesceret, singillatim determinari posset quae corpora dissolvi simul, effervescere, ebullire debeant. Ignota autem textura partium contrario potius tramite eundem est, & quoniam, ut experimento secundo attigimus, innotescunt phaenomena chemicarum fermentationum, inde colligi poterit quae partes aliorum corporum poris subeundis aptiores sint, reflexionibus mutuis cendis &c. Aliarum fermentationum eadem ratio asserenda erit. Recenseri in primis merentur, quas Clariss. Needham litteris ad D. Folkes datis complexus est, & quibus infuso aquae succo amygdalarum, & similibus aliis infusionibus præstantissimi Microscopij ope deprehendit post dies aliquot crassiores partes in fundo vasis accumulari, & totum fluidum in filamenta innumera dividi, ad se invicem omnifariam incli-

nata, ex quorum apicibus plures globi successive emergent, & in minores alios, minoresque globulos dividebantur, quousque oculis eriperentur omnes ob parvitatem.

PROPOSITIO SEPTIMA.

Fluidorum motus, qui in tubis capillaribus habentur, ex iisdem principiis derivare.

Si speculis illis vitreis, de quibus in *Coroll. 2. Prop. 5.* dictum est, substituamus capillarem tubum, potiore ratione intelligemus minorem fore in interna parte ætheris motum, vim, elasticitatemque. Dum igitur ex utraque apertura ad tuendum æquilibrium exterior æther irruet, & interiorem comprimet, ac rediget ad minus spatium, hic novas vires pressione adipiscetur, expandetque postmodum sese, & illapsum ætherem impellet, & impelletur rursus, atque, ut solent fluida elastica, itus, & reditus brevissimos concipiet. Porro in hisce irruentis, esfluentisque ætheris oscillationibus, si gutta aquæ per oram unam diffundatur, ab irruente æthere urgebitur, & concepto jam motu ad datam usque altitudinem elevabitur. Quia vero capillarem tubum ingressa ramosas partes minimis vitri asperitatibus aptabit gutta, & per totam superficiem partes ipsæ sustinebunt undique sese, ita quoque adhærere poterunt, ut neque aliis ætheris recurribus, neque totius tubi excussione divellantur. Idem continget si capillaris tubus stagnanti aquæ, aut fluido alio immergatur, cujus particulas singulas intus rapi oportebit, nisi fluidum gravius, ac densius sit, quam ut finitum motum ab æthere tenuissimo recipiat. Accidit id Mercurio, qui non nisi profundius demerso tubo ascendit aliquantulum, & semper reliqui fluidi in vase libere stagnantis superficie humilior est. Aliorum fluidorum major, aut minor elevatio neque ex tenacitate, neque ex levitate partium pendebit omnis, sed ex levitate simul, tenacitate, textura interna, figura, qua magis, aut minus impellatur ab æthere, & tubi lateribus se accommodet: quo jam experiundo solum definienda supererit elevatio, ut *exper. 3. præstitimus.*

Co-

COROLLARIUM PRIMUM.

Excursus autem, & oscillationes ætheris augeri manifestum est imminuta capillaris tubi diametro, aut longitudine dumtaxat aucta. Ita uno ictu intelligentur cætera, quæ in eodem experimento notata sunt, & quæ cum ostendant etiam superiores tuborum partes ad elevationem fluidorum conducere aliquantulum, evertunt penitus Vossii, & Carræi hypothesim, qui adhærendo tubi lateribus specifici ponderis detrimentum aliquod pati fluida, & ad tuendum æquilibrium altius ascendere existimarunt.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Sicuti vero in tubis angustioribus vis irruentis ætheris est major, ita si tubus conicus adhibeatur, ad majorem altitudinem ex arctiore orificio rapiuntur fluida, quam ex ampliore: quod aliis Musschenbroekii experimentis conforme est. Secus accidet si cylindricus sit tubus, & orificium unum admota flamma coarctetur, eodemque habito æquilibrii defectu irruenti ætheri aditus minus facilis pateat, quam antea.

COROLLARIUM TERTIUM.

Si interior superficies illiniatur aqua, aut fluido alio, quod communicatione electrificabile cum sit, irruentem ætherem minus impediat, eadem fere interius imminutio vis elasticæ, & elevatio fluidi habebitur: ut Musschenbroekius, aliique experti sunt. Oleum, sæbum, & fluida alia magis densa, & tenacia interius affusa elevationem alterius fluidi aut ex parte, aut etiam ex toto impediunt. Aër etiam elevationem ipsam imminuet, ut fluida in vacuo altius ferantur: quod cum experimentis congruat Fabrii, Sturmii, aliorumque hypothesim convellit, qui tuborum capillarium phænomena ex pressione aëris oriri posse arbitrabantur.

Co-

COROLLARIUM QUARTUM.

Cætera, quæ ad tubos capillares pertinent, ex iisdem principiis facile deduci possunt: quod retardato motu ascendant fluida: quod superficiem superius concavam exhibeant: quod aqua frigida, & calida iisdem legibus ascendant: quod idem semper fluidi pondus sustineatur, & quacumque habita tubi inclinatione altitudo perpendicularis fluidi suspensi eadem maneat: quod non amplius ascendat fluidum si tubi ex aliquo tempore confecti sint, & imminutis paulatim oscillationibus interior æther cum exteriori in æquilibrio demum se composuerit.

COROLLARIUM QUINTUM.

Easdem ob causas si cum lamina vitrea, horizontaliter posita, superior alia angulum satis acutum faciat, qua parte lamina sese contingent elasticitas ætheris imminuetur, & horizontali laminæ affusa guttula versus anguli apicem feretur. Inde etiam aliæ leges eruentur, quas in guttulæ motu observavit Desagullicrius in notis *lett. 1. num. 17*: quod elevando superiorem laminam sistatur guttula, quod illa ad partes alias inclinata hæc alibi cursum dirigat &c. In duabus laminis vitreis parallelis, sibi invicem proximis, & in fluido aliquo immerlis perinde est: debet enim fluidum ascendere etiam in vacuo, & pro minore speculorum distantia magis elevari, superficiemque in medio concavam exhibere. Idipsum aliam ob causam fiet circa liberos vasorum margines: videtur enim exundantiam liquorum ad latera ab adhesionem partium dumtaxat, & decremento specfici ponderis pendere.

PROPOSITIO OCTAVA.

Conjicere quæ sit causa vegetationis.

Clariss. Halcs ad calcem *cap. 4.* illius operis, quo vegetabi-

tabilium œconomiam tanta experimentorum diligentia, & delectu exposuit, plantarum semina, & plantas ipsas consideravit veluti contextum quodam infinitorum capillarium tuborum, vesicularum, glandularumque. Terram deinde, cui radices plantarum infiguntur, animadvertit humido ita abundare, ut juxta 18. experimentum pes cubicus terræ quilibet fovendis seminibus, & plantis nutriendis septem aquæ libras suppeditare possit, antequam præstando nutritionis muneri fiat impar. Denique *experiment. 46.* consideravit in intima seminum, plantarumque substantia, & terra, cui incumbunt, non modice agere calorem Solis, & 20. *exper.* exhibuit caloris gradum fovendis, conservandisque plantis singulis necessarium. His positis quam primum sufficiens caloris gradus expandet defossum semen, poros ampliores reddet, aqueasque particulas rarefaciet, imbibetur iis particulis semen, & maxima vi inflatum radices deorsum aget, & ramos sursum. Neque vero cum supra terram eminere incipient rami finem ideo facient particularum aquæ imbibendarum. Quia sese evolvens planta, communicatione electrificabilis cum sit, poros etiam liberiores, & inter se magis communicantes habeat oportet; internis parietibus pororum, quasi tuborum totidem capillarium adhærebunt undique aqueæ particulae, & caloris beneficio adhuc specificè leviores fient, & a circumambiente fluido impellentur altius, atque altius semper, ad eas utque vesiculas, ac veluti receptacula, in quibus majore in copia possunt recipi. Porro qui receptaculis inserti sunt capillares tubi similiter nutritio succo imbibentur, & ad alia usque receptacula transmittent succum, atque hæc ad alia rursus, & ad quamlibet altitudinem. Hoc suo excursu alias successive, atque alias formas induet succus ipse, & continuæ transpirationis vi in vapores abeuntibus partibus levioribus in densiorem, glutinolamque substantiam illam abire poterit, quæ toti plantæ nutritioni, & augmento sit. In intima medulla excursus, & succi præparatio fiet copiosior, ut Borellus observavit *par. 2. de motu animalium cap. 13.*, & pluribus confirmavit Hales *exper. 123*: est siquidem medulla spongiosum corpus innumeris capillaribus tubulis refertum.

Co-

COROLLARIUM PRIMUM.

Pro varia internarum partium structura, & forma diversimode excurret succus, & plantae variam figuram praefereant. Jam vero etiam si lateraliter, & oblique succus diffundi possit aliquo modo, ut fert 40 authoris ejusdem experimentum, plura tamen diaphragmata lateralem hanc diffusionem maxime impediunt, ut fert *exper.* 123. Itaque longitudinales plantarum fibrae vegetationi in longum promovendae aptiores erunt, & plantae in longum magis excreverunt.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Scilicet evolvente plantarum semine, & delincatis jam in embryone ramis crescentibus paulatim, qui propiores radicibus, & majori trunco inserti erunt, majorem caeteris paribus succi nutritii copiam trahent, magisque, ac citius vegetabunt. Inde ramorum proportionem, & parabolicam formam plantarum, quae solae sunt, explicavit Halesius *cap.* 7., atque etiam rationem attulit cur si plures sibi invicem sint propiores, ut in silvis contingit, humilioribus frigescentibus superiores tantum, qui in libero aëre magis calcfiunt rami, succo nutritio magis imbibantur, plantarumque altitudo evadat major.

COROLLARIUM TERTIUM.

Caeteris etiam paribus aucta transpiratione fiet densior nutritius succus, & plantis alendis aptius. Secus fiet deficienter transpiratione, & si humidi residui copia sit major. Inde oritur quod e planta avulsi fructus, avolantibus undique partibus rarioribus, novisque a planta non advenientibus, citius ad maturitatem perveniunt. Plura etiam alia inde pendent, quae idem author nitide exposuit *exper.* 46.

Co-

COROLLARIUM QUARTUM.

Quod si vero caloris vi, adhæsione partium, defectu specifici ponderis nutrientes succi in minimis plantarum meatibus compelluntur altius, non poterunt non ascendere, & regredi, & falsum erit, quod nonnulli asseruerunt, in plantis æque ac animantibus humores circulum suum absolvere: nisi ipsi circulationis vocabulo intellexerint vicissitudines quasdam motuum, quibus fit ut calidiore, & diurno tempore copiosius ascendant succi, frigidiore vero, & nocturno densiores facti, pondere suo refluant veluti, & aliquantulum relabantur. Inde est quod inferiores Leucanthemi, aliarumque plantarum insitarum partes colorem a superioribus mutuuntur, & quædam insita plantis, quibus inhaerent, nocumen-
to sint.

COROLLARIUM QUINTUM.

In animantium corporibus cum caussis omnibus, quæ in plantarum vegetatione locum habent, vis illa accedat, qua humores eundo, & redeundo circulum suum absolunt, facilius vegetatio, & nutritio omnis intelligetur. Partium structura, amplitudo, & ordo vesicularum, sinuum distributio, & positio in primis diaphragmatum dilatationem ex una parte majorem facient, quam ex aliis. Ossium medullæ, quæ in animantibus non minus spongiosæ sunt, quam in plantis, excipiendis, præparandisque humoribus conducent maxime, quamdiu saltem humoribus ad medullas aditus pateat. Idcirco est quod nutriuntur, & crescunt ossa, quorum glutinosa, & ductilis extremitas nutrientibus particulis pervia est, quodque ubi ipsa etiam extremitas in os transit vegetatio omnis destinat. Lege 123 jam memoratum experimentum.

Gg

PRO-

PROPOSITIO NONA.

Explicare fracturas quasdam vitrorum.

In primis quia pro diversa crassitie percussa vitra tonos diversos referunt, & celeriores, aut tardiores concipiunt minimarum partium vibrationes, manifesta erit eorum ratio, quæ in comparandis poculis artifices curare solent, ut scilicet ubique eandem crassitiem habeant: secus ictu etiam minimo impresso, & excitato sono, dum vibrationibus hetherochronis abripiuntur particulæ, facile admodum dissilient vitra, & chrystalli, ut contingit sæpe sæpius. Id in Matratio Bononiensi potissimum valere debet, cum alia fundi, alia laterum crassities sit, cumque intimæ etiam fundi particulæ tardius frigescendo, quam frigescat exterior superficies, in varias fibras diversæ indolis obdurescant. Idcirco est quod exterior eadem superficies, in qua omnes partes ad modum fornici sese sustentant, cum quoscumque ictus sustineat, minimis frustulis ex adamante, vitro, saphiro, carniola, achate, smaragdo, silice &c. intus cadentibus, ut concava superficies rimas agat, discerpitur Matratium. Idem potiore jure in lacryma Batavica locum habet: dum enim in aqua obdurescit exterior superficies, expansa adhuc, & fervens remanet interior pars, nec potest nili postmodum & paulatim frigescere, & contrahere undique sese, & in plures fibras maxime rigidas, & tenfas dividi, ut propterea disrupto pedunculo omnes simul fibras comminui, & conteri in frusta necesse sit.

COROLLARIUM PRIMUM.

Ad promptiorem, validioremque fracturam guttarum, & ampullarum conducet major fundi crassities, aut majus potius crassitieci in fundo, & lateribus discrimen. Hoc enim ipso magis inter se different vibrationes, quæ possunt in partibus singulis excitari. Idcirco Laghius ampullam cote cum attenuasset, quemadmodum in Batavicis guttis Redium fecisse legimus, & fundum ad subtilitatem summam redegit, im-

immisso silice rimas quidem ea duxit, sed pauciores, nec tanto cum fragore. Sicuti vero quæ solidioris fundi ampullæ sunt longe melius videntur frangi, ita minor puritas vitri, quæ inæqualitates plures relinquat in frigefcente ampullâ ad fracturam ipsam conducet.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Si in aëre frigescant lacrymæ, lente admodum, & æqualiter frigescant, & fibræ omnes eadem lege condensatæ nec tantæ distractionis erunt, nec pedunculi disrptione adeo pati poterunt. Id ipsum in suis Matratii observavit Laghius, qui cum carbonibus accensis imposuisset ampullas, & restinctis carbonibus siviisset postmodum frigefieri, immisso silice nullam labem habere potuit. Patet autem ex vario vitrorum ingenio, compositione, & structura partium oriri, quod non ex omnibus vitris phænomeno idoneæ ampullæ, & lacrymæ comparentur.

COROLLARIUM TERTIUM.

Aër, qui exterius premet lacrymas divisionem partium, disrptionemque pro quantitate suæ pressionis impedit, atque ideo ablato aëre in recipiente Antliæ Pneumaticæ melius franguntur guttæ, & in frustula minutissima abibunt. Ob eandem rationem fortius dissilient ampullæ interius vacuæ, & in vacuo constitutæ. Cætera, quæ ad ampullas pertinent, & quæ nitide exposuit Laghius *Comment. Bon. to. 2. par. 1.* ex iisdem principiis facile deduci poterunt.

PROPOSITIO DECIMA.

Conjicere quæ sit genesis, & causâ nubium procellosarum.

Non enim calore Solis, aut ventis, aut aliis aëris mutationibus procellosas nubes excitari ex eo colligitur quod autumnali, & hyberno tempore tonitrua, & fulgura haberi possint,

sint, ut Pisis etiam contingit sæpe sæpius, quodque tranquillo penitus aëre suboriantur procellosæ nubes, & ipsa Atmosphæræ tranquillitas familiare imminentis procellæ indicium sit. Aliunde vero, cum Terræ circumpositus undique sit æther, intelligitur facile in Terræ sinu, in extrema superficie, in liberis Atmosphæræ regionibus ejusdem ætheris æquilibrium pluribus de causis turbari posse, æthereos ventos aëreis similes excitari, & nubes, quæ ex aqueis partibus communicatione electrificabilibus coalescunt, aliquando æthere magis imbui, ut in catena, & aliquando, ut in machina magis destitui. Id procellosis nubibus contingere vicissitudo motuum electricis similium plane indicat. Cum enim nubes, quæ aquam deferunt, lente, & tranquille admodum progrediuntur, expandanturque uniformiter; cæteræ quæ grandines, quæ turbines, fulgurque devehunt, ex improvviso veluti apparent, impingunt verius se invicem, & post contactum resiliunt, reflexionesque, ac motus hosce reciprocant, quousque simul conjungantur, & unum veluti corpus electricum componant. Corpore aliquo electrificato duo inter tintinnabula suspenso perinde est. Sicuti etiam aliis corporibus electrificata corpora accedunt propius, ita ad vertex montium se deferunt procellosæ nubes, atque ibidem agglomeratæ procellas plures, & vehementiores exhibent. Demum si prope virgam aliquam ferream pice, aut aliis corporibus origine electricis circumdatam nubes transeant, electricitatem virgæ communicant, ut tacta scintillas edat, minima corpuscula attrahat, & repellat &c. Huc redeunt celeberrima experimenta, quæ Pensilvaniæ in America a Franklinio antea instituta sunt, tum vero undique per Europam nostram recognita. Iis sunt analoga, quæ circa ignes summitatem mali lambentes jam diu nautæ observaverant, quæque de facibus hastas ferreas Pucinæ turris procella aliqua jam imminente illustrantibus in lucem edidit Blanchinus.

COROLLARIUM.

Admoto acuto, aut plano corpore virgæ illi ferreæ, quæ par-

parte acuta, aut plana est, dignosci poterit virgae, & nubium electricitas. Animadvertit autem Beccaria aliquando ex acutis partibus conum lucidum, aliquando stellulam educi ea lege, ut si acutum corpus virgae accedendo, qua parte plana est, educit conum, corpus planum parti acutae admotum exhibeat stellulam, & vice versa: quod indicat aliquando excessu, & defectu aliquando electricari nubes. Porro quia aliis etiam nubibus accedentibus, & non procelloso quidem, sed pluvio dumtaxat tempore virga quandoque electricatur, conjici posset generatim nubes alias minoribus acquilibrii ætherei vicissitudinibus haberi, similem tamen omnium esse genisim.

PROPOSITIO UNDECIMA.

Genisim fulminis explicare.

Si eodem modo intelligamus accidentalem aliquam ob causam alicubi ætherem accumulari, & deficere alicubi, & loco utrique vapores plures, aut nubes, aut quævis corpora communicatione electricabilia interjecta esse, intelligemus etiam a loco ad locum violentissime redundantem ætherem vibrari, transjicere interjecta corpora, & brevissimam semitam eligere, quæ per corpora ipsa transeundo absolvi potest. Simili fere ratione dum superior Frankliniani quadri superficies excessu electrica est, & inferior defectu, scintillam educendo impetus, ac vis ætheris ab una ad alteram irruentis brevissimo tramite dirigitur per partes singulas, quibus homines sese contingunt. Pariter si supra ceræ discum metallici plures globuli collocentur, ut lineæ centra omnia conjungentes serpentinam semitam constituent, & quo tempore primus globulus admovetur propius catenæ ultimus digito tangatur, scintilla adusque digitum per globulos singulos excurrat. Porro si hæc eadem lex in serpentina directione fulminis locum habeat, mirum amplius non videbitur quod quædam corpora pervadat fulmen aliis propioribus relictis, enssem solvat ex. gr. vagina intacta, oculos feriat non læso reliquo corpore &c. Cætera vero scintillæ electricæ, & ful-

Gg 3

mi-

minis phænomena similia sunt: sicuti enim scintilla inflammat corpora inflammabilia; ita etiam fulmen quæ invadit combustibilia in fumum, ac cineres resolvit. Scintilla evaporationem corporum auget, sensibilem odorem spargit, fundit tenuissimas auri, & aliorum metallorum partes: & fulmen etiam liquores in vase contentos dissipat, odorem pro varietate locorum varium effundit, & quæ subit metalla solvit, dissipat, absumit. Scintilla occiduntur volucres, & fulmine intereunt homines, atque in hominibus fulmine ictis interius eadem signa deprehenduntur, quæ in volucris scintilla electrica percussis. Singulares hacce in re observationes celeberrimus Wanswieten Bammacario per litteras communicavit.

COROLLARIUM PRIMUM.

Itaque fulmen spectari poterit quasi scintilla, quæ ex electricitatis nubibus educitur tanto majore impetu, ac vi, quanto cælestis, ac naturalis electricitas artificiali, & terrestri validior est. Si electricorum ignium vires voluminibus proportionales esse censeamus, quoniam scintilla, cujus diameter apparens sit lineæ unius, vitreum tubum frangit, intelligemus tres illos globos, quorum in Monumentis Parisiensis Scientiarum Academiæ anni 1719 meminit des Landes, & qui apparentem diametrum exhibebant *lin.* 504., singulos habuisse vim 128034064. majorem, eam scilicet, qua potuerint domos disjicere, lapides propellere &c.

COROLLARIUM SECUNDUM.

Si reliqua etiam, quæ artificialiter exhiberi solent, longe majore impetu, ac vi in liberrimis nostræ Atmosphæræ spatiis contingere statuamus, aliorum plurium phænomenorum causam assignabimus. Sic quoniam ex angulosis electricatæ catenæ partibus satis ampli lucidi coni emergunt, ex nubibus aliquando ea poterit lux educi, quæ ad plures gradus extendatur, & totum cælum videatur occupare. Vis, qua
in

in se invicem impingent nubes, & qui ex impactu orietur fragor, & tonitru tanto excedet fragorem scintillæ electricæ, quanto major est nubium sibi occurrentium amplitudo, & vaporum, quibus coalescunt, elasticitas.

PROPOSITIO DUODECIMA.

Explicare alia Meteora.

Post electricationem aquæ guttula sal tritum attrahit, atque inde firmitatem aliquam adipiscitur, ut Clariss. Beccaria observavit *cap. 2. de naturali electricitate*. Si in nubibus maxime procellosis idem copiosius fieri intelligamus rationem sufficientem habebimus, propterquam maximam salium, nitrorumque per Atmosphæram effusorum copiam trahentes nubium particulæ in nivem, & etiam grandinem abire possint.

Pariter si ex virgæ ferreæ, & electricatæ extremo pendeat aquæ guttula, & in distantia unius pollicis inferius vas aqua plenum constituatur, assurgit aliquantulum aqua, quæ inferius in vase est, gutta, quæ pendet, oblungatur, editur scintilla, & crepitus. En marinæ tubæ, & tiphonis simillimam imaginem. Hæc ergo etiam phænomena validissimæ electricitatis speciem, atque indolem præferunt.

Denique variationes lucis, jactus, spectacula, quæ Aurora Borealis exhibet, iis sunt similia, quæ artificiali electricitate exhiberi solent in vacuo Boyliano. Quia alte etiam supra terrestrem superficiem adhuc aliquis ær rarissimus esse debet, ætherca vero, atque electrica materia ubicumque locorum diffusa est, ut jam diximus, corrueat primum, atque alterum ex quinque iis argumentis, quæ in opere eximio de Aurora Boreali Mairanus huic hypotheti opposuit. Pauca alia ad rem nostram sufficient: primo aerem, & quæ aëri immisceri solent, particulas heterogeneas in Terram, Solem, ac Lunam graves, & circa Terram diurno motu revolutas fluere, & resuere perpetuo, iisque in locis, quibus ad perpendicularum insistant Luminaria, elevari primum, tum Luminaribus progredientibus decurrere ab Æquatore ad Polos, atque ibidem in novum aerem, & particu-

culas alias impingere: deinde ipsa, particulas in locis adeo diversis diversimode imbui materia electrica, & diversum electricitatis gradum praeferre: tertio particulas in se impingentes, & electricitatis gradu dissimiles electrica signa omnia dare oportere. Primum analogia nostrorum marium colligitur, & universalis, ac mutuae gravitatis legibus conforme est, Alterum iis experimentis ostenditur, quae in cervis volatilibus institui solent, & quibus compertum est cervos ad diversas altitudines diversis temporibus in aëre elatos diversum etiam electricitatis gradum concipere. Tertium ex his duobus, & ex toties dictis consequitur.

COROLLARIUM.

Cum aër hyberno tempore in regionibus Borealis sit densior, & excitandis electricitatis phaenomenis magis aptus, Aurora etiam Borealis conspicietur frequentius hyberno tempore, & quando Terra in Perihelio orbitae suae est. Ita tertium, & quartum Mairani argumentum solvitur. Quinto fatissit varietate, & dissimilitudine particularum in se invicem impingentium, impactuque exhibentium varia columnarum, arcuum, coronarum &c. phaenomena. Porro cum observante Musschenbroekio ad Auroras Boreales reducantur ignes veterum, caprae saltantes, virgae, trabes, vasa, antra &c., eadem omnium erit ratio. Singula in superioribus Atmosphaerae regionibus cum fiant, sine ullo sensibili strepitu, & fragore habebuntur.

SCHOLIUM.

Perpetua, & constans aetheris ab Aequatore ad polos decurrentis circulatio ex phaenomenis etiam declinationis, & inclinationis magneticae deduci poterat. Notum est enim magnetem libere suspensum altera sui parte Boream, altera vero Austrum respicere, & in regionibus Borealis, qua parte Boream respicit deprimi infra horizontem: quod nonnisi fluidi alicujus vi, & communi directione motus fieri posse
vi-

videretur. Fluidum etiam magneticum, electricumque idem esse ex eo videtur colligi quod acus chalybeæ scintilla electrica percussæ imbuantur magnetica virtute non minus ac si alteri magneti propius admoverentur. Verum qui peculiaris ætheris motus, quæ pororum ferri, & chalybis dispositio, quæ constitutio terrestris nuclei esse debeat, ut attractio, repulsio, communicatio, & directio magnetica explicetur, nimis ignotum est. Inprimis enim cum constet vigesimo quinto Musschenbroekii experimento magneticam virtutem sine sensibili decremento transfundi etiam per vitreas capsulas, quibus magnes recluditur, & quæ progressum ætheris impediunt, non nisi rarior, subtiliorque pars ætheris in partem phaenomeni vocanda erit. Deinde vero cum communicatione electricabilis sit magnes, & poros undique pervios ætheri, apertosque habeat, non nisi quidam pori supererunt penitus ad arbitrium in partibus insensibilibus configendi, qui datam formam obtineant, & qui disponi, & dirigi ab æthere, & data directione facilius pervadi debeant. At quæ hujusmodi directio, & forma erit? Cartesius magnetis poros ad modum cochlearum excavatos intus, & rectilineos, subtilissimæque materiæ particulas totidem cochleas foeminas esse censuit, quæ ex una parte poros subeundo circumvolverentur, & ex altera emergerent. Daniel, & Johannes Bernoullius ex fibris tensis, elasticis, & parallelis vibratorio motu undique abreptis magnetem compositum esse voluerunt, ita ut dum alternatim eunt partes aliæ, & aliæ redeunt, & sinus plurimos relinquunt, arcuato uno dilatetur alter, & ex uno in alterum æther transeat. Hugenius, du Fay, Eulerus, du Tour, alique suspicabantur minimos magnetis poros, & subtiliori ætheri dumtaxat pervios, villosos esse, & plurimis filamentis obritos, quasi diaphragmatis, quos cum æther ingressus sit regredi amplius non possit. Ita vero casui fortasse, & imaginationi nimium tribuitur. Qui plura hacce in re desiderat, adeat dissertationes, quæ anno 1743 a Regia Parisiensis Academia præmium obtinuerunt: Nos enim piget similitudine tantum veri, & conjecturis Physicis diutius immorari.

ERRATA

CORRIGE.

Pag. lin.			
4	18	æbet	debet
5	35	diffentionis	diffentionis .
12	9	<i>N</i>	4 <i>N</i>
15	8	ad quantitatem	ad differentiam .
16	22	<i>A</i>	<i>A</i> ⁴
21	23	etur =	etur =
22	7	Duco	Dico.
26	1	<i>A</i> ² . <i>AC</i> ² . <i>v</i>	<i>A</i> ² . <i>AC</i> ² . <i>v</i>
30	21	<i>M O</i>	<i>X O</i>
		$-2Tg . . . TX^2$	$-2Tg . . . TX^2$
31	4	$\frac{aT^2}{\dots}$	$\frac{aT}{\dots}$
31	16	Prop. 3.	Prop. 13.
33	3	$aT . TX - \frac{4}{3}TX^2$	$aT^2 . TX - \frac{4}{3}TX^2$
35	17	$-a^2 - B^2b$	$-B^2b$
40	20	$\frac{4}{15}a^2A$	$\frac{4}{15}p^2a^2A$
40	13	$\sqrt{(1-\pi^2)}$	$\sqrt{(1-\pi^2)}$
53	10	$PT^2 . S_1 . ST_1 . PT_2$	$PT^2 . S_1 . ST_1 . PT_2$
57	15	$\frac{2ST}{2ST_1} = \frac{ST_1}{ST_2}$	$\frac{2ST}{ST_1} = \frac{ST_1}{ST_2}$
59	4	que	quæ
63	18	$5Ma^2ds$	$5Mds$
69	3	$4Sds^2$	$4Sds^2$
	4	$\pi\sqrt{(1-l^2)}$	$\pi\sqrt{(1-\pi^2)}$
		$(-l^2) dq$	$(1-l^2) dq$
76	14	$18\frac{7}{8}$	$18\frac{7}{12}$
		$\pi . 14^{11} 42^{111}$	
78	15	$\pi\sqrt{(1-\pi^2)}$	deletur
79	6	$14^{11} 37^{111}$	$14^{11} 42^{111}$
81	11	$\frac{1}{2} 7^{11}$	7^{11}
99	1	$x^2 + y^2$	$a^2 + y^2$
101	1	$= (2bx - x^2)$	$-(2bx - x^2)$
	2	$\frac{x}{x^2} + \dots$	$\frac{x}{x^2} =$
102	21	fore	forent
103	17	varior	rator
105	16	$(x^2 + y^2)$	$3(x^2 + y^2)$

106	2	$x d a$	$x d x$
107	2	$c a x^2 y^2 a_2$	$c a x_2 y_2$
	9	g^2	y^2
110	12	$(x^2 + y^2 \frac{1}{2})$	$(x_2 + y^2) \frac{1}{2}$
111	1	$\frac{+}{c a_3}$	$\frac{+}{c a_3}$
112	2	$\frac{y}{-c \Delta a x^2}$	$\frac{g}{2 c \Delta a x^2}$
	5	$\frac{g}{-2 \Delta a_3 y^2}$	$\frac{+ 2 \Delta a_3 y^2}{-g a_3 x^2}$
	6	$\frac{-g a_3 y^2}{2 p n_4 b r_2}$	$\frac{-g a_3 x^2}{2 p n_4 b r_2}$
114	13	$\frac{1 f z_3}{c s_2 n^2}$	$\frac{f z_3}{c s_2 n_2}$
	14	$\frac{f z}{2 p c i^2 n}$	$\frac{g z}{2 p c i^2 n}$
114	12	Hydronamicæ	Hydrodynamicæ
116	28	$6 r^2 g n$	$6 r_2 g n$
122	13	habent	habent
144	34	punctum D	punctum B
145	11	ctiam	ctiam
158	18		

quædam, alia, quæ exciderunt, menda ex se lector benignus corriget.



00847/1

















Fig. 16




Fig. 18




Fig. 19




Fig. 21




Fig. 22




Fig. 23

